## ЗАСТОСУВАННЯ АНТИБІОТИКІВ (ДОВІДКА) СМС



## СУЛЬФАМЕТОКСАЗОЛ/ Використовується бойовими медикам бойовими медиками ТРИМЕТОПРИМ (БІСЕПТОЛ) Комбінований сульфаніламідний / антифолатний антибіотик

Рекомендований при ранах м'яких тканин, якщо є можливість приймати ліки перорально, а моксифлоксацин недоступний.

ДОЗУВАНЯ:

800 мг/160 мг перорально кожні 12 годин

ШЛЯХ(И) ВВЕДЕННЯ:

перорально

ПРОТИПОКАЗИ:

Відома гіперчутливість, відома мегалобластна або фолієводефіцитна анемія, вагітні жінки та матері, що годують грудьми

МОЖЛИВІ ПОБІЧНІ ДТТ

Анорексія, нудота, блювання, запаморочення, судоми, периферичний неврит, багатоформна еритема, гіперкаліємія, висип, кропив'янка, реакція гіперчутливості, синдром Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, агранулоцитоз, апластична анемія, гіпонатріємія, фульмінантний печінковий некроз

взаемодія з ІНШИМИ ЛІКАМИ:

Аміодарон, вакцина БЦЖ (жива), бівалірудин, вакцина проти холери, дизопірамін, еноксапарин, гепарин, лопінавір, мефлохін, метотрексат, прокаїнамід, хінідин, соталол, третиноїн

ПОЧАТОК/ПІК/ТРИВАЛІСТЬ ДІЇ: 1-4 год/1-4 год/12 год

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В ТАКТИЧНИХ УМОВАХ: Якщо моксифлоксацин недоступний, призначають альтернативний антибіотик. Мінімальний вплив на здатність виконувати бойове завдання.

