## ЗАСТОСУВАННЯ АНТИБІОТИКІВ (ДОВІДКА) СМС



## КЛАРИТРОМІЦИН

Використовується бойовими медиками

Макролідний антибіотик

Рекомендований при всіх відкритих бойових ранах, якщо є можливість приймати ліки перорально, а моксифлоксацин недоступний.

ДОЗУВАНЯ:

500 мг кожні 12 годин

ШЛЯХ(И) ВВЕДЕННЯ:

перорально

ПРОТИПОКАЗИ:

Відома гіперчутливість, пов'язана з подовженням інтервалу QT, припинити прийом, якщо виникнуть ознаки гепатиту.

МОЖЛИВІ ПОБІЧНІ ДТ

Зміни смаку, діарея, нудота, блювання, біль у животі, висип, диспепсія, головний біль, анафілаксія, анорексія, коліт, спричинений Clostridium difficile, запаморочення, задишка, порушення функції печінки, гіпоглікемія, підвищений рівень трансаміназ, жовтяниця, маніакальна поведінка, лейкопенія, нейтропенія, панкреатит, подовження інтервалу QT, судоми, синдром Стівенса-Джонсона, тромбоцитопенія

ВЗАЕМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАМИ: Аміодарон, аторвастатин, бупренорфін, буспірон, хлорохін, ципрофлоксацин, циталопрам, клопідогрель, колхіцин, циклоспорин, дальтепарин, дексаметазон, діазепам, дигоксин, дигідроерготамін, еноксапарин, адреналін, еритроміцин, естрадіол, фентаніл, флуконазол, галоперидол, гепарин, гідрокортизон, ібутилід, ізофлуран, кетамін, кетоконазол, літій, ловастатин, мефлохін, мідазолам, модафініл, моксифлоксацин, оксикодон, пентамідин, хінідин, саквінавір, симвастатин, воклоспорин

ПОЧАТОК/ПІК/ТРИВАЛІСТЬ ДІЇ: 30 хв-1 год/2 год/12 год

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В ТАКТИЧНИХ УМОВАХ: Мінімальний або відсутній вплив на виконання бойового завдання. Не застосовувати одночасно з мідазоламом.