

знеболювальні препарати (довідка)

TAPALLETAMOJ (ацетамінофен)

Використовується всіма військовослужбовцями, бійцями-рятувальниками та бойовими медиками

Ненаркотичний анальгетик та жарознижувальний засіб

Використовується при легкому та помірному болю в пораненого зі збереженою боєздатністю

ДОЗУВАНЯ:

500 мг, 2 таблетки кожні 8 год

ШЛЯХ(И) ВВЕДЕННЯ:

перорально

1РОТИПОКАЗИ:

Гіперчутливість до парацетамолу, вживання алкогольних напоїв, вважається відносно безпечним під час вагітності, якщо є клінічні покази

МОЖЛИВІ ПОБІЧНІ

Висип, нудота, блювання, запаморочення, млявість, надмірне потовиділення, озноб або біль у животі при гострому отруєнні, підвищення печінкових проб, гіпоглікемія та гепаторенальна недостатність з токсичним ураженням печінки

взаемодія з ІНШИМИ ЛІКАМИ:

Холестирамін може зменшити всмоктування в кишківнику; барбітурати, карбамазепін, фенітоїн, рифампін і надмірне вживання алкоголю можуть збільшити ризик потенційної гепатотоксичності

ПОЧАТОК/ПІК/ТРИВАЛІСТЬ ДІЇ: 20-45 хв/1-2 год/3-4 год

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В ТАКТИЧНИХ УМОВАХ: Мінімальний або відсутній вплив на виконання бойового завдання; НЕ давайте пораненим службовим собакам



