## ЗАСТОСУВАННЯ АНТИБІОТИКІВ (ДОВІДКА) СМС



## ЦИПРОФЛОКСАЦИН

Використовується бойовими медиками

Фторхінолоновий антибіотик

Рекомендований при всіх відкритих бойових ранах, якщо є можливість приймати ліки перорально, а моксифлоксацин недоступний.

ДОЗУВАНЯ:

500 мг кожні 12 годин

ШЛЯХ(И) ВВЕДЕННЯ:

перорально

ПРОТИПОКАЗИ:

Відома гіперчутливість

МОЖЛИВІ ПОБІЧНІ ДТТ

Нудота, діарея, блювання, біль у животі, запаморочення, безсоння, сонливість, диспепсія, лихоманка, задишка, висип, порушення рівня трансаміназ, головний біль, артралгія, м'язова слабкість, реакції гіперчутливості, синдром Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, вузлувата еритема, затуманений зір, шум у вухах, неприємний СМак

взаемодія з ІНШИМИ ЛІКАМИ:

вакцина БЦЖ (жива), бупренорфін, вакцина проти холери, кларитроміцин, кломіпрамін, клозапін, десфлуран, гідроксихлорохін, іміпрамін, сахарат заліза, ізофлуран, мефлохін, оланзапін, теофілін, тизанідин, третиноїн

ПОЧАТОК/ПІК/ТРИВАЛІСТЬ ДІЇ: 30 хв-1 год/2 год/12 год

<u>ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В ТАКТИЧНИХ УМОВАХ:</u> Мінімальний або відсутній вплив на виконання бойового завдання, якщо не спостерігаються побічні ефекти з боку ЦНС. Слідкуйте за побічними ефектами з боку ЦНС, включаючи запаморочення, судоми, галюцинації, збудження, параною та суїцидальні думки; при появі припиніть використання. Мінімізуйте споживання кофеїну через взаємодію з ципрофлоксацином. Приймайте за 2 години до або через 6 годин після значного споживання кальцію через зниження абсорбції.