## ЗАСТОСУВАННЯ АНТИБІОТИКІВ (ДОВІДКА) СМС



## EPTAILEHEM

Використовується бойовими медиками

Бета-лактамний антибіотик з групи карбапенемів

Рекомендований при всіх відкритих бойових ранах, якщо боєць може прийняти ліки перорально.

ДОЗУВАНЯ:

1 г ВВ/ВК/ВМ на день

ШЛЯХ(И) ВВЕДЕННЯ: ВВ, ВК, ВМ

ПРОТИПОКАЗИ:

Гіперчутливість до карбапенемів, бета-лактамних антибіотиків або місцевих анестетиків амідного типу (напр., лідокаїн); вважається відносно безпечним у вагітних за наявності клінічних показів

МОЖЛИВІ ПОБІЧНІ

Флебіт або тромбоз у місці ін'єкції, астенія, втома, смерть, гарячка, біль у ногах, занепокоєння, зміна психічного стану, запаморочення, головний біль, безсоння, біль у грудях, гіпо- або гіпертензія, тахікардія, набряк, біль у животі, діарея, кислотний рефлюкс, закреп, диспепсія, нудота, блювання, підвищення показників печінкових проб, кашель, задишка, фарингіт, хрипи, порушення дихання, еритема, свербіння і висип

взаемодія з ІНШИМИ ЛІКАМИ:

Пробенецид зменшує ниркову екскрецію ертапенему

ПОЧАТОК/ПІК/ТРИВАЛІСТЬ ДІЇ: 30 с-5 хв/30 хв-2 год/24 год

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В ТАКТИЧНИХ УМОВАХ: Для ВВ введення - розведіть в 10 мл 0,9% NaCl; для ВМ введення - розведіть в 3,2 мл 1% лідокаїну (без адреналіну). Мінімальний вплив на здатність виконувати бойове завдання. Може збільшувати ризик виникнення судом у випадку наявності проникаючої ЧМТ. Використовувати ертапенем, якщо немає іншого антибіотика, який проникає в ЦНС. Ертапенем може не пройти через неушкоджений гематоенцефалічний бар'єр (з крові в головний мозок). Якщо переводите пацієнта з ертапенему на моксифлоксацин, введіть першу дозу моксифлоксацину негайно після останньої дози ертапенему для взаємного перекриття доз.

