## ЗАСТОСУВАННЯ АНТИБІОТИКІВ (ДОВІДКА) СМС



## ЦЕФАЗОЛІН

Використовується бойовими медиками

Цефалоспорин, бета-лактамний антибіотик, що проникає в ЦНС

Рекомендований при всіх відкритих бойових ранах, якщо неможливо приймати перорально препарати, а ертапенем недоступний, або якщо потрібне проникнення в ЦНС.

ДОЗУВАННЯ:

2 г ВВ/ВК повільно (3-5 хв) або ВМ, кожні 6-8 годин

ШЛЯХ(И) ВВЕДЕННЯ: ВВ, ВК, ВМ

ПРОТИПОКАЗИ:

Відома гіперчутливість, застосовувати з обережністю особам із судомними розладами

МОЖЛИВІ ПОБІЧНІ ДІІ

Анорексія, діарея, еозинофілія, лихоманка, підвищення рівня трансаміназ, лейкопенія, нудота та блювання, нейтропенія, кандидоз ротової порожнини, флебіт, псевдомембранозний коліт, судоми, синдром Стівенса-Джонсона, тромбоцитопенія, тромбоцитоз, вагініт

взаемодія з IHUINMI JIKAMI:

вакцина БЦЖ (жива), бівалірудин, вакцина проти холери, дальтепарин, еноксапарин, гепарин, вакцина проти черевного тифу (жива)

ПОЧАТОК/ПІК/ТРИВАЛІСТЬ ДІЇ: 30 хв-1 год/1-2 год/2-6 год

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В ТАКТИЧНИХ УМОВАХ: Альтернативний антибіотик, якщо недоступний ертапенем. Мінімальний вплив на здатність виконувати бойове завдання. Рекомендований для лікування, якщо потрібне проникнення в ЦНС. Розведіть стерильною водою для ін'єкцій, 5 мл для ВМ або 10 мл для ВВ/ВК болюсного введення; струсіть, щоб розчинити весь порошок.

