ЗАСТОСУВАННЯ АНТИБІОТИКІВ (ДОВІДКА) СМС



МОКСИФЛОКСАЦИН

Антибіотик з групи фторхінолонів

Використовується всіма військовослужбовцями, бійцями-рятувальниками та бойовими медиками

Рекомендований при всіх відкритих бойових ранах, якщо боєць може прийняти ліки перорально.

ДОЗУВАНЯ:

400 мг на день

ШЛЯХ(И) ВВЕДЕННЯ: перорально

ПРОТИПОКАЗИ:

Гіперчутливість до хінолонів, печінкова недостатність, сифіліс, аритмії, ішемія або інфаркт міокарда, подовження інтервалу QT, гіпокаліємія, прийом антиаритмічних препаратів класу ІА або класу ІІІ; при необхідності призначення препарату вагітним, за відсутності альтернативного лікарського засобу, слід враховувати можливі переваги прийому препарату над потенційними ризиками

МОЖЛИВІ ПОБІЧНІ ДТТ

Запаморочення, головний біль, периферична нейропатія, нудота, діарея, біль у животі, блювота, спотворення смаку, порушення функцій печінки, диспепсія та розрив сухожиль.

взаемодія з ІНШИМИ ЛІКАМИ:

Залізо, цинк, антациди, алюміній, магній, кальцій і сукральфат знижують всмоктування; атенолол, цизаприд, еритроміцин, антипсихотики, трициклічні антидепресанти, хінідин, прокаїнамід, аміодарон, соталол можуть подовжувати інтервал QT та призвести до хибнопозитивних результатів скринінгових тестів на опіати.

ПОЧАТОК/ПІК/ТРИВАЛІСТЬ ДІЇ: 1 год/2 год/20-24 год

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В ТАКТИЧНИХ УМОВАХ: Використайте моксифлоксацин з особистого набору СWMP пораненого бійця. Мінімальний вплив на здатність виконувати бойове завдання. Може збільшувати ризик виникнення судом у випадку наявності проникаючої ЧМТ. Використовувати моксифлоксацин, якщо немає іншого антибіотика, який проникає в ЦНС.