ТЕРАПЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ



(ДОВІДКА)

АДРЕНАЛІН (ЕПІНФРИН)

Використовується бойовими медиками

Катехоламін із симпатоміметичними властивостями

Для екстреного лікування анафілаксії або алергічних реакцій.

ДОЗУВАНЯ:

0,3 мг (3 мл розчину в розведенні 1:1000); повторне введення кожні 5-10 хв за необхідності.

ШЛЯХ(И) ВВЕДЕННЯ:

ВМ, підшкірно.

ПРОТИПОКАЗИ:

Відсутні.

МОЖЛИВІ ПОБІЧНІ ДІЇ: Тривога, неспокій, тремор, слабкість, запаморочення, пітливість, серцебиття, блідість, нудота та блювання, головний біль, дезорієнтація, тахікардія.

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАМИ:

Антигіпертензивні препарати знижують пресорний ефект адреналіну; гормони щитоподібної залози, антигістамінні препарати, а також деякі антиаритмічні засоби посилюють його аритмогенну дію.

ПОЧАТОК/ПІК/ТРИВАЛІСТЬ ДІЇ: 15-30 с (ВМ < підшкірно)/від 20 с до 4 хв/ 5-10 хв.

<u>ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В ТАКТИЧНИХ УМОВАХ:</u> Стандартні ручки ЕріРеп забезпечують ВМ введення рекомендованої дози адреналіну (0,3 мг). За наявності геморагічного шоку в постраждалих порушується перфузія тканин кінцівок, що знижує швидкість розподілу адреналіну. Для введення препарату необхідно використовувати великі групи м'язів, розташованих найближче до тулуба (у порядку переваги: м'язи стегна > дельтоподібний м'яз > сідничні м'язи).

