

смс знеболювальні препарати (довідка)

ОНДАНСЕТРОН

Використовується бойовими медиками

Протиблювотний препарат (антагоніст 5-НТЗ рецепторів)

Профілактика та лікування нудоти та блювання, пов'язаних із введенням знеболювальних препаратів

ДОЗУВАННЯ:

4 мг кожні 8 год, повторіть введення через 15 хв, якщо симптоми зберігаються, але не вводьте більш, ніж 8 мг у 8-годинний проміжок часу

ШЛЯХ(И) ВВЕДЕННЯ: ВВ, ВК, транслінгвально, ВМ

ПРОТИПОКАЗИ:

Підвищена чутливість до ондансетрону, застосовувати з обережністю у пацієнтів з печінковою недостатністю; вважається відносно безпечним під час вагітності, якщо є клінічні покази

МОЖЛИВІ ПОБІЧНІ ДІІ

Запаморочення, головний біль, седація, діарея, закреп, сухість у роті

взаемодія з IHUINMI JIKAMI:

Рифампін може знизити рівень ондансетрону

<u>ПОЧАТОК/ПІК/ТРИВАЛІСТЬ ДІЇ:</u> 20 с-4 хв (ВВ<ВК<транслінгвально<ВМ)/10-40 хв/4 год

<u>ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В ТАКТИЧНИХ УМОВАХ:</u> Не призначайте пероральні форми – використовуйте транслінгвально таблетку, що розчиняється в ротовій порожнині (ОРТ) (ондансетрон для перорального застосування НЕ є прийнятною альтернативою формі ОРТ); не можна брати ОРТ мокрими руками; якщо вводите препарат ВВ чи ВК, слід робити це повільно струминно.

