CLS
TCCC
NIVEL 2

COMBAT LIFESAVER
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

M A R C H

EMPAQUETADO DE HERIDAS Y VENDAJE DE COMPRESIÓN

CONSIDERA Protegerte de fluidos corporales

NOTA: Si hay un socorrista disponible, dale instrucciones para intervenir.



EXPONGA la herida, si no ha sido expuesta previamente.

NOTA: Retira la ropa y el equipo según sea necesario



LOCALICE el origen del sangrado más activo y aplicar presión directa.



RETIRE el vendaje/gasa de su embalaje esteril

NOTA: Si no hay un apósito hemostático, usa gasa o material de tela limpio y seco.



EMPAQUETA el apósito hemostático firmemente en la herida directamente sobre el sitio de sangrado más activo.



NOTA: Llena y empaqueta la cavidad de la herida firmemente mientras mantienes una presión constante sobre la herida.

NOTA: Puede ser necesario más de un apósito hemostático o gasa para detener el flujo de sangre.



PRECAUCIÓN: Si hay un objeto penetrante alojado en el cuerpo del herido, inmovilízalo en su lugar. No retires el objeto.

ASEGÚRATE de que el apósito hemostático o la gasa rellenen toda la cavidad de la herida y sobresalgan 3-5 cm por encima de la piel.

NOTA: Si el apósito hemostático o la gasa no se extiende 3-5 cm por encima de la piel, coloca apósitos hemostáticos o gasas adicionales



Después de empaquetar MANTEN una presión firme durante un mínimo de 3 min hasta que el sangrado se detenga



REEVALUA para asegurar que el sangrado está controlado y si es así, deja la gasa en su lugar mientras sigues aplicando presión

NOTA: Asegúrese de que no haya sangre filtrándose a través o alrededor del apósito hemostático. Si el sangrado se detuvo, deja al apósito hemostático en donde está mientras aun sigues manteniendo presión.

Continúa en la página siguiente…

CLS
TCCC
NIVEL 2

COMBAT LIFESAVER
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

M A R C H

EMPAQUETADO DE HERIDAS Y VENDAJE DE COMPRESIÓN
...Continuacion



Si el sangrado no ha sido controlado:

(a) Si está empaquetado con apósito hemostático, retira y vuelve a empaquetar comenzando desde el PASO 3.

O

(b) Si estas empaquetando con gasa, aplica gasa adicional y presión (durante 3 min) hasta que el sangrado se detenga.



RETIRA el vendaje de presión de su paquete y envoltura



COLOCA la almohadilla del vendaje sobre la herida en la más reciente apósito hemostático y continúa poniendo presión directa



ENVUELVE fuertemente alrededor de la extremidad asegurándote de que los bordes de la almohadilla estén cubiertos.

PASO 11 NOTA: Si el vendaje tiene una barra de presión, inserta la envoltura elástica completamente en la barra; jala la venda para ajustarla, dale la vuelta y colócala sobre la barra de presión, poniéndola sobre la almohadilla.



ASEGURA los extremos con gancho y/o el dispositivo de fijación en la última vuelta del vendaje.



VERIFICA la circulación comprobando el pulso distal debajo del vendaje de presión.

NOTA: Si la piel debajo del vendaje de presión se vuelve fría al tacto, azulada o entumecida, o si el pulso distal ya no está presente , el vendaje de presión puede estar demasiado apretado y debe aflojarse y volver a aplicarse; si se produce sangrado, puede ser necesario aplicar un torniquete de extremidad o de unión.



DOCUMENTA todos los hallazgos y tratamientos en el Formulario DD 1380 Tarjeta TCCC de Heridos, y adjúntela a la baja

NOTA: Comunica tus hallazgos a cualquer ayuda medica al personal medico; ayuda con evacuacion, si es pedido