CMC
TCCC
NIVEL 3

**COMBAT MEDIC/CORPSMAN**
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

M A R C H

# CONTROL DE HEMORRAGIA EN EL CUELLO

CONSIDERA Protegerte de fluidos corporales.
NOTA: Si hay un socorrista disponible, dale instrucciones para intervenir.

**1** EXPONGA la herida y evalúa el origen del sangrado.
NOTA: Puede ser necesario cortar la ropa para exponer adecuadamente la lesión.

APLICA PRESIÓN DIRECTA en la fuente de sangrado

**3** Saca el APÓSITO HEMOSTÁTICO del IFAK de la víctima

NOTA: Si no dispones de un vendaje hemostático, utiliza una gasa o un paño limpio y seco.




EMPAQUETA firmemente con el apósito hemostático hasta rellenar la cavidad completamente. Continúa aplicando presión. Acaba el empaquetado en menos de 90 segundos.

NOTA: Es posible que se necesite más de un apósito hemostático o gasa para detener el flujo sanguíneo.

PRECAUCIÓN: Si un objeto penetrante se introduce en el cuerpo de la víctima, inmovilizalo en su lugar. NO RETIRES el objeto.




ASEGURATE que el apósito hemostático o la gasa se extiendan entre 3-5 cm por encima de la piel.

NOTA: Si el apósito hemostático o la gasa no se extienden entre 3-5 cm por encima de la piel, coloca un apósito o una gasa hemostática adicional.




Después de empaquetar continúa aplicando presión manual firmemente. MANTÉN la presión al menos 3 minutos




REEVALÚA para asegurarte que el sangrado ha sido controlado mientras mantienes la presión.

NOTA: Asegúrate de que no se filtra sangre a través del apósito hemostático. Si el sangrado se detuvo mantén el apósito hemostático en su lugar mientras mantienes la presión.

## SI EL SANGRADO NO HA SIDO CONTROLADO:

**8.1** Si está lleno de gasa de tamponar, RETIRE y VUELVA A EMPEZAR a partir del PASO 3.

**Ó**

**8.2** Si está lleno de gasa u otros materiales, aplica gasa/materiales adicionales y presiona (durante otros 3 minutos) hasta que se detenga el sangrado.




APLICA una venda de 10-15 cm sobre el apósito hemostático dejando un extremo de la venda para hacer un nudo.

Mientras mantienes la presión HAZ EL VENDAJE, no menos de una vuelta y media hasta que el material de empaquetado quede cubierto completamente.

VENDA diagonalmente cruzando el pecho por debajo del brazo contrario (axila), alrededor de la espalda hasta el cuello, y nuevamente sobre la herida.

Continua en la siguiente página...

CMC
TCCC
NIVEL 3

**COMBAT MEDIC/CORPSMAN**
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

M A R C H

# CONTROL DE HEMORRAGIA EN EL CUELLO
## Continuado...

VENDA alrededor del cuello y bajo el brazo (dar vueltas mientras se mantiene presión/tensión), tirando firmemente de la venda para cubrir el material de empaquetado

**NOTA:** No usar barra de presión en el cuello




ASEGURE el extremo del vendaje elástico con un nudo antideslizante.




ASEGURE el nudo del vendaje elástico con cinta adhesiva de 7.5 cm, envolviendo un mínimo de 1 1/2 veces alrededor del nudo.




Asegure la parte superior del brazo del lado no herido al lado del pecho con un vendaje

CONTINÚE EVALUANDO la herida para un sangrado adicional.




DOCUMENTA todos los hallazgos y tratamientos en el Formulario DD 1380 Tarjeta TCCC de Heridos, y adjúntela a la baja.