

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
«Московский физико-технический институт  
(государственный университет)»

Факультет проблем физики и энергетики

Кафедра нелинейных и динамических процессов в астрофизике и геофизике

**ПОДГОТОВКА ПРОГРАММЫ НАБЛЮДЕНИЙ КОСМИЧЕСКОЙ  
МИССИИ "СПЕКТР-УФ": ОТБОР КАНДИДАТОВ В ЗВЁЗДЫ  
ТИПА Т ТЕЛЬЦА В СОЗВЕЗДИИ ЗМЕИ**

Выпускная квалификационная работа  
(бакалаврская работа)

Направление подготовки 03.03.01 Прикладные математика и физика

Выполнила:

студентка 183 группы \_\_\_\_\_ Молярова Тамара Сергеевна

Научный руководитель:

д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник \_\_\_\_\_ Сачков Михаил Евгеньевич

Москва 2015

# Оглавление

<b>1 Введение</b>	<b>2</b>
1.1 Т Tauri звёзды	2
1.2 Изучаемая область	2
1.3 Метод поиска	2
1.4 актуальность	2
<b>2 Т Tauri</b>	<b>3</b>
2.1 Звёзды типа Т Тельца	3
2.2 Спектральные особенности	3
2.3 Методы поиска	4
<b>3 Данные</b>	<b>5</b>
3.1 GALEX	5
3.2 2MASS и UCAC4	5
3.3 Используемые инструменты	6
<b>4 Отбор</b>	<b>7</b>
4.1 Эталонная выборка	7
4.2 Цветовые диаграммы	7
4.3 Критерии отбора	7
4.4 Результат	7
4.5 Адекватность критериев	7
<b>5 Улучшение списка</b>	<b>8</b>
5.1 Удаление источников известного типа	8
5.2 Поиск галактик по собственным движениям	8
5.3 Оценка эффективных температур	8
<b>6 Анализ</b>	<b>9</b>
6.1 Диаграммы цвет-интенсивность	9
6.2 Оценка поглощения	9
6.3 Расположение	9
6.4 Классические и со слабыми линиями	9
<b>7 Выводы</b>	<b>10</b>
<b>Литература</b>	<b>10</b>

# **1. Введение**

## **1.1 Т Tauri звёзды**

Зачем их искать вообще, что в них интересного.

## **1.2 Изучаемая область**

Это туманность какая-то в созвездии Змеи. Где она, кем наблюдалась, звездообразование в ней етс.

## **1.3 Метод поиска**

По фотометриям galex, цветовым диаграммам + отсеив по собственным движениям, эффективным температурам и simbad.

## **1.4 актуальность**

О космическом телескопе Спектр-УФ. Неисследованная область

## 2. T Tauri

### 2.1 Звёзды типа T Тельца

Звёзды типа T Тельца - это маломассивные молодые звёзды, находящиеся на пути к главной последовательности. Обычно они находятся недалеко от отражательных или тёмных туманностей, оставшихся от газопылевого облака, из которого эти звёзды сформировались. Эти звёзды находятся в той части диаграммы Герцшпрунга - Рассела, которая соответствует звёздам с массами около 2-3 солнечных. С точки зрения звёздной эволюции они находятся в стадии гравитационного сжатия и, как молодые объекты, имеют близкую к солнечной металличность. (цитировать Додина) Характерными чертами также является избыточная эмиссия в ИК и УФ диапазонах.

Выделяют два подтипа этих звёзд: классические звёзды типа T Тельца (classical T Tauri stars, CTTS) и звёзды типа T Тельца со слабыми линиями (weak-lined T Tauri stars). Звёзды обоих подтипов находятся на одной стадии эволюции, имеют малую массу, и их металличность близка к солнечной. Различие состоит в том, что в спектрах классических звёзд типа T Тельца присутствуют сильные эмиссионные линии, указывающие на то, что эти звёзды проявляют определённого рода активность. У звёзд типа T Тельца со слабыми линиями эмиссионные линии гораздо слабее. Граница между подтипами проводится по эквивалентной ширине линии  $H\alpha$ .

### 2.2 Спектральные особенности

Звёзды типа T Тельца относятся к классу переменных звёзд. Первоначально они были выделены в отдельный класс на основе чисто спектроскопических характеристик: наличия эмиссии в линиях  $H\alpha$  и Fe I, а также класс светимости IV-V.

Сейчас выделяются следующие критерии принадлежности к типу:

- Наличие поблизости тёмной или отражательной туманности;
- Спектральный класс F5-M, класс светимости IV-V;
- Эмиссия в линиях H и He I, а также нейтральных и однократно ионизированных металлов;
- Сильная линия поглощения Li I 6707 Å;

Присутствие линии Li указывает на молодость звёзд, так как согласно теоретическим расчётам литий быстро выгорает.

Эмиссионный спектр CTTS напоминает спектр солнечной хромосферы. Поэтому изначально считалось, что для них характерна высокая хромосферная активность. Но ожидаемое в этой модели сильное рентгеновское излучение не нашло экспериментального подтверждения.

В настоящее время считается, что спектральные особенности CTTS обусловлены наличием аккреционного диска. Если также предположить наличие магнитного поля, направление которого не совпадает с осью вращения звезды, то удаётся объяснить асимметричность эмиссионных линий. Предполагается, что они образуются на границе магнитосферы. Также аккреция вещества на звезду вызывает возникновение джетов. Это биполярные узконаправленные струи газа, истекающие со звезды. Они наблюдаются обычно в запрещённых линиях [SiI], [OI].

Наличие протопланетных дисков и магнитного поля у многих звёзд типа Т Тельца подтверждается наблюдениями.

Чтобы отличить звёзды типа Т Тельца от других, нам нужно знать характеристики их спектров, в особенности те из них, которые можно наблюдать в фотометриях. Как следствие существования аккреционного диска и истечения вещества на звезду, у TTS наблюдается избыток излучения в различных спектральных диапазонах, а именно:

- Избыток в инфракрасном диапазоне вплоть до миллиметровых длин волн, обусловленный как собственным излучением нагретого диска, так и переизлучением поглощённого им излучения звезды и джетов.
- Избыток в оптическом диапазоне – свечение плазмы, нагретой до температуры 7000-10000 К. Это так называемое вуалирование – континуальное излучение нефотосферной природы.
- Избыток в ультрафиолетовом диапазоне – свечение плазмы с температурой электронов от 10000 К до 50000 К, причём присутствует как излучение в континууме, так и различные эмиссионные линии: нейтральные атомы (H I, O I, C I), однократно (C II, Si II, Fe II, Mg II, O I) и многократно (C IV, N V, O VI) ионизованные атомы, молекулярный водород.
- Избыток в рентгеновском диапазоне, вызванный высокой активностью магнитосферы звезды, свечением короны и ударными волнами в аккреционном диске.

## 2.3 Методы поиска

Изначально главными критериями поиска были лишь самые основные характеристики звёзд типа Т Тельца, как-то: близость к молекулярным облакам, избыток в инфракрасном диапазоне, присутствие магнитного поля. Позже, с появлением широкомасштабных обзоров неба, стали учитываться эквивалентная ширина линии H  $\alpha$ , собственные движения звёзд и избыток излучения в рентгеновском диапазоне. Также могут быть использованы оптические и инфракрасные данные и распределение спектральной энергии (SED) в этих диапазонах, в которых можно выделить черты, характерные для аккреционных дисков. Однако этими методами труднее обнаружить WTTS. Единственным действительно надёжным критерием является присутствие линии Li, как показатель молодости звезды.

Несмотря на то, что у звёзд типа Т Тельца присутствует существенный ультрафиолетовый избыток, большинство исследований, направленных на их поиск, проводилось в инфракрасном и рентгеновском диапазонах. С появлением ультрафиолетового обзора неба от миссии GALEX есть возможность использования и

## 3. Данные

Для поиска кандидатов применялись данные, взятые из трёх каталогов точечных источников. За основу брался список всех источников, относящихся к рассматриваемой области, которые пронаблюдад телескоп GALEX. Для этого списка проводилась кросс-идентификация с каталогами 2MASS и UCAC4 с целью получения данных о звёздных величинах в фильтрах инфракрасного и видимого диапазонов.

### 3.1 GALEX

GALEX (Galaxy Evolution Explorer) – это ультрафиолетовый обзорный космический телескоп с полуметровым зеркалом, запущенный в 2003 году. Его целью является исследование эволюции звездообразования в галактиках от ранней вселенной до наших дней. Так как наблюдения в ультрафиолете недоступны с Земли, его каталог точечных источников является единственным источником данных в этом спектральном диапазоне.

Обзор неба от GALEX состоит из круглых изображений радиусом 0.7 градусов и покрывает две трети небесной сферы. Наблюдения проводились в двух фильтрах: FUV(Far Ultraviolet), охватывающий диапазон 125-180 нм, и NUV(Near Ultraviolet) в диапазоне 170-300 нм с пространственным разрешением 4.3 и 5.3 угловых секунд соответственно.

Телескоп избегал наблюдений вблизи галактической плоскости и Магеллановых облаков, а также ярких звёзд, так как это могло привести к перегоранию чувствительных детекторов. Минимальная допустимая звёздная величина равна 9.5 и 8.9 для FUV и NUV соответственно. Максимальная звёздная величина составляет 22.3. Из-за высокой чувствительности телескопа в каталоге присутствует много ложных объектов, случайных шумов, которые были приняты за реальные источники. В дальнейшем эти паразитные источники отсеются при кросс-идентификации, не найдя соответствий в других спектральных диапазонах.

Так как интересующий нас участок неба находится близко к галактической плоскости, он не полностью покрыт наблюдениями. Для левой части туманности данных нет, а правая покрыта наблюдениями на 70%.

Для выбранной области нашлось 2968 источников, причём для некоторых из них отсутствовала звёздная величина в фильтре FUV. Их пришлось отбросить, так как эта информация существенна для нашего исследования.

### 3.2 Кросс-идентификация с 2MASS и UCAC4

После получения исходного списка источников он был кросс-идентифицирован с каталогами 2MASS и UCAC4. То есть для каждого источника из списка мы искали соответствие в другом каталоге, основываясь на равенстве или близости их координат.

Параметр кросс-корреляции взят равным 3 угловым секундам. Это максимальное расстояние между источниками из разных каталогов, при котором они будут считаться одним источником.

2MASS(Two Micron All-Sky Survey) – это полный обзор всего неба на длинах волн около 2 микрон. Он содержит информацию о звёздных величинах в фильтрах J, H и Ks с длинами волн 1.25, 1.65 и 2.17 мкм соответственно.

Так как этот обзор создавался с помощью больших наземных телескопов, пространственное разрешение здесь гораздо выше, чем у GALEX, и источники можно считать действительно точечными. Из-за низкой точности GALEX объекты в нём размазаны и эффективно имеют радиус около 2.2-2.7 угловых секунд. Поэтому при кросс-идентификации объект из GALEX считается совпавшим с объектом из 2MASS, если он попадает внутрь окружности с радиусом 3 угловых секунды.

Все источники из первоначального списка, не идентифицированные в каталоге 2MASS, должны быть сочтены ложными и откинuty.

Каталог UCAC4 содержит данные в фильтрах видимого диапазона: V и B фотометрической системы Джонсона, а также i и r фотометрической системы SDSS. Кроме того, из него мы берём информацию о собственных движениях звёзд. В него включены только звёзды. Их величины лежат в интервале от 8 до 16, ярче, чем в GALEX. Поэтому те объекты из списка, которые не нашли соответствия в UCAC4, не должны отбрасываться.

Инфракрасные звёздные величины необходимы нам для построения диаграмм цвет-цвет и формулирования критериев поиска звёзд типа Т Тельца. Величины в видимом диапазоне используются для иллюстрации на цветовых диаграммах и для дополнительного критерия. Также они нужны для оценки эффективных температур.

После кросс-идентификации список сократился до 726 объектов.

### **3.3 Используемые инструменты**

casjobs для получения данных с галекса. visier для кросс-матчинга. aladin для картинок

## **4. Отбор**

Основной этап отбора кандидатов

### **4.1 Эталонная выборка**

Что за звёзды, откуда, зачем.

### **4.2 Цветовые диаграммы**

Построение этих диаграмм, анализ. Нанесённые эталоны.

### **4.3 Критерии отбора**

Критерии для трёх типов диаграмм. Почему именно эти диаграммы. Выбираем источники, для которых хотя бы одно из условий выполняется. Зачем нам третий критерий. И сослаться на Ану Инес.

### **4.4 Результат**

Получили столько-то источников. Самый сильный критерий оказался третий (вроде)

### **4.5 Адекватность критериев**

Не упускают ли критерии известные звёзды типа Т Тельца? В нашей области проверить не на чем, но вот люди (Ана Инес) проверили на ТМС и работает.



## **5. Улучшение списка**

Теперь мы очистим список от источников, который могли попасть туда случайно. Это могут быть галактики, например, или горячие звёзды, потому что у них тоже присутствует избыток ультрафиолета.

### **5.1 Удаление источников известного типа**

С помощью Simbad удалось идентифицировать четверть источников. Многие из них галактики. Нет ни одной Т Тauci и даже ни одного кандидата. Выбрасываем галактики и звёзды с определённым типом.

### **5.2 Поиск галактик по собственным движениям**

В UCAC4 указаны собственные движения, так что мы можем сравнить их друг с другом и выяснить, какие из источников находятся ближе. Если движение сравнимо со значением погрешности его измерения, то мы считаем, что эти источники находятся слишком далеко, скорее всего они являются галактиками.

### **5.3 Оценка эффективных температур**

Некоторые попавшие в список источники могут иметь ультрафиолетовый избыток просто потому что у них очень большая температура. Оцениваем её в VOSA, отбрасываем все источники горячее 7000 К.

## **6. Анализ**

Анализ этого всего

### **6.1 Диаграммы цвет-интенсивность**

Надо их показать, но не знаю, зачем.

### **6.2 Оценка поглощения**

Не очень далеко область, но вроде поглощается там. Надо доделать.

### **6.3 Расположение**

Картинки с координатами и собственными движениями.

### **6.4 Классические и со слабыми линиями**

Что они распределены по гауссу и вдоль прямой соответственно, если смотреть на диаграмму FUV-NUV vs J-K. Вообще распределить кандидаты в группы по WTTS, CTTS и просто TTS.

## 7. Выводы

Итак, мы получили финальный список кандидатов в звёзды типа Т Тельца, всего их целых  $N$  штук.

Мы сделали всё, что мы сделали, мы молодцы.

Теперь можно понаблюдать все кандидаты со Спектра-УФ, чтобы выяснить, действительно ли они типа Т Tauri. Но можно и улучшить список ещё, если очень хочется, а именно – пронаблюдать эти источники на БТА и уточнить их звёздные величины в видимом диапазоне.

Спасибо мама, папе, Ленке, Вове, Лохматому и Булке за моральную поддержку и веру в меня, спасибо спасибо.