

Math 1710. Homework Problems III (January 9, 2012)

$$1. \int (\tan^2 x + \tan^4 x) dx = \int \tan^2 x (1 + \tan^2 x) dx = \int \tan^2 x \sec^2 x dx$$

We make substitution $u = \tan x$: $du = \sec^2 x dx$,

$$\int u^2 du = \frac{u^3}{3} + C = \boxed{\frac{\tan x}{3} + C, \quad C \in \mathbb{R}}$$

$$2. \int \frac{x^2 + 1}{\sqrt{x^6 - 7x^4 + x^2}} dx = \int \frac{x^2(1 + \frac{1}{x^2})}{\sqrt{x^4(x^2 - 7 + \frac{1}{x^2})}} dx = \int \frac{1 + \frac{1}{x^2}}{\sqrt{x^2 - 7 + \frac{1}{x^2}}} dx$$

We make substitution $u = x - \frac{1}{x}$: $du = \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) dx$,

$$u^2 = x^2 - 2 + \frac{1}{x^2} \Rightarrow x^2 - 7 + \frac{1}{x^2} = u^2 - 5$$

$$= \int \frac{du}{\sqrt{u^2 - 5}} du$$

We make new substitution $u = \sqrt{5} \sec t$: $du = \sqrt{5} \tan t \sec t dt$

$$= \int \frac{\sqrt{5} \tan t \sec t}{\sqrt{5 \sec^2 t - 5}} dt = \int \frac{\sqrt{5} \tan t \sec t}{\sqrt{5}(\sec^2 t - 1)} dt = \int \frac{\sqrt{5} \tan t \sec t}{\sqrt{5} \tan t} dt$$

$$= \int \sec t dt = \ln(\sec t + \tan t) + C = \ln \left(\frac{u}{\sqrt{5}} + \sqrt{\frac{u^2}{5} - 1} \right) + C$$

$$= \ln \left(\frac{x - 1/x}{\sqrt{5}} + \sqrt{\frac{(x - 1/x)^2}{5} - 1} \right) + C = \ln \left(\frac{x^2 - 1}{\sqrt{5}x} + \sqrt{\frac{x^4 - 2x^2 + 1}{5x^2} - 1} \right) + C$$

$$= \boxed{\ln \left(\frac{x^2 - 1 + \sqrt{x^4 - 7x^2 + 1}}{\sqrt{5}x} \right) + C, \quad C \in \mathbb{R}}$$