

MATH 1210 Summer 2015 Quiz 2

- [7] 1. Find $(-1 + i\sqrt{3})^{10}$. Put your answer in Cartesian form.

Solution: First convert to exponential. The modulus of $-1 + i\sqrt{3}$ is

$$\sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1 + 3} = \sqrt{4} = 2.$$

To find the argument we need to solve

$$\tan \theta = \frac{y}{x} = \frac{\sqrt{3}}{-1} = -\sqrt{3}$$

which has a solution of $\theta = \frac{2\pi}{3}$.

Hence

$$-1 + i\sqrt{3} = 2e^{2\pi i/3}.$$

This means

$$(-1 + i\sqrt{3})^{10} = (2e^{2\pi i/3})^{10} = 2^{10}e^{20\pi i/3} = 1024e^{2\pi i/3}.$$

Converting back to Cartesian leads to

$$\begin{aligned} (-1 + i\sqrt{3})^{10} &= 1024e^{2\pi i/3} \\ &= 1024(\cos 2\pi/3 + i \sin 2\pi/3) \\ &= 1024\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\ &= -512 + 512i\sqrt{3}. \end{aligned}$$

- [4] 2. Use the Remainder Theorem to find the remainder when $P(x) = 2x^2 + 4$ is divided by $ix + (2i + 1)$.

Solution: The remainder theorem says that the remainder is $P\left(-\frac{2i+1}{i}\right)$. Using that

$$-\frac{2i+1}{i} = -2 - \frac{1}{i} = -2 + i$$

we get the remainder is

$$\begin{aligned}P(-2 + i) &= 2(-2 + i)^2 + 4 \\&= 2(4 - 4i + i^2) + 4 \\&= 2(4 - 4i - 1) + 4 \\&= 2(3 - 4i) + 4 \\&= 6 - 8i + 4 \\&= 10 - 8i\end{aligned}$$

3. Let $P(x)$ be the polynomial $10x^3 - 11x^2 + 34x + 16$.

[3] (a) Find the possible rational roots of $P(x)$ using the rational root theorem.

Solution: Any rational root is of the form p/q where p divides 16 and q divides 10. Hence we get possibilities of

$$\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8, \pm 16, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{5}, \pm \frac{2}{5}, \pm \frac{4}{5}, \pm \frac{8}{5}, \pm \frac{16}{5}, \pm \frac{1}{10}.$$

[6] (b) Given that $P(-2/5) = 0$, solve for all roots of $P(x)$.

Solution:

Since

$$P\left(-\frac{2}{5}\right) = 0.$$

we know that $5x + 2$ is a factor of $P(x)$. Long division leads to

$$P(x) = (5x + 2)(2x^2 - 3x + 8).$$

The remaining quadratic yields solutions

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{(-3)^2 - 4(2)(8)}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{-55}}{2} = \frac{3 \pm i\sqrt{55}}{2}.$$

Therefore the roots are

$$-\frac{2}{5}, \frac{3 \pm i\sqrt{55}}{2}.$$