

## Neue Aufgaben 2

---

**Aufgabe 1:** Die Zufallsvariablen  $X_1$  und  $X_2$  seien stochastisch unabhängig und im Intervall  $[1, 3]$  gleichverteilt. Berechnen Sie den Erwartungswert der Zufallsvariablen

$$Y = (X_2 + 2 \cdot X_1)^2$$

**Aufgabe 2:** Die Zufallsvariablen  $X_1$  und  $X_2$  seien stochastisch unabhängig und im Intervall  $[-1, 1]$  gleichverteilt. Berechnen Sie den Erwartungswert der Zufallsvariablen

$$Y = \frac{(X_2 - 5)^2}{\mathbb{V}(X_1)^2} \cdot \frac{X_1}{2}$$

**Aufgabe 3:** Sei  $B := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x \leq 2; 0 \leq y \leq 2\}$ . Skizzieren Sie  $B$  und geben Sie eine Konstante  $c$  an, so dass  $f(x, y) := c \cdot 1_B(x, y) \cdot (x + y^3)$  eine Dichte auf  $\mathbb{R}^2$  ist.

**Aufgabe 4:** Sei  $B := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1; 0 \leq y \leq 3 - 2x\}$ . Skizzieren Sie  $B$  und geben Sie eine Konstante  $c$  an, so dass  $f(x, y) := c \cdot 1_B(x, y) \cdot x^2 \cdot y$  eine Dichte auf  $\mathbb{R}^2$  ist.

**Aufgabe 5:** a) Seien  $X_1, \dots, X_n$  unabhängige, identisch verteilte Zufallsvariablen. Zeigen Sie, dass  $T_n := \sum_{i=1}^n \lambda_i X_i$  für beliebige Werte  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$  mit  $\lambda_1 + \dots + \lambda_n = 1$  einen erwartungstreuen Schätzer für  $\mu := \mathbb{E}(X_1)$  darstellt.