

# VJEROJATNOST I STATISTIKA

## Dodatni zadaci za 12. tjedan (23. i 24. predavanje)

### 11 Intervalne procjene

- Zadatak 1.**
- (a) Definirajte kvantil jedinične normalne razdiobe  $u_p$  reda  $p$ .
  - (b) Dokazite da za kvantile jedinične normalne razdiobe vrijedi  $u_p = -u_{1-p}$ .
  - (c) Odredite kojeg su reda kvantili  $u_p = -0.484$  i  $u_p = 0.484$ .
  - (d) Koristeći Tablicu 4. za kvantile normalne razdiobe izračunajte  $u_p$  za  $p = 0.2$ .
  - (e) Izračunajte kvantile  $u_p$  za  $p = 0.813$  i  $p = 0.233$  koristeći isključivo Tablicu 1. jedinične normalne razdiobe (za funkciju  $\Phi^*$ ).

- Rješenje.**
- (a) Općenito, kvantil reda  $p$  je realni broj  $x_p$  za koji vrijedi

$$F(x_p) = \int_{-\infty}^{x_p} f(t) dt = p.$$

Kvantil reda  $p$  jedinične normalne razdiobe označavamo s  $u_p$ , te je

$$\Phi(u_p) = \int_{-\infty}^{u_p} \varphi(t) dt = p.$$

- (b) Gustoća  $\varphi(t)$  jedinične normalne razdiobe je parna funkcija zbog čega vrijedi

$$1 - p = 1 - \int_{-\infty}^{u_p} \varphi(t) dt = \int_{u_p}^{\infty} \varphi(t) dt = \int_{-\infty}^{-u_p} \varphi(t) dt = \Phi(-u_p).$$

Budući da je  $u_{1-p}$  jedinstveni realni broj za kojeg vrijedi

$$\Phi(u_{1-p}) = \int_{-\infty}^{u_{1-p}} \varphi(t) dt = 1 - p,$$

zaključujemo da je  $u_{1-p} = -u_p$ .

- (c) Ovdje tražimo  $p$  takav da je  $p = \Phi(u_p)$ . U prvom dijelu je

$$p = \Phi(u_p) = \frac{1}{2}[1 + \Phi^*(u_p)] = \frac{1}{2}[1 + \Phi^*(-0.484)] = \frac{1}{2}[1 - \Phi^*(0.484)] = \frac{1}{2}[1 - 0.37161] = 0.3143,$$

dok je u drugom dijelu

$$p = \Phi(u_p) = \frac{1}{2}[1 + \Phi^*(u_p)] = \frac{1}{2}[1 + \Phi^*(0.484)] = 0.6857.$$

- (d) U Tablici 4. se ne pojavljuje vrijednost  $p = 0.2$ . Međutim, u (b) dijelu zadatka smo dokazali da vrijedi  $u_p = -u_{1-p}$ . Stoga je

$$u_{0.2} = -u_{0.8} = -0.84162.$$

- (e) Slično kao u (c) dijelu zadatka koristimo vezu između funkcija  $\Phi$  i  $\Phi^*$ , te definiciju kvantila  $p = \Phi(u_p)$ , a zatim čitamo odgovarajuću vrijednost iz Tablice 1. Za  $p = 0.813$  imamo

$$0.813 = \Phi(u_{0.813}) = \frac{1}{2}[1 + \Phi^*(u_{0.813})] \implies \Phi^*(u_{0.813}) = 0.626 \implies u_{0.813} = 0.889.$$

Za  $p = 0.233$  imamo

$$\begin{aligned} 0.233 = \Phi(u_{0.233}) &= \frac{1}{2}[1 + \Phi^*(u_{0.233})] \implies \Phi^*(u_{0.233}) = -0.534 \implies \Phi^*(-u_{0.233}) = 0.534 \\ &\implies -u_{0.233} = 0.729 \implies u_{0.233} = -0.729. \end{aligned}$$

**Zadatak 2.** Iz populacije koja se podvrgava normalnoj razdiobi sa standardnom devijacijom  $\sigma = 1$  i nepoznatim očekivanjem izvučen je uzorak volumena  $n = 16$ . Za koji nivo pouzdanosti  $p$  je duljina intervala povjerenja reda  $p$  za očekivanje jednaka 0.823?

**Rješenje.** Za nivo pouzdanosti  $p$ , interval povjerenja za očekivanje  $a$  normalne razdiobe uz poznatu disperziju  $\sigma^2$  je

$$\mathbf{P}\left(\bar{x} - u_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq a \leq \bar{x} + u_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = p,$$

gdje je  $\alpha = 1 - p$  nivo značajnosti. Duljina ovog intervala jednaka je

$$0.823 = 2u_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{1}{2}u_{1-\alpha/2}.$$

Iz  $u_{1-\alpha/2} = 1.646$  slijedi  $p = 0.9$ .

**Zadatak 3.** Broj pristiglih automobila na naplatne kućice je Poissonova slučajna varijabla  $\mathcal{P}(\lambda)$ . Bilježen je broj pristiglih automobila u svakom satu tijekom jednog dana i dobivena je srednja vrijednost  $\bar{x} = 66$ . Odredite 90%-tni interval povjerenja za parametar  $\lambda$ .

**Rješenje.** Interval povjerenja reda  $p$  za parametar  $\lambda$  Poissonove razdiobe je

$$\mathbf{P}\left(|\bar{x} - \lambda| < u_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\lambda}{n}}\right) = p.$$

Da bismo odredili rubove ovog intervala moramo riješiti kvadratnu nejednadžbu

$$(\bar{x} - \lambda)^2 < \frac{u_{1-\alpha/2}^2}{n} \lambda.$$

Ako uzmemo u obzir da je  $n = 24$ ,  $\bar{x} = 66$ ,  $p = 0.9$  i  $u_{1-\alpha/2} = u_{0.95} = 1.64485$ , dobivamo

$$(\lambda - 66)^2 < 0.1127\lambda,$$

odnosno

$$\lambda \in \langle 63.328, 68.784 \rangle.$$

**Zadatak 4.** Na uzorku od 200 vatrenih navijača, njih 108 je izjavilo da su zadovoljni izbornikovim izborom igrača za svjetsko prvenstvo u nogometu.

- Odredite 95% interval povjerenja za postotak zadovoljnih navijača.
- S kojom najvećom pouzdanošću (na temelju dobivenog uzorka) će najmanje polovica navijača biti zadovoljna izborom igrača za reprezentaciju?

- (c) Koliko najmanje navijača trebamo ispitati da s pouzdanošću 95% najmanje polovica navijača bude zadovoljna izborom igrača za reprezentaciju?

**Rješenje.** Vjerojatnost izračunata iz uzorka da navijač bude zadovoljan je

$$\hat{p} = \frac{108}{200} = 0.54.$$

Interval povjerenja reda  $p$  za vjerojatnost  $p_A$  događaja  $A$  je

$$\mathbf{P}(p_1 \leq p_A \leq p_2) = p,$$

pri čemu je

$$p_{1,2} = \hat{p} \mp u_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}.$$

- (a) Za  $u_{1-\alpha/2} = u_{0.975} = 1.95996$  i  $n = 200$  dobivamo

$$p_A \in [0.471, 0.609].$$

- (b) Trebamo pronaći  $p$  za koji je

$$\mathbf{P}(0.5 \leq p_A \leq p_2) = p.$$

Vrijedi

$$0.5 = p_1 = \hat{p} - u_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}},$$

odnosno,

$$u_{1-\alpha/2} = \frac{\hat{p} - 0.5}{\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}} = 1.135.$$

Sada je

$$1 - \alpha/2 = \Phi(u_{1-\alpha/2}) = \Phi(1.135) = \frac{1}{2}[1 + \Phi^*(1.135)] \implies p = 1 - \alpha = \Phi^*(1.135) = 0.74.$$

- (c) Polazimo od iste formule kao u (b) dijelu zadatka

$$p_1 = \hat{p} - u_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}},$$

ali uz poznate vrijednosti

$$p_1 = 0.5, \quad p = 0.95, \quad \alpha = 0.05, \quad u_{1-\alpha/2} = u_{0.975} = 1.95996$$

i nepoznati  $n$ . Nakon sređivanja i uvrštavanja dobivamo

$$n = \frac{u_{1-\alpha/2}^2}{\hat{p} - p_1} \hat{p}(1-\hat{p}) = 596.38.$$

Budući da se ovdje radi o broju ispitanika a  $p_1$  je veći kako  $n$  raste, uzimamo  $n = 597$ .