

Periodontal Disease and Mortality in Type 2 Diabetes

ARAMESH SAREMI, MD, ROBERT G. NELSON, MD, PHD, MARSHALL TULLOCH-REID, MB, BS, DSC, ROBERT L. HANSON, MD, MPH, MAURICE L. SIEVERS, MD, GEORGE W. TAYLOR, DMD, DRPH, MARC SHLOSSMAN, DDS, MS, PETER H. BENNETT, MB, FRCP, ROBERT GENCO, DDS, PHD, WILLIAM C. KNOWLER, MD, DRPH

DIABETES CARE 2005; 28: 27-32

DiabetesCare

- Prospektive longitudinale Studie über 11 (0,3-16) Jahre
- 628 Angehörige der Pima ≥ 35 Jahre mit Typ 2 Diabetes mellitus
- Einstufung der parodontalen Situation (Parodontitis) aufgrund von PSA und klinischer Untersuchung:
 - keine/mild: ≥ 15 Zähne, Median Knochenabbau (KA) $< 50\%$, Attachmentverlust (AL) < 1 mm
 - moderat: ≥ 15 Zähne, Median KA 50-75%, AL 2-5 mm
 - schwer: < 15 Zähne, Median KA $> 75\%$, AL ≥ 6 mm
- Hauptzielkriterium: Mortalität generell und aufgrund kardiovaskulärer Gründe

