第三章 金融数据处理及分析

目录

- 描述性统计量与参数分布估计
- 数据标准化及异常值处理
- 数据中性化
- 回归分析与方差分析
- 随机数与蒙特卡洛方法

描述性统计量与参数分布估计

描述性统计量

- 描述性统计量是用于**概括和总结数据集的重要统计指标**。
- 描述性统计量的作用主要有以下几个方面：
  - **帮助理解数据：**通过描述性统计量，可以快速了解数据的集中趋势、离散程度等特征，对数据有一个初步的认识。
  - **数据简化：**将大量的数据概括为几个关键的统计量，便于进行数据分析和比较。
  - **发现异常值：**通过观察描述性统计量中的极端值，可以发现数据中的异常值，以便进行进一步的检查和处理。
  - **为进一步分析做准备：**描述性统计量可以为后续的推断统计分析提供基础，例如在进行假设检验、回归分析等之前，通常先进行描述性统计分析。

描述性统计量

- 描述性统计量是用于**概括和总结数据集的重要统计指标**。



常见的描述性统计量

- **集中趋势**:
  - **均值**: 数据的平均值。
  - **中位数**: 将数据排序后处于中间的位置。
  - **众数**: 出现频率最高的数据值。
- **离散程度**:
  - **方差**: 数据偏离均值的平方和的平均值。
  - **标准差**: 方差的平方根。
  - **极差**: 数据集中最大值和最小值之差。
  - **变异系数**: 衡量变量观测值变异程度。



常见的描述性统计量

- 1. 方差 (Variance):
  - $\sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2$
- 2. 标准差 (Standard Deviation):
  - $\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}$
- 3. 极差 (Range):
  - Range $= x_{\text{max}} - x_{\text{min}}$
- 4. 变异系数 (Coefficient of Variation, CV):
  - CV $= \frac{\sigma}{\bar{x}} \times 100\%$

常见的描述性统计量

- 5. 偏度 (Skewness):
- 偏度是衡量分布不对称性的统计量。它反映了数据分布相对于均值的偏斜程度。如果分布偏向左侧或右侧，则称为左偏或右偏。
- $\text{Skewness} = \frac{n}{(n-1)(n-2)} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{x_i - \bar{x}}{\sigma} \right)^3$
- - 偏度为正时，表示分布右偏，右侧尾巴较长。
- - 偏度为负时，表示分布左偏，左侧尾巴较长。
- - 偏度为0表示分布大致对称。



常见的描述性统计量



In negatively skewed data, the **mean is a smaller number** than the median and mode.	In a normal distribution, the **mean is the same number** as the median and mode.	In positively skewed data, the **mean is a larger number** than the median and mode.

常见的描述性统计量

- 6. 峰度 (Kurtosis):
- 峰度衡量的是分布集中度（或尾部的厚度）。它反映了分布的尖锐程度，即相对于正态分布，数据的峰值是更尖锐还是更平坦。
- $\text{Kurtosis} = \frac{n(n+1)}{(n-1)(n-2)(n-3)} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{x_i - \bar{x}}{\sigma}\right)^4 - \frac{3(n-1)^2}{(n-2)(n-3)}$
- - 峰度为3表示分布称为中峰态，Mesokurtic。
- - 峰度大于3表示尖峰态 (Leptokurtic)，分布更尖锐且尾部较厚。
- - 峰度小于3表示平峰态 (Platykurtic)，分布更平坦且尾部较薄。



常见的概率分布

均匀分布

- 在一个特定的区间内，随机变量取任何值的可能性相等。若随机变量X在区间$[a,b]$上服从连续均匀分布，则其概率密度函数为

$$f(x)=\frac{1}{b-a}$$

- 在这个区间之外，概率密度为零。
- 对于离散均匀分布，假设随机变量Y取值为$\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$
- $P(Y=x_i)=\frac{1}{n}$，$i=1,2,\cdots,n$。



正态分布

- 正态分布，也称为高斯分布，是一种在自然界和社会科学中广泛出现的重要概率分布。其概率密度函数为：

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

- 其中，x是随机变量的值，μ是均值，决定了分布的中心位置；σ是标准差，决定了分布的离散程度。



t 分布

- 如果随机变量T服从t分布，其概率密度函数为

$$f(t)=\frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sqrt{\nu\pi}\,\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)}\left(1+\frac{t^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}}$$

- 其中t为随机变量的值，ν为自由度参数。
- 与正态分布相比，分布的形状更扁平，尤其是在自由度较低时。随着自由度的增加，分布逐渐接近正态分布



对数正态分布

- 若随机变量X服从对数正态分布，其概率密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

- μ和σ分别是$\ln(X)$的均值和标准差。



指数分布

- 果随机变量服从指数分布，其概率密度函数为

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$$

- $\lambda > 0$是分布的参数，称为率参数（rate parameter）。



Gamma分布

- 如果随机变量X服从 Gamma 分布，其概率密度函数为

$$f(x) = \frac{\beta^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x},$$

- α和β是两个参数，$\Gamma(\cdot)$是伽马函数。



Beta分布

- 如果随机变量X服从 Beta 分布，其概率密度函数为

$$f(x;\alpha,\beta)=\frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha,\beta)}$$

- 其中$x\in[0,1]$，α和β是两个正参数， Beta 函数表达式为：

$$B(\alpha,\beta)=\frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}$$



数据标准化及异常值处理

数据标准化

- **定义：**过特定的方法将数据的特征值转换到一个特定的范围或具有特定的分布，使得不同特征在进行分析时具有可比性和稳定性。
- **数据标准化的作用：**
  - **直观比较特征：**在金融数据分析中，经常需要比较不同特征之间的关系。经过标准化后，所有特征都被映射到相同的尺度上，可以更直观地比较各个特征对目标变量的贡献程度。
  - **增强特征解释性：**对于一些基于距离或相似度的算法，如 K 近邻算法和聚类算法，数据标准化可以使特征之间的距离或相似度计算更加合理。标准化后，距离或相似度的计算更加公平地考虑了各个特征，增强了算法结果的解释性。

数据标准化

- **在机器学习中：**
  - **加快收敛速度：**如果数据未标准化，不同特征可能具有不同的尺度，导致算法在优化过程中在某些特征方向上进展缓慢，而在其他特征方向上进展迅速，从而延长了收敛时间。
  - **提高模型精度：**许多机器学习模型对数据的尺度非常敏感。如果数据未标准化，具有较大尺度的特征可能会主导模型的学习过程，而较小尺度的特征可能被忽略。
  - **防止数值溢出：**未标准化的数据可能会使算法在计算过程中出现数值不稳定的情况，例如梯度爆炸或消失。

常用的数据标准化方法

- **Z-score 标准化**
- 计算公式为：
  - $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$
- 对数据的分布形状没有改变，只是将数据进行了平移和缩放，使得数据符合标准正态分布。





常用的数据标准化方法

- **离差标准化**（归一化）
- 计算公式为：

$$X_{norm} = \frac{X - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}$$

- 将数据的范围压缩到一个固定的区间内，通常是 [0,1] 区间，使得数据的取值范围更加明确。





常用的数据标准化方法

- **IQR方法：** 四分位距方法：
- 1. 将数据从小到大进行排序。
- 2. 确定第一四分位数（Q1）、二四分位数（Q2）和第三四分位数（Q3）。
    - $IQR = Q3 - Q1$
    - $Z = \frac{X - Q2}{IQR}$



常用的数据标准化方法

- **对数标准化：**对数据取对数来实现标准化。通常使用自然对数e为底。
  - $Y = \log(X)$

- 可以将数据的分布进行压缩，对于一些具有指数增长特性的数据非常有效。



常用的异常值处理方法

- **Winsorized 法：**即缩尾法，是一种减少异常值对数据集平均数影响的统计方法。
- 若采用上下各 5% 的 Winsorized 法，那么上截断点位于第 95 个百分位数处，下截断点位于第 5 个百分位数处。
- 将数据中小于下截断点的值替换为下截断点的值，将大于上截断点的值替换为上截断点的值。而处于上下截断点之间的数据保持不变。



常用的异常值处理方法

- **修剪法（Trimmed）：**这种方法涉及删除数据集中一定比例的最低和最高值，然后计算剩余数据的均值。
- 与Winsorized 不同，修剪均值直接移除极端值，而不是替换它们。



常用的异常值处理方法

- **IQR方法：** 四分位距方法：
  - $IQR = Q3 - Q1$
- 剔除小于$Q1 - 1.5 * IQR$的数据
- 剔除大于$Q3 + 1.5 * IQR$的数据



异常值处理的代价





ref: https://ndgigliotti.medium.com/trimming-vs-winsorizing-outliers-e5cae0bf22cb

数据中性化

数据中性化

- 数据中性化是指从数据集中删除或修改某些特定信息的过程，以确保数据能够客观、真实地反映事物的本来状态。
- 数据中性化的意义：
- 中性的数据能提供准确的信息，避免因数据偏差导致的错误判断和决策问题。
- 例如，在市场调研中，商品偏好会受到消费者群体的性别、年龄、地域显著影响。若在分析产品变量对真实需求影响时，不排除这些重要因子对分析造成的影响，企业可能会错误地判断市场需求，投入大量资源开发不受欢迎的产品。

数据中性化方法：回归法

- 确定因变量和自变量
  - 因变量：选择需要进行中性化处理的因子数据。
  - 自变量：将需要排除影响的数据作为自变量。
- 进行线性回归
  - 得到回归方程：y = a + bx，其中 y 是因变量（待中性化因子），x 是自变量（需要排除的影响），a 和 b 是回归系数。
- 计算残差
  - 残差 = 实际值 - 预测值。残差就是经过市值中性化处理后的数据，它消除了市值因素对原因子的影响。

数据中性化方法：均值方差法

- 均值方差法实际上是回归法对于0-1变量的简化版本。

- $y = bx + \epsilon$
- $\hat{b} = \frac{\sum_{i \in N} x_i y_i}{\sum_{i \in N} x_i x_i} = \frac{\sum_{i \in K} y_i}{K}$
- $\epsilon_i = y_i - \hat{b} x_i$

行业中性化

- # 按某列分组并计算均值
- grouped = df.groupby('Age').mean()

- # 多列分组并计算汇总统计
- grouped = df.groupby(['Age', 'Name'])['Salary'].sum()

练习1：数据分布分析及数据处理

- 分析收益率、市净率(pb)、总市值(mv)的数据分布类型，并对数据进行处理
- 步骤1：载入最后一期的收益率、市净率(pb)、总市值(mv)数据。
- 步骤2：计算数据的各项统计量指标，绘制上述数据的直方图，判断数据符合哪种类型的分布。
- 步骤3：基于数据的分布类型，选择正确的方法，对数据进行标准化处理。
- 步骤4：绘制标准化后的数据直方图，与原始数据的直方图进行对比。

练习2：pb因子的构建与分析

- pb因子简介：
- 在金融中，PB 即市净率（Price-to-Book Ratio），而 PB 因子就是基于市净率的一种投资分析因子。市净率指的是每股股价与每股净资产的比率。计算公式为：
  - 市净率 = 每股市价 / 每股净资产
- 市净率反映了公司股票的市场价值与账面价值之间的关系。市净率较低，意味着投资者可以用相对较低的价格买入公司的资产。这可能表明公司被低估，或者市场对公司的前景较为悲观。市净率较高，则说明投资者为获得公司的资产需支付较高的价格。可能意味着公司具有较强的竞争力和良好的发展前景，市场对其较为看好，但也可能存在高估的风险。

练习2：pb因子的构建与分析

- 注意：
- 很多行业的利润往往呈现周期性，在景气期间，行业的盈利水平高涨，使得行业市盈率大幅下降，而市净率的变化较小。采用市净率估值可以避免因盈利大幅变化导致的风格偏移问题。
- 不同行业的市净率水平差异较大，这是由于行业的特点和发展阶段不同所致。例如，传统制造业的市净率通常较低，因为这些行业的资产较重，盈利能力相对较弱；而高科技行业的市净率往往较高，因为这些行业具有较高的成长性和创新性，市场对其未来的盈利能力有较高的预期。因此，不同行业公司之间的pb因子往往不适合直接进行比较。

练习2：pb因子的构建与分析

- 因子分析目标:
- 分析pb因子与股票涨跌幅之间的相关性，从而指导投资组合构建的决策过程。

练习2：pb因子的构建与分析

- 步骤1，数据载入及因子计算：
  - 载入股票的成交额数据以及股票的市值数据
  - 将成交额数据以及股票的市值数据调整到周度频率
  - 计算每只股票的pb。计算公式为：
    - $\mathrm{pb} = \frac{\text{成交额}}{\text{市值}}$

练习2：pb因子的构建与分析

- 步骤2，数据的预处理：
  - **去极值：**将每期pb因子的截面数据采用winsor方法去极值。即，将超出$[\mu-3\sigma,\mu+3\sigma]$的数据重设为$\{\mu-3\sigma,\mu+3\sigma\}$
  - **标准化：**将去极值处理后的因子序列进行z-score标准化处理。即，减去其现在的均值、除以其标准差，得到一个新的近似服从N(0,1)分布的序列
  - **去空值：**得到新的因子暴露度序列后，将因子暴露度缺失的地方设为 0
  - **行业中性化：**对经过上述步骤处理后的因子值进行行业中性化处理

练习2：pb因子的构建与分析

- 步骤3，因子评价：
  - 以预处理后的t期pb因子作为解释变量，t+1期的收益率数据作为被解释变量，采用加权最小二乘回归（WLS），使用个股市值的平方根作为权重，旨在消除异方差性。
  - 评价指标：t 值序列绝对值平均值、t 值序列绝对值大于 2 的占比、t 值序列均值的绝对值除以 t 值序列的标准差

练习2：pb因子的构建与分析

- 步骤3，因子评价：
  - 计算因子 IC 值：因子的 IC 值是指因子在第 T 期的暴露度与 T+1 期的股票收益的相关系数，即

$$IC_d^T = \mathrm{corr}(R^{T+1}, d^T)$$

  - 其中，IC_d^T代表因子 d 在第 T 期的 IC 值，R^{T+1}代表所有个股第 T+1 期的收益率向量，d^T代 表所有个股第 T 期在因子 d 上的暴露度向量。
  - normal IC值：采用Spearman相关性系数计算的IC值
  - rank IC值：采用Pearson相关性系数计算的IC值
  - 评价指标： IC 值序列的均值大小、 IC 值序列的标准差、 IC 值累积曲线、 IC 值序列大于零的占比

练习2：pb因子的构建与分析

- 步骤4：可视化
  - 将上述评价指标绘制图表进行展示