
1.
$$\frac{2^{-2}}{4^{-1} + \frac{1}{m^{-1}}} = 13^{-1}$$

...

olduğuna göre, m kaçtır?

2.

$$2 \cdot (0,2)^3 + (0,4)^3$$
 işleminin sonucu kaçtır?

3.
$$\frac{1+\sqrt{a}}{1-a} - \frac{a}{1-\sqrt{a}} = \frac{5}{3}$$

olduğuna göre, a kaçtır?

- A) $\frac{1}{2}$
- B) $\frac{3}{2}$
 - C) $\frac{1}{4}$

4.

çıkarma işleminin sonucu kaçtır?

- A) 44
 - B) 36
- C) 34 D) 26
- E) 24

5. a ve b birer gerçel sayı olmak üzere,

$$a^2-a=b^2-b$$

 $a \cdot b = -1$

- olduğuna göre, a² + b² toplamı kaçtır?

- A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

6. x ve y gerçel sayıları için

$$2^X = 6^{X+y-1}$$

- olduğuna göre, 3^x in y türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
- A) 3^{1-y}
- B) 6^{1-y}
- C) 6^y
- D) 9^{-y}
- E) 9^{1+y}

7. x, y ve z gerçel sayıları için

$$x+y<0< x< y+z\\$$

olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

A)
$$x < y < z$$
 B) $x < z < y$ C) $y < x < z$

D)
$$y < z < x$$
 E) $z < y < x$

8.
$$a = \frac{x}{x - y}$$

$$b = \frac{y}{x + y}$$

olduğuna göre,
$$\frac{a+b-1}{a \cdot b}$$
 ifadesinin değeri kaçtır?

$$\frac{\left[(n+1)!\right]^2 + \left(n!\right)^2}{\left[(n+1)!\right]^2 - \left(n!\right)^2} = \frac{61}{60}$$

olduğuna göre, n kaçtır?

- A) 9 B) 10 C) 12 D) 13 E) 15

10. x ve y gerçel sayıları için

$$y - x = 1$$

$$y - |x - y| = 2$$

olduğuna göre, x+y toplamı kaçtır?

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

11.	X.	٧	ve	z	tam	sav	/ıları	icin

$$2x=3y=5z\\$$

olduğuna göre, x+y+z toplamının alabileceği değerlerden 100'e <u>en yakın</u> olanı kaçtır?

- A) 93
- B) 96 C) 98
- D) 103 E) 105

12.

$$A = 13 + 26 + 39 + \dots + 169$$

olduğuna göre, A'yı tam bölen asal sayıların toplamı kaçtır?

- - A) 16
- B) 18 C) 20
- D) 22

- 13. Bir A kümesi ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.
 - 6 ardışık tek doğal sayıdan oluşmaktadır.
 - Kümedeki elemanların toplamı, en büyük elemanın 4 katına eşittir.

Buna göre, A kümesinin en büyük elemanı nedir?

- A) 21
- B) 19
- C) 17 D) 15
- E) 13

14.

p:
$$\sqrt{3} + \sqrt{5} = \sqrt{8}$$

q:
$$\sqrt{5} - \sqrt{3} = \sqrt{2}$$

r:
$$\sqrt{3} \cdot \sqrt{5} = \sqrt{15}$$

önermeleri veriliyor.

Buna göre, aşağıdaki bileşik önermelerden hangisi doğrudur?

- A) $p \wedge (r \vee q)$
- B) $(p \lor q) \land r$
- C) $r \Rightarrow (b \lor d)$
- D) $p \lor (r \Rightarrow q)$

E)
$$p \Rightarrow (q \land r)$$

15.		n büyüğe	a, 2, b, 9 ve 6 doğru sıralar			
	Buna g	öre, b aş	şağıdakilerde	en hangisi	olamaz?	
	A) 1	B) 3	C) 5	D) 8	E) 10	
16.	a ve b p olmak ü		n sayılarının	en büyük	ortak böleni d	
	I. d ²	sayısı, a	a ² sayısını bö	öler.		
	II. d ²	sayısı, a	a ² + b sayısır	nı böler.		
	III. d ²	sayısı, a	a ² + b ² sayıs	ını böler.		
	ifadeler	inden ha	ngileri <u>her za</u>	<u>aman</u> doğı	rudur?	
	A) Yalnı	ız I	B) Yalnız II	C)	l ve III	
		D) II ve I	II	E) I, II ve	III	

0

17. $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ olmak üzere, $f : A \rightarrow A$ fonksiyonu bire birdir.

Buna göre,

$$f(1) + f(2) + f(3) + f(4)$$

toplamının alabileceği en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark kaçtır?

- A) 6
- B) 7

- C) 8 D) 9 E) 10

18. A = $\left\{1, \ 2, \ 3, \ 4, \ 5\right\}$ kümesi üzerinde tanımlı bir Δ işleminin tablosu aşağıda verilmiştir.

Δ	1	2	3	4	5
1	5 3 2 5	1	3	2	4
2	3	2	1	4	5
3	2	3	4	5	1
4	5	4	1	3	2
5	1	5	4	2	3

Ayrıca, $a \in A$ olmak üzere $M(a) = \{b \in A \mid a \triangle b = b \triangle a\}$ kümesi tanımlanıyor.

Buna göre, M(4) kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) {1, 2, 4} B) {1, 3, 5}
- C) {2, 3, 4}
- D) {2, 4, 5} E) {3, 4, 5}

19.	x ve	<u>ı iki basamaklı</u>	doğal say	yılar olmak	üzere,

$$x-y=65$$

eşitliğini sağlayan kaç tane x sayısı vardır?

- A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40

20. p bir asal sayı olmak üzere, p+2 sayısı asal oluyorsa veya p+2 sayısı iki asal sayının çarpımı biçiminde yazılabiliyorsa p'ye bir Chen asalı denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir Chen asalı değildir?

A) 37 B) 59 C) 67 D) 73 E) 83

I.
$$f(x) = 2x$$

II.
$$f(x) = 2^x$$

III.
$$f(x) = x^2$$

fonksiyonlarından hangileri, her a ve b gerçel sayısı için f(a+b) = f(a) • f(b) eşitliğini sağlar?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) II ve III

22. Ahmet'in maaşına Deniz'in maaşının yarısı kadar zam yapılırsa ikisinin maaşları toplamı, Ahmet'in başlangıçtaki maaşının 2 katı oluyor.

Ahmet'in maaşı A TL, Deniz'in maaşı D TL olduğuna göre, A ile D arasındaki ilişki nedir?

- A) 5A = 8D
- B) 5A = 6D
- C) 4A = 5D
- D) 3A = 4D
- E) 2A = 3D

23. Bir şirketin 2009, 2010 ve 2011 yıllarında elde ettiği kârların ortalaması 4 milyon TL'dir. Bu şirket 2012 yılında, 2011 yılına göre % 25 daha fazla kâr elde etmiş ve bu dört yılda elde edilen kârların ortalaması 4,5 milyon TL olmuştur.

Buna göre, şirket 2011 yılında kaç milyon TL kâr elde etmiştir?

A) 4,8 B) 5 C) 5,2 D) 5,4 E) 5,6

- 24. Bir laboratuvarda, erkek ve dişi kobay fareler üzerinde yapılan bir ilaç deneyi ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.
 - Erkek farelere her 12 saatte, dişi farelere ise her 8 saatte bir 1 adet tablet ilaç verilmiştir.
 - Erkek farelere 0,5 gramlık, dişi farelere ise
 1 gramlık tabletler verilmiştir.
 - Bu farelere bir günde toplam 85 gram ilaç,
 95 tablet hâlinde verilmiştir.

Buna göre, deneyde toplam kaç fare kullanılmıştır?

A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40

2013 -	YGS /	MAT
--------	-------	-----

25. Bir sınıftaki öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtılmak isteniyor. Bu sınıftaki 36 öğrencinin her birine birer adet kurşun kalem, kalemtıraş ve silgi düşecek kadar malzeme sınıfa getiriliyor. Ancak, dağıtım günü öğrencilerin bir kısmı sınıfta olmadığından sınıfta bulunan her bir öğrenciye 3 kurşun kalem, 2 kalemtıraş ve 1 silgi veriliyor.

Dağıtım sonunda bu malzemelerden toplam 42 adet arttığına göre, artan kalemtıraş sayısı kaçtır?

- A) 10
- B) 11
- C) 12
- D) 13
- E) 14

- 26. Eski bir uygarlığa ait takvimde,
 - 1 ayda 36 gün
 - 1 yılda 10 ay

bulunmaktadır.

Bu uygarlıkta, gün-ay-yıl sırasında verilen AB-CD-ABCD biçimindeki tarihlere "simetrik gün" ismi veriliyor.

Bu takvime göre, 20-08-2008 tarihinden <u>en az</u> kaç gün sonra yine bir simetrik gün olur?

- A) 360
- B) 396
 - C) 480
- D) 720

- **27.** Bir öğretmen; Ali, Banu, Can ve Doğa isimli dört öğrencisiyle birlikte sınıfta şöyle bir etkinlik yapmıştır.
 - Bu öğrenciler aklından birer sayı tutuyor. Bu sayılar sırasıyla A, B, C ve D olsun.
 - Her bir öğrenci kendi sayısını bir kâğıda yazıp öğretmene veriyor.
 - Öğretmen de tahtada yazılı olan aşağıdaki toplama işlemlerinin sonucunu hesaplıyor ve eşitliklerin sağ tarafını dolduruyor.

Tahtada yazılanlara göre, hangi öğrenciler tek başına A, B, C ve D sayılarının dördünü de bulmak için yeterli bilgiye sahiptir?

- A) Ali, Banu ve Doğa B) Ali, Can ve Doğa
- C) Ali ve Banu D) Banu ve Can
 - E) Can ve Doğa

28. 5 farklı bilyenin tamamı, yaşları farklı 3 kardeş arasında paylaştırılacaktır.

Bu kardeşlerden en büyüğü 1, diğer ikisi ise en az birer bilye alacak biçimde bu paylaşım kaç farklı şekilde yapılabilir?

- A) 45
- B) 50

- C) 60 D) 70 E) 75


29. Bir torbada 1'den 10'a kadar numaralandırılmış 10 top bulunmaktadır.

Bu torbadan rastgele çekilen iki topun numaraları toplamının 15 olduğu bilindiğine göre, 7 numaralı topun çekilmiş olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{2}{3}$
- B) $\frac{2}{5}$
- $C)\frac{2}{7}$

- $D)\frac{1}{2}$
- E) $\frac{1}{3}$

30. Aşağıda, yeterince uzun beş çubuktan oluşan bir abaküs verilmiştir. Abaküste; sırasıyla I. çubuğa 1 adet, II. çubuğa 2 adet ve benzer biçimde diğer çubuklara da numarası kadar boncuk takılıyor. Böylece birinci tur, şekildeki gibi tamamlanıyor.




Daha sonra başa dönülüp I. çubuğa 6 adet, II. çubuğa 7 adet ve benzer biçimde diğer çubuklara da bir önceki çubuğa takılanın bir fazlası kadar boncuk daha takılıyor. Her tur sonunda V. çubuktaki boncuk sayısının bir fazlası I. çubuğa takılarak turlara devam ediliyor.

Buna göre, takılacak olan 220'nci boncuk hangi çubukta yer alır?

- A) I.

- B) II. C) III. D) IV. E) V.


31. Aşağıda, bir ikizkenar dik üçgenden ve bu üçgenin hipotenüsünü çap kabul eden yarım çemberden oluşan bir koşu parkı gösterilmiştir. Bu parkta üç koşu yolu bulunmaktadır. Başlangıç noktasından aynı anda koşmaya başlayan Ayça A, Barış B, Cem ise C yolunu kullanarak bitiş noktasına varıyor.



Ayça, Barış ve Cem'in saatteki hızları sırasıyla 4 km, 2 km ve 3 km olduğuna göre, bitiş noktasına varış sırası aşağıdakilerden hangisidir?

1	2.	3.
A) Ayça	Barış	Cem
B) Ayça	Cem	Barış
C) Barış	Cem	Ayça
D) Barış	Ayça	Cem
E) Cem	Ayça	Barış

32. Aşağıdaki grafikte, beş kişinin boyları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.




Bu kişilerle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

- Ayşe ve Kemal aynı boydadır.
- Bora, Kemal'den 2 cm kısadır.
- Elif, Mehmet'ten 6 cm uzundur.
- Mehmet, Ayşe'den 3 cm uzundur.

Buna göre, bu kişilerin boy ortalaması kaç cm'dir?


- A) 164
- B) 165
- C) 166
- D) 167
- E) 168



Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir?

- A) 105
- B) 110
- C) 115
- D) 120
- E) 125


34. ABCD dikdörtgeni biçimindeki bir kâğıdın DC kenarı üzerinde bir E noktası ve AB kenarı üzerinde bir F noktası işaretleniyor. Bu kâğıt, EF doğrusu boyunca katlandığında AF ve EC şekildeki gibi dik kesişiyor.




Katlama işleminden sonra elde edilen şeklin alanı, katlama işleminden önceki alandan 18 birim kare az olduğuna göre, |AD| uzunluğu kaç birimdir?

- A) 3
- B) 4
- C) 6
- D) 8
- E) 9

35. Bir kenar uzunluğu a birim olan bir kare, yedisi eş toplam sekiz kareye ayrılıyor ve elde edilen büyük kare K₁ olarak adlandırılıyor (1. şekil). Daha sonra K₁ karesi de benzer biçimde ayrılıp K₂ karesi elde ediliyor (2. şekil).






K₂ karesi de benzer biçimde ayrıldığında elde edilen K₃ karesinin bir kenar uzunluğu 27 birim oluyor.

Buna göre, a kaçtır?

- A) 36
- B) 49
- C) 64 D) 81 E) 100



O merkezli çembere, dışındaki bir P noktasından teğet çizme yöntemi aşağıda verilmiştir.


- OP doğru parçası çizilir.
- OP doğru parçasının M orta noktası belirlenir.
- M merkezli [OP] çaplı çember çizilir.
- O ve M merkezli çemberlerin kesim noktaları işaretlenir. Bu noktalardan biri T olsun.
- [PT ışını, O merkezli çembere T noktasında teğettir.

Bu çizimde O ve M merkezli çemberlerin yarıçapları sırasıyla 4 cm ve 3 cm olduğuna göre, |PT| uzunluğu kaç cm'dir?

- A) 3√3
- B) 2√5
- C) √7

- D) 5
- E) 6


37. Yükseklikleri eşit, taban yarıçapları sırasıyla 2 metre ve 3 metre olan dik dairesel silindir biçimindeki iki depo başlangıçta boştur. Birim zamanda aynı miktarda su akıtan iki ayrı musluktan büyük depoya ait musluk açıldıktan 5 dakika sonra küçük deponun musluğu da açılıyor. Küçük deponun musluğu açıldığı anda büyük depodaki suyun yüksekliği 2 metredir.



Buna göre, küçük depoya su verilmeye başlandıktan kaç dakika sonra depolardaki suyun yüksekliği eşit olur?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5
- E) 6

38.



ABCDEF bir düzgün altıgen

|AL| = |LB||BC| = 4 cm


|DK| = 3 cm

|KL| = x

Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm'dir?

- A) 4√3
- B) 3√5
- C) 3√7

- D) 6
- E) 7




OABC bir paralelkenar

$$A = (5, 0)$$

$$C = (3, 4)$$

Yukarıdaki verilere göre, OABC paralelkenarının köşegen uzunlukları toplamı kaç birimdir?

40.



Şekildeki dik koordinat düzleminde verilen d ve e doğruları birbirine diktir.

Buna göre, d doğrusunun x eksenini kestiği noktanın apsisi kaçtır?

A)
$$\frac{9}{2}$$

B)
$$\frac{11}{2}$$

C)
$$\frac{13}{3}$$

D)
$$\frac{14}{3}$$

E)
$$\frac{25}{6}$$

3	TEMEL MATEMATİK TESTİ BİTTİ. FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ.