

# Теорвер. ДЗ 2.

ПРОХОРОВ ЮРИЙ, 776

## Задача 1

Сначала сформулируем вспомогательное утверждение на языке теории меры. Пусть

- $\mathcal{E}$  —  $\sigma$ -алгебра на множестве  $X$ ,
- $\mu : \mathcal{E} \rightarrow (0, +\infty)$  — конечная счетно-аддитивная мера, т.е.  $0 < \mu(X) < \infty$ ,
- $\{D_i\}_{i=1}^\infty \subset \mathcal{E}$  — дизъюнктное покрытие  $X$ ,  $\mu(D_i) > 0$ .

Пусть  $A \in \mathcal{E}$  — произвольное. Тогда  $\{A \cap D_i\}_{i=1}^\infty$  — дизъюнктное покрытие  $A$ . В силу счетной аддитивности получаем

$$\mu(A) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A \cap D_i).$$

При  $X = \Omega$ ,  $\mathcal{E} = \mathcal{F}$ ,  $\mu = \mathbb{P}$  получаем **формулу полной вероятности**.

Пусть  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  — исходное вероятностное пространство (из условия). События  $\{B_i\}$ ,  $C$  тоже даны по условию. Положим

$$X = C, \quad \mu = \mathbb{P}_C = \mathbb{P}\{\cdot \mid C\}, \quad \mathcal{E} = \mathcal{F}_C = \{F \cap C \mid F \in \mathcal{F}\}, \quad D_i = B_i \cap C,$$

то есть  $(C, \mathcal{F}_C, \mathbb{P}_C)$  — условное вероятностное пространство. Применим к нему полученное выше утверждение:  $\forall A \in \mathcal{F}$  ( $A \cap C \in \mathcal{F}_C$ ) выполнено:

$$\mathbb{P}\{AC\} = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}\{AB_iC\}$$

$$\mathbb{P}\{A \mid C\} \cdot \mathbb{P}\{C\} = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}\{A \mid B_iC\} \cdot \mathbb{P}\{B_iC\} = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}\{A \mid B_iC\} \cdot \mathbb{P}\{B_i \mid C\} \cdot \mathbb{P}\{C\}$$

Делим на  $\mathbb{P}\{C\} > 0$  и получаем:

$$\mathbb{P}\{A \mid C\} = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}\{A \mid B_iC\} \cdot \mathbb{P}\{B_i \mid C\}$$

## Задача 2

Обозначим события:

- $\circ$  — добавили белый шар,
- $\bullet$  — добавили черный шар,
- $A$  — вытащили белый шар.

По формуле Байеса:

$$\mathbb{P}\{\circ \mid A\} = \frac{\mathbb{P}\{A \mid \circ\} \cdot \mathbb{P}\{\circ\}}{\mathbb{P}\{A\}}$$

Знаменатель расписываем по формуле полной вероятности:

$$\mathbb{P}\{\circ \mid A\} = \frac{\mathbb{P}\{A \mid \circ\} \cdot \mathbb{P}\{\circ\}}{\mathbb{P}\{A \mid \circ\} \cdot \mathbb{P}\{\circ\} + \mathbb{P}\{A \mid \bullet\} \cdot \mathbb{P}\{\bullet\}} = \frac{1 \cdot \frac{1}{2}}{1 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}} = \frac{2}{3}.$$

### Задача 3

Обозначим события:

- $C$  — первые  $k$  шаров белые,
- $A$  —  $(k+1)$ -ый шар белый,
- $B_i$  — выбрана  $i$ -ая урна ( $i = 0, \dots, m$ ),  $\mathbb{P}\{B_i C\} > 0$  при  $i \geq 1$ .

По формуле из задачи 1:

$$\mathbb{P}\{A \mid C\} = \sum_{i=1}^m \mathbb{P}\{A \mid B_i C\} \cdot \mathbb{P}\{B_i \mid C\}$$

По формуле Байеса и формуле полной вероятности:

$$\mathbb{P}\{B_i \mid C\} = \frac{\mathbb{P}\{C \mid B_i\} \cdot \mathbb{P}\{B_i\}}{\mathbb{P}\{C\}} = \frac{\mathbb{P}\{C \mid B_i\} \cdot \mathbb{P}\{B_i\}}{\sum_{j=0}^m \mathbb{P}\{C \mid B_j\} \cdot \mathbb{P}\{B_j\}} = \frac{\left(\frac{i}{m}\right)^k \cdot \frac{1}{m+1}}{\sum_{j=0}^m \left(\frac{j}{m}\right)^k \frac{1}{m+1}} = \frac{i^k}{\sum_{j=1}^m j^k} = \frac{i^k}{1^k + 2^k + \dots + m^k}$$

Тогда искомая вероятность:

$$\mathbb{P}\{A \mid C\} = \sum_{i=1}^m \frac{i}{m} \cdot \frac{i^k}{1^k + \dots + m^k} = \frac{1}{m} \cdot \frac{1^{k+1} + \dots + m^{k+1}}{1^k + \dots + m^k}$$

Найдем ее предел при  $m \rightarrow \infty$ . Воспользуемся порядком роста следующей суммы:

$$\sum_{i=1}^m i^k \sim \frac{m^{k+1}}{k+1}$$

Тогда

$$\mathbb{P}\{A \mid C\} = \frac{1}{m} \cdot \frac{1^{k+1} + \dots + m^{k+1}}{1^k + \dots + m^k} \sim \frac{1}{m} \cdot \frac{m^{k+2}}{k+2} \cdot \frac{k+1}{m^{k+1}} = \frac{k+1}{k+2} = 1 - \frac{1}{k+2} \quad \text{при } m \rightarrow \infty$$