

Seminar 5

1. Justificati afirmatiile

- i) $\frac{1}{n+1} < \ln(n+1) - \ln n < \frac{1}{n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$
- ii) Sirul $c_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n$ este convergent.

2. Determinati multimea punctelor de acumulare A' pentru

- a) $A = \left\{ \frac{1}{2^n} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$
- b) $A = \mathbb{Q}$

3. Verificati daca functiile urmatoare isi ating valorile extreme si determinati aceste valori

- a) $f : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = \ln \frac{1-x}{1+x}$
- b) $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & x = 0 \\ x, & x \in (0, 1] \end{cases}$
- c) $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = x\sqrt{1-x^2}$

4. (**caracterizarea monotoniei cu ajutorul derivatei**) Fie $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ o functie derivabila pe (a, b) . Au loc afirmatiile

- a) f este crescatoare pe $(a, b) \iff f'(x) \geq 0, \forall x \in (a, b)$
- b) f este descrescatoare pe $(a, b) \iff f'(x) \leq 0, \forall x \in (a, b)$
- c) Daca $f'(x) > 0, \forall x \in (a, b) \implies f$ este strict crescatoare pe (a, b)
- d) Daca $f'(x) < 0, \forall x \in (a, b) \implies f$ este strict descrescatoare pe (a, b)

In general, reciprocele afirmatiilor c) si d) nu sunt adevarate. Justificati.

5. Determinati punctele de extrem local ale functiilor de la exercitiul 3.

6. Folosind regula lui l'Hopital, calculati limitele

- a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e - (1+x)^{\frac{1}{x}}}{x}$
- b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^\alpha}{e^x}, \quad \alpha \in \mathbb{R}$

Regula lui l'Hopital. Fie $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}, V \subseteq \mathbb{R}$ o vecinatate a lui x_0 si $f, g : V \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}$ doua functii avand proprietatile:

- i) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ (sau $+\infty$)
- ii) f, g sunt derivabile pe $V \setminus \{x_0\}$
- iii) $g'(x) \neq 0, \forall x \in V \setminus \{x_0\}$
- iv) $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l \in \overline{\mathbb{R}}$

atunci $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = l$.

Exercitii suplimentare

1. Determinati multimea punctelor de acumulare A' pentru
 - a) $A = \left\{ \frac{n!}{3^n} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$
 - b) $A = (0, 1) \setminus \mathbb{Q}$
2. Fie $A \subseteq \mathbb{R}$ si $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ o functie avand urmatoarele proprietati
 - i) f este derivabila pe A
 - ii) $\exists q < 1$ astfel incat $|f'(x)| \leq q, \forall x \in A$
 - iii) $\exists a \in A$ astfel incat $f(a) = a$.Definim recursiv sirul $x_{n+1} = f(x_n), \forall n \in \mathbb{N}$ si $x_0 \in A$. Justificati afirmatiile
 - a) $|x_{n+1} - a| \leq q|x_n - a|, \forall n \in \mathbb{N}$
 - b) (x_n) este sir convergent si are limita a .Construiti o functie si un sir neconstant cu proprietatile de mai sus.
3. Determinati punctele de extrem local si valorile extreme ale functiilor
 - a) $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = |x|(1-x)$
 - b) $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = \frac{|\ln x|}{\sqrt{x}}$
4. Folosind regula lui l'Hopital, calculati limitele
 - a) $\lim_{x \searrow 0} (\cos \sqrt{x})^{\frac{1}{x}}$
 - b) $\lim_{x \searrow 0} x^\alpha \ln(\sin x), \quad \alpha > 0$