

Seminar 11

1. Calculati derivatele partiale de ordinul 1, gradientul ∇f si diferenciala df pentru functiile

a) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y, z) = x^2 y^3 + y \sin x - 2z$

b) $f : (0, \infty)^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = \operatorname{arctg} \frac{x-y}{x+y}$

c) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = x\sqrt{x^2 + y^2}$

2. Aratati ca functia $f(x, y) = y \ln(x^2 - y^2)$ verifica relatia

$$\frac{1}{x} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{y} \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{f}{y^2}, \quad \forall x > y > 0$$

3. Studiati existenta derivatelor partiale in origine si a derivatelor dupa directie in origine pentru

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & , (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

4. Calculati derivatele partiale ale functiei compuse $g \circ f$, unde $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) = (xe^y + xe^{-y}, xe^y - xe^{-y})$ si $g = g(u, v) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ este o functie oarecare de clasa C^1 pe \mathbb{R}^2 .

5. Exprimati ecuatia

$$u \frac{\partial g}{\partial u}(u, v) + v \frac{\partial g}{\partial v}(u, v) = \sqrt{u^2 + v^2}, \quad \forall (u, v) \in (0, \infty)^2$$

in variabilele $(x, y) \in (0, \infty) \times (0, \pi/2)$, efectuand transformarea $u = x \cos y, v = x \sin y$. Determinati apoi o functie g de clasa C^1 ce verifica relatia respectiva.

6. Calculati derivatele partiale de ordinul 2 ale functiilor

a) $f : (1, \infty) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = \ln(x + y^2 - 1)$

b) $f : \mathbb{R} \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = xy e^{\frac{x}{y}}$

Exercitii suplimentare

1. Calculati derivatele partiale de ordinul 1, gradientul ∇f si diferenciala df pentru functiile

- a) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = \sin^2(x^3 + y)$
 b) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y, z) = (x + y + z)e^{x^2+y^2+z^2}$

2. Calculati matricea Jacobi $J(f)$ in punctul $(1, 1)$ pentru urmatoarele functii vectoriale

- a) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x, y) = (x^2 - y, 3x - 2y, 2xy + y^2)$
 b) $f : (0, \infty)^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (\frac{1}{xy}, \operatorname{arctg} \frac{y}{x})$

Functii omogene. Fie $p \in \mathbb{R}$. O functie $f : (0, \infty)^m \rightarrow \mathbb{R}$ se numeste omogena (de grad p) daca $f(tx) = t^p f(x)$, $\forall x \in (0, \infty)^m$ si $\forall t > 0$.

3. Aratati ca functia $f : (0, \infty)^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y, z) = \frac{1}{x+y+z} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right)$ este omogena (de un anumit grad) si justificati egalitatea

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} = -2f, \quad \forall (x, y, z) \in (0, \infty)^3$$

4. Aratati ca functia de mai jos nu este continua in $(0, 0)$, dar admite derivate dupa orice directie in acest punct

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x+y} & , x+y \neq 0 \\ 0 & , x+y = 0 \end{cases}$$

5. Calculati derivatele partiale ale functiei compuse $g \circ f$, unde $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x, y) = (x^2 - y, 3x - 2y, 2xy + y^2)$ si $g = g(u, v, w) : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ este o functie oarecare de clasa C^1 pe \mathbb{R}^3 .

6. Exprimati ecuatia

$$v \frac{\partial g}{\partial u}(u, v) - u \frac{\partial g}{\partial v}(u, v) = 1, \quad \forall (u, v) \in (0, \infty)^2$$

in variabilele $(x, y) \in (0, \infty) \times (0, \pi/2)$, efectuand transformarea $u = x \cos y$, $v = x \sin y$. Determinati apoi o functie g de clasa C^1 ce verifica relatia respectiva.

7. Aratati ca functia $f(x, y) = (x^2 + y^2) \operatorname{arctg} \frac{y}{x}$ verifica relatia

$$x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2f, \quad \forall (x, y) \in (0, \infty)^2$$