Теория алгоритмов

Практика

Владимир Анатольевич Судаков

2026 г.

Правила

- Решение домашнего задания (ДЗ) нужно приносить на следующее занятие. Если решение – это программа, то присылайте ссылку на github.
- Лучше не полное решение ДЗ, чем его отсутствие.
- Можно и нужно спрашивать по почте и на занятии. Лучше если вопрос будет коротким.
- У нас будут контрольные, но когда – заранее неизвестно
- Опоздание больше 15 минут – пропуск.
- За активность/ответы на занятиях будут дополнительные плюсы.
- Вовремя решенные ДЗ, контрольные без ошибок, и не более 2-х пропусков – автомат на экзамене

Давайте познакомимся

- Дано:
  - список группы ФИО через пробел по строкам
- Требуется найти повторения имен:
  - вывести по строкам ФИО<пробел><число повторений имени>
- Какая группа «хорошая»?
- Давайте сравним решения (и Ваши и LLM):
  - по каким метрикам будем сравнивать?
- Какая LLM хорошая?

Задача о паросочетаниях (stable matching problem)

Подбор больниц для студентов медицинских вузов

- Цель. Имея набор предпочтений среди больниц и студентов медицинских вузов, разработать процесс приема.
- Неустойчивая пара. Больница h и студент s образуют неустойчивую пару, если оба: h отдает предпочтение s перед одним из принятых студентов. s отдает предпочтение h перед назначенной больницей.
- Стабильное распределение. Распределение без нестабильных пар. Естественное и желательное состояние.

Дано

- Входные данные: множество из n больниц H и множество из n студентов S (пока считаем, что больница берет одного только студента). Каждая больница h ранжирует студентов. Каждый студент s ранжирует больницы.

favorite ↓ least favorite ↓

	1st	2nd	3rd
Atlanta	Xavier	Yolanda	Zeus
Boston	Yolanda	Xavier	Zeus
Chicago	Xavier	Yolanda	Zeus

hospitals' preference lists

favorite ↓ least favorite ↓

	1st	2nd	3rd
Xavier	Boston	Atlanta	Chicago
Yolanda	Atlanta	Boston	Chicago
Zeus	Atlanta	Boston	Chicago

students' preference lists

Идеальное паросочетание

	1st	2nd	3rd
Atlanta	Xavier	Yolanda	Zeus
Boston	Yolanda	Xavier	Zeus
Chicago	Xavier	Yolanda	Zeus

	1st	2nd	3rd
Xavier	Boston	Atlanta	Chicago
Yolanda	Atlanta	Boston	Chicago
Zeus	Atlanta	Boston	Chicago

Нестабильные пары

	1st	2nd	3rd
Atlanta	Xavier	Yolanda	Zeus
Boston	Yolanda	Xavier	Zeus
Chicago	Xavier	Yolanda	Zeus

	1st	2nd	3rd
Xavier	Boston	Atlanta	Chicago
Yolanda	Atlanta	Boston	Chicago
Zeus	Atlanta	Boston	Chicago

A–Y is an unstable pair for matching M = { A–Z, B–Y, C–X }

Тест 1

- Какая пара является неустойчивой в паросочетании { A–X, B–Z, C–Y }?
- **A.** A–Y.
- **B.** B–X.
- **C.** B–Z.
- **D.** Ни один из перечисленных вариантов.

	1st	2nd	3rd
Atlanta	Xavier	Yolanda	Zeus
Boston	Yolanda	Xavier	Zeus
Chicago	Xavier	Yolanda	Zeus

	1st	2nd	3rd
Xavier	Boston	Atlanta	Chicago
Yolanda	Atlanta	Boston	Chicago
Zeus	Atlanta	Boston	Chicago

Домашнее задание

- Напишите программу которая определяет является ли паросочетание устойчивым
- Вход – таблицы предпочтений и паросочетания.
- Выход – ответ: Устойчивое или Неустойчивое.

Упражнение 1

- Имеется город, в котором n мужчин и n женщин пытаются вступить в брак. У каждого мужчины имеется список предпочтений, содержащий оценки всех женщин, а у каждой женщины — список предпочтений с оценками всех мужчин.
- Множество всех $2n$ людей разделено на две категории: хорошие люди и плохие люди. Предположим, для некоторого числа k ($1 \leq k \leq n - 1$) имеются k хороших мужчин и k хороших женщин; следовательно, существует n-k плохих мужчин и n-k плохих женщин.
- Каждый участник предпочитает любого хорошего человека любому плохому человеку. Формально каждый список предпочтений обладает тем свойством, что оценка любого хорошего человека противоположного пола выше оценки любого плохого человека противоположного пола: первые к позиций в нем занимают хорошие люди (противоположного пола) в некотором порядке, а затем идут n-k плохих людей (противоположного пола) в некотором порядке.
- Покажите, что в каждом устойчивом паросочетании каждый хороший мужчина вступает в брак с хорошей женщиной.

Упражнение 2

Решите, является ли приведенное ниже утверждение истинным или ложным. Если оно истинно, приведите короткое объяснение; если ложно — приведите контрпример:

1. В любой конфигурации задачи устойчивых паросочетаний существует устойчивое паросочетание, содержащее пару (m, w), в котором m находится на первом месте в списке предпочтений w, а w находится на первом месте в списке предпочтений m.

2. Допустим, имеется конфигурация задачи устойчивых паросочетаний с мужчиной m и женщиной w, для которых m находится на первом месте в списке предпочтений w, а w находится на первом месте в списке предпочтений m. В этом случае в каждом устойчивом паросочетании S для этой конфигурации пара (m, w) принадлежит S.

Упражнение 3

Существует много ситуаций, в которых можно задавать вопросы, относящиеся к некой разновидности принципа «устойчивости». В следующем примере используется формулировка, основанная на конкуренции между двумя компаниями.

Допустим, имеются две телевизионные сети; назовем их A и B. Также доступны n программных окон в течение времени массового просмотра, а каждая сеть проводит n телевизионных передач. Каждая сеть хочет создать расписание — схему распределения передач по разным окнам, чтобы обеспечить себе как можно большую долю рынка.

Следующий способ поможет сравнить, насколько хорошо две сети справляются со своей задачей, исходя из их расписания. У каждой передачи имеется фиксированный рейтинг, основанный на количестве людей, посмотревших передачу в прошлом году; будем считать, что рейтинги двух передач никогда не совпадают. Сеть выигрывает заданное окно, если передача, которую она ставит в это окно, обладает более высоким рейтингом, чем передача в расписании других сетей для этого окна. Цель каждой сети — захватить как можно больше окон.

Допустим, в первую неделю осеннего сезона сеть A публикует расписание S, а сеть B — расписание T. На основе этой пары расписаний каждая сеть захватывает некоторые окна в соответствии с приведенным выше правилом. Пара расписаний (S, T) будет называться устойчивой, если ни одна из сетей не может в одностороннем порядке изменить свое расписание и получить дополнительные окна. Иначе говоря, не существует расписания S' такого, что сеть A с парой (S', T) получит больше окон, чем с парой (S, T). По соображениям симметрии также не существует расписания T', с которым сеть B со своей парой (S, T') захватит больше окон, чем с парой (S, T).

Аналогия вопроса Гейла и Шепли для подобной устойчивости выглядит так: можно ли утверждать, что для каждого множества телепередач и оценок всегда существует устойчивая пара расписаний? Чтобы ответить на этот вопрос, сделайте одно из двух:

(а) приведите алгоритм, который для любого множества передач и связанных с ними оценок строит устойчивую пару расписаний;

или

(б) приведите пример множества передач и связанных с ними оценок, для которого не существует устойчивой пары расписаний.

Упражнение 4

Гейл и Шепли опубликовали свою статью о задаче устойчивых паросочетаний в 1962 году; однако разновидность их алгоритма к тому времени уже почти 10 лет использовалась Национальной программой распределения студентов- медиков по больницам. По сути, ситуация выглядела так: было т больниц, в каждой из которых имелось некоторое количество вакансий. Также было п студентов-медиков, которые получали диплом и были заинтересованы в поступлении в одну из больниц. Каждая больница строила оценки студентов в порядке предпочтения, и каждый студент строил оценки больниц в порядке предпочтения. Будем считать, что количество выпускников превышает количество доступных вакансий в т больницах. Естественно, задача заключалась в поиске способа связывания каждого студента не более чем с одной больницей, при котором были бы заполнены все вакансии во всех больницах. (Так как предполагается, что количество студентов превышает количество вакансий, некоторые студенты не будут приняты ни в одну из больниц.)

Распределение студентов по больницам называется устойчивым, если не встречается ни одна из следующих ситуаций:

1. Неустойчивость первого типа: имеются студенты s и s', а также больница h, для которых:

- s назначается в h,
- s' не назначается ни в одну больницу,
- h предпочитает s' студенту s.

2. Неустойчивость второго типа: имеются студенты s и s', а также больницы h и h', для которых:

- s назначается в h,
- s' назначается в h',
- h предпочитает s' студенту s,
- s предпочитает h больнице h'.

Фактически ситуация повторяет задачу устойчивых паросочетания, если не считать того, что 1) в больницах обычно открыто более одной вакансии и 2) студентов больше, чем вакансий.

Покажите, что всегда существует устойчивое распределение студентов по больницам, и приведите алгоритм поиска такого распределения.

Упражнение 5

Могут ли мужчина или женщина улучшить свое положение, солгав относительно своих предпочтений?

Допустим, что у каждого участника имеется истинный порядок предпочтений. Теперь рассмотрим женщину w. Предположим, w предпочитает мужчину m мужчине m', но и m и m' находятся на нижних позициях ее списка предпочтений. Может ли случиться так, что переключение порядка m и m' в списке предпочтений (например, ложным утверждением о том, что она предпочитает m' мужчине m) и выполнением алгоритма с ложным списком предпочтений w окажется в паре с мужчиной m'', которого она в действительности предпочитает как m, так и m' ?

Тот же вопрос можно задать и для мужчин, но в контексте нашего упражнения мы ограничимся женщинами.

Чтобы ответить на этот вопрос, сделайте одно из двух:

(а) приведите доказательство того, что для любого множества списков предпочтений изменение порядка следования пары в списке предпочтений не сможет улучшить статус партнера женщины в алгоритме Гейла-Шепли;

или

(б) приведите пример множества списков предпочтений, для которых существует изменение порядка следования пары, способное улучшить статус партнера женщины.