

Носовые в афроазиатских языках

На выборке из 100 языков удалось найти следующие носовые: *m*, *n*, *ɲ* (основные) и *ɲ^w*, *n^j*, *m^w*, *ɲ* (встретились реже).

Редкие носовые (ареальное и генеалогическое сходство)

ɲ: встретился в двух языках – Gedeo и Burji, которые относятся к одной ветви и при этом распространены недалеко друг от друга;

m^w: всего в 1 языке (Marghi Central);

n^j: Dass и Orma, не работает ни ареальный принцип, ни генеалогический (один язык относится к чадским, другой к кушитским);

ɲ^w: Iraqw и Psikye – та же ситуация, что и с *n^j*; Awngi + Bilin + Hamatanga + Qimant – и ареальное, и генеалогическое сходство (кушитские); Lamang + Miya + Bana – то же самое (чадские). При этом две вышеописанные группы языков ареально и генеалогически не близки.

Часто встречающиеся носовые (ареальное и генеалогическое сходство)

ɲ: для набора носовых *m*, *n*, *ɲ* всё так же, как с *ɲ^w* (группа чадских и группа кушитских),

для *m*, *n*, *ɲ*, *ɲ* – так же, за исключением языка Tamasheq (берберский), но он близок по ареальному принципу, находится рядом с группой чадских языков с тем же набором носовых;

ɲ: набор *m*, *n*, *ɲ* характерен для кушитских языков + языка Lele, относящегося к чадским;

m + n: такой набор фонем встречается на севере Африки (берберские), а также ближе к Азии (семитские), в некоторых чадских (Mbuko, Majera и др. распространённые рядом с ними), так же редко в кушитских (Somali, Afar), относительно рядом с которыми есть семитские (Geez, Sebar Bet Gurage).

В общем, картографирование носовых показывает, что кушитские и чадские часто делят одинаковые инвентари носовых, находясь территориально далеко друг от друга. А для семитских + берберских более характерен минимальный набор носовых (*m*, *n*).

