药品说明书

尼莫地平片

【药品名称】通用名称：尼莫地平片
【英文名称】Nimodpin Tablets
【汉语拼音】Nimodiping Pian
【成　　分】本品主要成份为尼莫地平。其化学名称为:2,6-二甲基-4（3-硝基苯基）-1，4-二氢-3,5-批淀二甲酸-2-甲氧乙基-（1-甲乙基）脂。
【性　　状】本品为淡黄色片。
【适 应 症】适用于各种原因的蛛网膜下隙出血后的脑血管痉挛和急性脑血管病恢复期的血液循环改善。
【规　　格】20mg
【用法用量】
（1）缺铁性脑血管病：口服每日 30~120mg，分 3 次服用，连用一个月。
（2）偏头痛：口服一次 40mg，一日 3 次，12 周为一疗程，对血管性、紧张性和丛集性以及混合型头痛等均能减轻疼痛程度，减少发作频率和持续时间，并能防止先兆症状的出现。
（3）蛛网膜下腔出血所以其的脑血管痉挛：口服一次 40~60mg，一日 3~4 次，3~4 周为一个疗程，如需手术的患者，手术当天停药，以后可以继续服用。
（4）突发性耳聋：口服一日 40~60mg，分三次服用，5 天为一疗程，一般用药 3~4 个疗程。
（5）轻、中度高血压病：高血压病合并有上述脑血管病者，可优先选用。口服开始一次 40mg，一日 3 次，一日最大剂量为 240mg。
【不良反应】大量临床实践证明，蛛网膜下腔出血者应用尼莫地平治疗时约有 11.2%的病者出现不良反应。最常见的不良反应有：
（1）血压下降，血压下降的程度与药物剂量有关。
（2）肝炎。
（3）皮肤刺痛。
（4）胃肠道出血。
（5）血小板减少。
（6）偶见一过性头晕、头痛、面潮红、呕吐、胃肠不适等。此外，口服尼莫地平以后，个别病人可发生碱性磷酸酶(ALP)、乳酸脱氢酶(LDH)、AKP 的升高，血糖升高以及个别人的血小板数的升高。
【禁　　忌】药物可由乳汁分泌，哺乳妇女不宜应用.
【注意事项】
（1）脑水肿及颅内压增高患者须慎用。
（2）尼莫地平的代谢产物具有毒性反应，肝功能损害者应当慎用。
（3）本品可引起血压的降低。在高血压合并蛛网膜下隙出血或脑卒中患者中，应注意减少或暂时停用降血压药物，或减少本品的用药剂量。
（4）可产生假性肠梗阻，表现为腹胀、肠鸣音减弱。当出现上述症状时应当减少用药剂量和保持观察。
（5）避免与β-阻断剂或其他钙拮抗剂合用。
【药物相互作用】
（1）与其他作用于心血管的钙离子拮抗剂联合应用时可增加其他钙离子拮抗剂的效用。

（2）当尼莫地平 90mg/日与西咪替丁 1000mg/日联合应用 1 周以上者，尼莫地平血药浓度可增加 50%，这可能与肝内细胞色素 P450 被西咪替丁抑制了尼莫地平代谢有关。

【贮　　藏】避光，密封保存。

【包　　装】固体药用塑瓶包装，每瓶 50 片。

【有 效 期】36 个月

【执行标准】《中国药典》2005 年版二部

【批准文号】国药准字 H14022821

【生产企业】亚宝药业集团股份有限公司

左炔诺孕酮片（毓婷）

产品名称：左炔诺孕酮片

英文名称：Levonorgestrel Tablets

商品名：毓婷

生产单位：北京紫竹药业有限公司

生产地址：北京朝阳区朝阳北路 27 号

规格：0.75mg

剂型：片剂

产品类别：化学药品

批准日期：2002-08-16

【通用名称】左炔诺孕酮片

【拼音名】Zuoquenuoyuntong Pian

【性状】左炔诺孕酮片为白色片。

【药物组成】左炔诺孕酮片每片含主要成分左炔诺孕酮 0.75 毫克。辅料为乳糖、淀粉、蔗糖、羧甲基淀粉钠、硬脂酸镁。

【作用类别】左炔诺孕酮片为口服避孕药类非处方药药品。

【药理作用】左炔诺孕酮片为速效、短效避孕药，避孕机制是显著抑制排卵和阻止孕卵着床，并使宫颈黏液稠度增加，精子穿透阻力增大，从而发挥速效避孕作用。

【适应症】左炔诺孕酮片用于女性紧急避孕，即在无防护措施或其他避孕方法偶然失误时使用。

【用法用量】在无防护性性生活或避孕失败 72 小时以内，服药越早，预防效果越好，单次口服 2 片；或者首次服 1 片，间隔 12 小时服第 2 片。

【注意事项】

1.本品是用于避孕失误的紧急补救避孕药，不是引产药。

2.左炔诺孕酮片不宜作为常规避孕药，服药后至下次月经前应采取可靠的避孕措施。

3.如服药后 2 小时内发生呕吐反应，应立即补服 1 片。

4.左炔诺孕酮片可能使下次月经提前或延期，如逾期 1 周月经仍未来潮， 应立即到医院检查，以排除妊娠。

5.对左炔诺孕酮片过敏者禁用。

6.乳腺癌、生殖器官癌，肝功能异常或近期有肝病或黄疸史。静 脉血栓病，脑血管意外、高血压、心血管病、糖尿病，高脂血 症、精神抑郁患者以及 40 岁以上妇女禁用。

7 左炔诺孕酮片性状发生改变时禁止使用。

8.请将此药品放在儿童不能接触的地方。

【不良反应】偶有轻度恶心、呕吐，一般不需处理、可自行消失，如症状较重应向医帅咨询。

【药物相互作用】如正在使用其他药品，尤其是苯巴比妥。苯妥英钠、利福平、卡马西平。大环内酯类抗生素，咪唑类抗真菌药。西咪替丁以及抗病毒药等，使用本品前请咨询，医师或药师。
【贮藏条件】避光，密封保存。
【规格】0.75 毫克
【包装】2 片/板/盒
【有效期】五年
批准文号：国药准字 H10983129
产品批号：见包装
生产日期：见包装
生产企业：北京紫竹药业有限公司
地址：北京市朝阳区朝阳路 27 号

蟾麝救心丸

【药品名称】蟾麝救心丸
【成　　份】牛黄 麝香 珍珠 蟾酥 红参 三七 冰片 猪胆膏 广角 赭石 水牛角浓缩物 丹参提取物
【性　　状】本品为深棕色小水丸，味苦而后有持久的麻辣感
【规　　格】10 粒重 0.22g
【功能主治】扩张冠状动脉，改善心肌供氧，增强心脏功能等作用。用于冠心病引起的心绞痛、胸闷、气短和眩晕等症。
【用法用量】口服，一次 2～3 粒，一日 3 次。
【注意事项】小儿及孕妇忌服。
【贮　　藏】密封
【包　　装】27 粒/瓶
【批准文号】国药准字 Z22022831
【生产企业】通化金恺威药业有限公司

消炎止痢灵片（优维尔）

【药品名称】消炎止痢灵片
【成　　份】苦参，甲氧苄啶。
【性　　状】本品为糖衣片，除去糖衣后显棕色；味苦。
【功能主治】清热燥湿，抗菌消炎。用于菌痢，胃肠炎等。
【用法用量】口服，一次 4~6 片，一日 3 次。
【不良反应】尚不明确。
【禁　　忌】尚不明确。
【注意事项】尚不明确。
【贮　　藏】密封。
【包　　装】铝塑包装，每板 10 片，每盒 2 板。
【有 效 期】24 个月
【批准文号】国药准字 Z23022049
【生产企业】龙晖药业有限公司

复方土槿皮酊

【药品名称】通用名称：复方土槿皮酊
【汉语拼音】Fufang Tujinpi Ding
【成　　份】土槿皮、苯甲酸、水杨酸。辅料为乙醇。
【性　　状】本品为棕红色的透明溶液。
【功能主治】杀菌，止痒。适用于趾痒、皮肤滋痒、一般癣疾。
【规　　格】每瓶装 15 毫升（每 1 毫升的总酸量为 187.5 毫克）
【用法用量】外用。在塑料瓶内塞顶部用针插一小孔，将药液挤出涂患处，一日 1~2 次。
【不良反应】尚不明确
【禁　　忌】儿童、孕妇禁用。水疱型、糜烂型手足癣禁用。
【注意事项】

1.本品为外用药，禁止内服。
2.忌烟酒、辛辣、油腻及腥发食物。
3.切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃出禁用。本品避免与铁器接触。
4.哺乳期妇女慎用。因糖尿病、肾病、肝病、肿瘤等疾病引起的皮肤瘙痒，不属本品适应范围。
5.本品不适用于糜烂型脚湿气及伴有继发感染（化脓）者。
6.涂药部位如有烧灼感，瘙痒加重或红肿，应停止使用，洗净，必要时向医师咨询。
7.本品对皮肤有一定刺激性，用于股癣时特应注意，不宜使药液接触要阴囊、外阴等皮肤细薄处，较长时间使用可使皮肤剥脱。
8.用药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。
9.对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。
10.对本品性状发生改变时禁止使用。
11.请将本品放在儿童不能接触的地方。
12.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。
【贮　　藏】密封。
【包　　装】药用塑料瓶包装。每瓶装 15 毫升。
【有 效 期】30 个月。
【执行标准】部颁中药成方制剂第十七册 WS3-B-3269-98
【批准文号】国药准字 Z44020858
【生产厂家】广州敬修堂(药业)股份有限公司

葡萄糖酸钙锌口服液

【保健品名称】葡萄糖酸钙锌口服液
【主要原料】葡萄糖酸钙、葡萄糖酸锌、葡萄糖、柠檬酸、山梨酸钾、水、食用橙味香精。
【标志性成分及含量】每瓶含：钙 156mg；锌 2.2mg。
【保健功能】补充钙、锌。
【适宜人群】需要补充钙、锌者。
【食用方法及食用量】每日 3 次，每次 1 瓶，摇匀后直接饮用。
【注意事项】

1.本品不能代替药物。

2.不宜超过推荐量或与同类营养素补充剂同时食用。

【产品规格】10ml/瓶

【包装规格】10ml×12 支。

【批准文号】国食健字 G20060298

【执行标准】Q/12WQ4646

【卫生许可证号】津卫食证字（2006）第 120100--健 00003 号

【保质期】24 个月

【贮藏方法】密封，置阴凉干燥处。

【生产单位】天津和治药业有限公司

红霉素软膏

【药品名称】

通用名称：红霉素软膏

英文名称：Erythromycin Ointment

汉语拼音：Hongmeisu Ruangao

【成　　份】本品每克含红霉素 10 毫克。辅料为：凡士林、液状石蜡。

【性　　状】本品为白色至黄色乳膏。

【适 应 症】本品用于脓疱疮等化脓性皮肤病、小面积烧伤、溃疡面的感染和寻常痤疮。

【规　　格】 1%

【用法用量】 局部外用，取本品适量涂于患处，一日 2 次。

【不良反应】偶见刺激症状和过敏反应。

【禁　　忌】尚不明确。

【注意事项】

1、避免接触眼睛和其他黏膜（如口、鼻等）。

2、用药部位如有烧灼感、瘙痒、红肿等情况应停药，并将局部药物洗净，必要时向医师咨询。

3、孕妇及哺乳期妇女应在医师指导下使用。

4、对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5、本品性状发生改变时禁止使用。

6、请将本品放在儿童不能接触的地方。

7、儿童必须在成人监护下使用。

8、如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】

1、与氯霉素及林可霉素有拮抗作用，应避免合用。

2、如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【贮　　藏】密封，在阴凉（不超过 20℃）干燥处保存。

【 包　　装】本品采用铝塑复合软管包装， 10 克/支/盒。

【有 效 期】24 个月

【执行标准】《中国药典》2005 年版二部

【批准文号】国药准字 H42021726

【生产企业】马应龙药业集团股份有限公司

阿昔洛韦片

【药品名称】 阿昔洛韦片
【成份】 本品主要成分为阿昔洛韦。其化学名为 9-（2-羟乙氧甲基）鸟嘌呤。
【性状】 本品为白色片。
【适应症】

1.单纯疱疹病毒感染：用于生殖器疱疹病毒感染初发和复发病例，对反复发作病例口服本品用作预防。

2.带状疱疹：服用于免疫功能正常者带状疱疹和免疫缺陷者轻症病例的治疗。

3.免疫缺陷者水痘的治疗。

【规格】 0.1g
【用法用量】
口服

1.生殖器疱疹初治和免疫缺陷者皮肤粘膜单纯疱疹：成人常用量一次 0.2g，一日 5 次，共 10 日；或一次 0.4g，一日 3 次，共 5 日；复发性感染一次 0.2g，一日 5 次，共 5 日；复发性感染的慢性抑制疗法，一次 0.2g，一日 3 次，共 6 个月，必要时剂量可加至一日 5 次，一次 0.2g，共 6～12 个月。

2.带状疱疹：成人常用量一次 0.8g，一日 5 次，共 7～10 日。

【不良反应】
偶有头晕、头痛、关节痛、恶心、呕吐、腹泻、胃部不适、食欲减退、口渴、白细胞下降、蛋白尿及尿素氮轻度升高、皮肤瘙痒等，长程给药偶见痤疮、失眠、月经紊乱。
【禁忌】 对本品过敏者禁用。
【注意事项】

1.对更昔洛韦过敏者也可能对本品过敏。

2.脱水或已有肝、肾功能不全者需慎用。

3.严重免疫功能缺陷者长期或多次应用本品治疗后可能引起单纯疱疹病毒和带状疱疹病毒对本品耐药。如单纯疱疹患者应用阿昔洛韦后皮损不见改善者应测试单纯疱疹病毒对本品的敏感性。

4.随访检查：由于生殖器疱疹患者大多易患子宫颈癌，因此患者至少应一年检查一次，以早期发现。

5.一旦疱疹症状与体征出现，应尽早给药。

6.进食对血药浓度影响不明显。但在给药期间应给予患者充足的水，防止本品在肾小管内沉淀。

7.生殖器复发性疱疹感染以间歇短程疗法给药有效。由于动物实验曾发现本品对生育的影响及致突变，因此口服剂量与疗程不应超过推荐标准。生殖器复发性疱疹的长程疗法也不应超过 6 个月。

8.一次血液透析可使血药浓度减低 60%，因此血液透析后应补给一次剂量。

9. 本品对单纯疱疹病毒的潜伏感染和复发无明显效果，不能根除病毒。

【药物相互作用】

1. 与齐多夫定（Zidovudine）合用可引起肾毒性，表现为深度昏睡和疲劳。

2. 与丙磺舒竞争性抑制有机酸分泌,合并用丙磺舒可使本品的排泄减慢,半衰期延长,体内药物量蓄积。

【贮藏】 密封保存。
【包装】 铝塑板包装，12 片/板×2 板/盒。

【有效期】 24 个月。
【执行标准】 《中国药典》2010 年版二部。
【批准文号】 国药准字 H19994080
【生产企业】 南京瑞尔医药有限公司

托吡卡胺滴眼液

【药品名称】
通 用 名：托吡卡胺滴眼液
英 文 名：Tropicamide Eye Drops
汉语拼音：Tuobika'an Diyanye
【成　　份】本品主要成份为托吡卡胺，其化学名称为 N-乙基-N- （4-吡啶甲基）-α-（羟基甲基）-苯乙酰胺
【性　　状】本品为无色澄明液体。
【适 应 症】用于滴眼散瞳和调节麻痹。
【规　　格】6ml:15mg
【药理毒理】
本品为抗胆碱药，能阻滞乙酰胆碱引起的虹膜括约肌及睫状肌兴奋作用。其 0.5%溶液可引起瞳孔散大;1%溶液可引起睫状肌麻痹及瞳孔散大。
【药代动力学】
本品系托品酸的合成衍生物。具有较低的解离常数，眼内通透性良好，组织扩散力强，可能是其起始迅速，维持时间短的原因。本品 0.5%、1％溶液滴眼后 20-30 分钟内散瞳及调节麻痹作用达高峰。随后作用逐渐降低，调节麻痹（残余的）2～6 小时。散瞳（残余的）约 7 小时。本品的睫状肌调节麻痹作用强度与剂量密切相关，其 0.25%、0.5%、0.75%和 1%四种浓度均有调节麻痹作用。滴眼后，最大残余调节度数分别为 0.25% 3.17 屈光度、1% 1.30 屈光度。残余调节度数能保持在 2.0 屈光度或以下者，0.75%和 1%溶液可维持 40 分钟，0.5%约为 15 分钟。1%溶液一滴滴眼后隔 5~25 分钟再滴第二次，能获得更满意的睫状肌麻痹作用约 20~30 分钟。经 2~6 小时能阅读书报，调节功能于 6 小时内恢复至滴药前水平。
【用法用量】
滴眼剂 0.5%溶液滴眼，一次一滴，间隔 5 分钟滴第二次。
【不良反应】
本品 0.5%溶液滴眼 1~2 次，每次一滴的不良反应罕见，1%溶液可能产生暂时的刺激症状。因本品为类似阿托品的药物，故可使闭角型青光眼眼压急剧升高，也可能激发未被诊断的闭角型青光眼。
【禁　　忌】
闭角型青光眼者禁用；婴幼儿有脑损伤、痉挛性麻痹及先天愚型综合征者反应强烈应禁用。
【注意事项】
1.为避免药物经鼻粘膜吸收，滴眼后应压迫泪囊部 2~3 分钟。
2.如出现口干、颜面潮红等阿托品样毒性反应应即停用，必要时予拟胆碱类药物解毒。
【孕妇及哺乳期妇女用药】尚不明确。
【儿童用药】婴幼儿对本品的不良反应极为敏感，药物吸收后可引起眼局部皮肤潮红、口干等。
【老年患者用药】
高龄者容易产生类阿托品样毒性反应，也有可能诱发未经诊断的闭角型青光眼，一经发现

应即停药。
【药物相互作用】 尚不明确。
【贮　　藏】 密封保存。
【包　　装】 塑料瓶；6ml
【有 效 期】 二年
【批准文号】 国药准字 H42021101
【生产企业】 武汉五景药业有限公司

复方桐叶烧伤油

【药品名称】复方桐叶烧伤油
【成　　份】桐叶、麻油。
【性　　状】本品为深黄绿色油状液体；气微。
【功能主治】清热解毒，消肿止痛，祛腐生肌。用于面积小于 29%的 II 度烧烫伤。
【用法用量】用棉球将药涂于患处，或用浸透药液的纱布敷于创面，一日 3 次。
【规　　格】每瓶装 30ml。
【不良反应】尚不明确。
【禁　　忌】尚不明确。
【注意事项】

1.创面分泌物较多者，或深 II 度烧伤用药过程中创面出现浅黄绿色液化物时，均每日用生理盐水清洗创

面 1 次。分泌物明显减少后停止清洗，可用棉球将分泌物清除后局部涂药。涂药以局部保持湿润状态，

不流为度，创面暴露；或用浸透药业的单层纱布覆盖创面，但不能包扎。

2.创面有化脓，或者全身感染症状，应选用对细菌敏感的抗生素。

3.有水、电解质平衡乱着请及时采用相应补液及纠正电解质平衡的处理措施。

【药理毒理】药效学实验表明，本品能促进家兔蒸汽烫伤和烧伤以及豚鼠火焰烧伤创面的愈合；抑制小鼠烫伤性水肿的形成。
【贮　　藏】密封，置阴凉处保存。
【包　　装】玻璃瓶；每瓶装 30ml。
【有 效 期】24 个月
【批准文号】国药准字 Z20063825
【专 利 号】ZL 99 1 15472 X　国际专利主分类号 A61K 35/78
【生产企业】湘西宏成制药有限责任公司

来源：商康医药网 www.3kw.com