常用药说明书

1、氨咖黄敏胶囊

【曾用名】速效伤风胶囊、速效感冒胶囊

【成份】 本品每粒含对乙酰氨基酚 250 毫克，咖啡因 15 毫克，马来酸氯苯那敏 1 毫克，人工牛黄 10 毫克。

【性状】 本品为胶囊剂，内容物为着色颗粒和粉末。

【适应症】 用于缓解普通感冒及流行性感冒引起的发热、头痛、鼻塞、咽痛等症状。

【药物相互作用】 1.本品不应与含有巴比妥类、苯妥英钠及氯霉素同服。 2.长期服用本品或与其他解热镇痛药同服有增加肾毒性之危险。 3.如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物毒理】 本品中对乙酰氨基酚能抑制前列腺素合成，有解热镇痛作用；咖啡因为中枢兴奋药，能增强对乙酰氨基酚的解热镇痛效果，并减轻其他药物所致的嗜睡、头晕等中枢抑制作用；马来酸氯苯那敏为抗组胺药，能减轻流涕、鼻塞、打喷嚏症状；人工牛黄具有解热镇惊作用。

【用法用量】 口服，成人，一次 1～2 粒，一日 3 次。

【不良反应】 偶见粒细胞、血小板减少、厌食、恶心、呕吐、

【禁忌】 1.对本品过敏者禁用。 2.孕妇、哺乳期妇女禁用。 3.活动性消化道溃疡患者禁用。

【 注意事项 】 1.用药 3～7 天，症状未缓解，请咨询医师或药师。 2.儿童用量请咨询医师或药师。 3.服用本品期间禁止饮酒或含有酒精的饮料。 4.肝、肾功能不全者慎用。 5.孕妇及哺乳期妇女慎用。 6.驾驶机、车、船、从事高空作业、机械作业者工作期间慎用。 7.儿童必须在成人监护下使用。 8.当本品性状发生改变时禁用。 9.请将此药品放在儿童不能接触的地方。

2、金莲清热泡腾片

【成 份】 金莲花、大青叶、石膏、知母、地黄、玄参、苦杏仁（炒）。

【性 状】 本品为棕黄色至棕褐色的片；味酸甜，微苦。

【适 应 症】 清热解毒，利咽生津，止咳祛痰。主治外感热证。症见高热，口渴，咽干，咽痛，咳嗽，痰稠，也可适用于流行性感冒，上呼吸道感染见有上述症候者。

【用法用量】 加水适量，泡腾溶解后口服，成人一次 2 片，一日 4 次。高烧时每四小时服一次。小儿一岁以下每次一片，一日 3 次；1-15 岁每次 1-2 片，一日 4 次。高烧时每四小时一次。

【注意事项】 虚寒泄泻者不宜服用。

3、红霉素肠溶胶囊

【用法用量】口服，成人一日 1～2g，分 3～4 次服用。

【适应症】主要用于金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌、其他链球菌属等 G+敏感菌引起的扁桃体炎、肺炎、猩红热、白喉及带菌者、淋病等感染；也可用于流感杆菌引起的上呼吸道感染（如耳、鼻、咽喉感染等）、金葡菌引起的皮肤及软组织感染、梅毒、肠道阿米巴病等。本品可作为军团病、支原体肺炎等的首选药物。

【注意事项】肝、肾功能不全者，孕妇、哺乳期妇女慎用。

4、感冒疏风片

【作用类别】本品为感冒类非处方药药品。

【成　份】麻黄绒、桂枝、苦杏仁、白芍(酒炙)、防风、紫苏叶、独活、桔梗、谷芽(炒)、生姜(捣碎)、大枣(去核)、甘草。？

【功能主治】辛温解表，宣肺和中。用于风寒感冒，发热咳嗽，头痛怕冷，鼻流清涕，骨节酸痛，四肢疲倦。

【规　格】每片相当于原药材 1 克

【用法用量】口服，一次 4 片，一日 2 次。

【注意事项】1.忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。 2.不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。 3.风热感冒者不适用，其表现为发热明显，汗出，口渴，咽喉肿痛，咳吐黄痰。4.肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。 5.高血压、心脏病患者

慎用。 6.服药三天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。 7.小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。 8.对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。 9.本品性状发生改变时禁止使用。 10.儿童必须在成人监护下使用。 11.请将本品放在儿童不能接触的地方。 12.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

5、复方苦木消炎分散片

【产品功效】：清热解毒、燥湿止痢、用于细菌性痢疾、急性肠炎及各种急性感染性疾患。也可用于风热感冒，咽喉肿痛。

【成 分】：穿心莲、苦木

【性 状】：本品为糖衣片，除去糖衣后，显褐色绿色；味苦。

【用法用量】：口服，一次 2-3 片，一日 3-4 次。

【其他说明】：1、本品为纯中药制剂的新型广谱抗菌消炎药，并具有抗病毒、增强免疫等多重功效，被誉为绿色抗菌素。 2、对多种病症的治疗具有疗程短，见效快的特点，且无任何毒副作用及不良反应，对使用其它抗生素无效的炎症，服用本品仍有明显的效果。

6、咽炎片

【产品功效】：咽炎片为喉痹类非处方药药品，该品为圆形糖衣片；除去糖衣后显棕褐色；微苦、辛。养阴润肺，清热解毒，清利咽喉，镇咳止痒。用于慢性咽炎引起咽干，咽痒，刺激性咳嗽。

【成份】 玄参、百部（制）、天冬、牡丹皮、麦冬、款冬花（制）、木蝴蝶、地黄、板蓝根、青果、蝉蜕、薄荷油。辅料为硬脂酸镁、桃胶、滑石粉、蔗糖、色素（柠檬黄、靛蓝）、虫白蜡。

【性状】 该品为圆形糖衣片；除去糖衣后显棕褐色；微苦、辛。

【用法用量】 口服，一次 5 片，一日 3 次。

【禁忌】1、忌辛辣、鱼腥食物。 2、孕妇慎用。 3、服药七天后症状无改善，或出现其他症状，应去医院就诊。 4、按照用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。 5、对该品过敏者禁用，过敏体质者慎用。 6、药品性状发生改变时禁止服用。 7、儿童必须在成人的监护下使用。 8、请将此药品放在儿童不能接触的地方。 9、如正在服用其他药物，使用该品前请咨询医师或药师。

7、腹可安片

【作用类别】本品为内科泄泻类非处方药药品。

【成分】扭肚藤、火炭母、车前草、救必应、石榴皮。

【方解】由 5 味药组成。本方用于湿热内阻、脾失健运、胃失和降所致呕吐、腹痛、腹泻、暖腐吞酸、舌苔厚腻等症。方中救必应清热解毒，利湿止痛，扭肚藤、火炭母清热利湿，共为主药；车前草利水渗湿，通利小便为辅药；石榴皮收敛固涩为佐药。诸药合用，共奏清热解毒、利水渗湿、收敛止痛之功。

【功能主治】清热利湿，收敛止痛。用于消化不良引起的腹痛，腹泻，呕吐。 【用

法用量】口服，一次 4 片，一日 3 次。

【注意事项】1．饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。2．不宜在服药期间同时服用滋补性中药。3．有慢性结肠炎、溃疡性结肠炎便脓血等慢性病史者，患泄泻时应去医院就诊。4．有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。5．服药 3 天症状未缓解，应去医院就诊。6．儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。7．对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。8．药品性状发生改变时禁止服用。9．儿童必须在成人监护下使用。10．请将此药品放在儿童不能接触的地方。11．如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

8、藿香正气液

处方：苍术 160g 陈皮 160g 厚朴（姜制）160g 白芷 240g 茯苓 240g 大腹皮 240g 生半夏 160g 甘草浸膏 20g 广藿香油 1.6ml 紫苏叶油 0.8ml

功能与主治：

【暑热感冒功效】祛暑解表.清热生津,适用于发热重,恶寒轻,汗出热不退,心烦口渴,小便赤,苔黄,脉数等症.可用于夏季 一般感冒.流行性感冒.乙型脑炎初起等. 发热重.心烦口渴.汗多热不退是 主证,可首选此药.

【暑湿感冒功效】清暑去湿.芳香化浊,适用于外感风寒引起 的感冒,胸闷呕吐,腹泻便溏,发热不畅. 四正丸功效:祛暑解表.消食化浊.

【治小儿痱子】六个月以内小儿，藿香正气液加水，按 1:4 比例；6 个月-2 岁，按 1:2

比例；2 岁以上，按 1:1 比例。清水拭净患处，以混合液外擦，效果良好。

【治小儿腹泻】纱布或棉球用藿香正气液浸湿，贴敷肚脐，效果良好，尤其夏秋腹泻。

用法与用量：口服，一次 5～10ml，一日 2 次，用时摇匀。

注意事项：1.饮食宜清淡。 2.不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。 3.有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者、孕妇或正在接受其它治疗的患者，均应在医师指导下服用。 4.服药三天后症状未改善，或出现吐泻明显，并有其他严重症状时应去医院就诊。 5.按照用法用量服用，小儿、年老体虚者应在医师指导下服用。 6.长期服用应向医师咨询。 7.药品性状发生改变时禁止服用。 8.儿童必须在成人的监护下使用。 9.请将此药品放在儿童不能接触的地方。 10.如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

9、双黄连胶囊

【功效主治】 用于外感风热引起的发热,咳嗽,咽痛。辛凉解表,清热解毒。

【化学成分】 金银花，黄芩，连翘。辅料为：淀粉。

【用法用量】 口服，一次 4 粒，一日 3 次。

【注意事项】

1.忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。 2.不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。 3.风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，鼻塞流清涕，口不渴，咳吐稀白痰。

4.有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者、孕妇或正在接受其它治疗的患者，均应在医师指导下服用。 5.服药三天后，症状无改善，或出现发热咳嗽加重，并有其他症状如胸闷、心悸等时应去医院就诊。 6.按照用法用量服用，小儿、年老体虚者应在医师指导下服用。 7.连续服用应向医师咨询。 8.对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。 9.本品性状发生改变时禁止使用。 10.儿童必须在成人监护下使用。 11.请将本品放在儿童不能接触的地方。 12.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

10、三九胃泰胶囊

【功效主治】 清热燥湿，行气活血，柔肝止痛，消炎止痛，理气健脾。用于上腹隐痛，饱胀，反酸，恶心，呕吐，纳减，心口嘈杂。

【化学成分】 白芍、地黄、茯苓、黄芩、九里香、两面针、木香、三叉苦。辅料为滑石粉。

【药物相互作用】

1 对实验性胃炎各类病变有显著治疗作用和预防效果，有显著的止血和抗溃疡功效。 2 对精神紧张引起的胃肠功能紊乱有积极治疗和预防功效。 3 有促进胃合成蛋白质作用，并有抑制和吸附胃蛋白酶作用，有利于胃溃疡创面的修复。 4 能显著地促进胸腺核蛋白、胸腺 RNA、脾脏 RNA 的合成，故有增强免疫功能和免疫调节作用，从而有利于慢性胃炎的康复。

【产品规格】 每粒装 0.5 克

【用法用量】 口服，一次 2～4 粒，一日 2 次。

【注意事项】

1.忌食辛辣刺激性食物。 2.忌情绪激动或生闷气。 3.浅表性、糜烂性、萎缩性等慢性胃炎应在医师指导下服用。 4.孕妇慎用。 5.慢性胃炎患者服药二周症状无改善，应立即停药并去医院就诊。 6.按照用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。 7.对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。 8.本品性状发生改变时禁止使用。 9.儿童必须在成人监护下使用。 10.请将本品放在儿童不能接触的地方。 11.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

11、复方盐酸伪麻黄碱缓释胶囊（新康泰克）

本品为复方制剂，每粒含盐酸伪麻黄碱 90 毫克; 马来酸氯苯那敏(扑尔敏)4 毫克。

辅料为：淀粉、蔗糖、羟丙基甲基纤维素、乙基纤维素聚合物、欧巴代黄色干喷料、欧巴代粉红色干喷料。

【性状】 本品为内装粉色和黄色小丸的胶囊。

【药理作用】本品为缓解感冒症状的复方制剂。其中盐酸伪麻黄碱为拟肾上腺素药，具有收缩上呼吸道毛细血管，消除鼻咽部粘膜充血，减轻鼻塞症状的作用；马来酸氯苯那敏为抗组胺药，能进一步减轻感冒引起的鼻塞、流涕、打喷嚏等症状。本品内容物中既含有速释小丸，也含有能在一定时间内发挥作用的缓释小丸，其有效浓度可维持 12 小时。

【适应症】 本品可减轻由于普通感冒、流行性感冒引起的上呼吸道症状和鼻窦炎、枯

草热所致的各种症状，特别适用于缓解上述疾病的早期临床症状，如打喷嚏、流鼻涕、鼻塞等症状。

【用法用量】口服，成人每 12 小时服 1 粒，24 小时内不应超过 2 粒。

【禁忌】严重冠状动脉疾病、有精神病史者及严重高血压患者禁用。

【注意事项 】

1. 本品一日剂量不得超过 2 粒，疗程不超过 3-7 天。症状未缓解者请咨询医师。

2. 对本品中任一组分过敏者禁用。

3. 驾驶机动车、船、操作机器以及高空作业者工作期间禁用。

4. 服用本品期间禁止饮酒。

5. 不能同时服用含有与本品成份相似的其他抗感冒药。

6. 心脏病、高血压、甲状腺疾病、糖尿病、前列腺肥大等患者使用本品前请咨询医师或药师。

7. 孕妇及哺乳期妇女慎用。

8. 肝、肾功能不全者慎用。

9. 勿过量服药，如过量服药或发生严重不良反应时请立即去

10. 当本品性状发生改变时禁用。

11. 儿童用量请咨询医师或药师。

12. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

新康泰克 - 药物相互作用

1.本品不宜与氯霉素、巴比妥类、解痉药、酚妥拉明、洋地黄苷类药物并用。

2.如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【不良反应】可见困倦、头晕、口干、胃部不适、乏力、大便干燥等。

【规格】本品为复方制剂,每粒含盐酸伪麻黄碱 90 毫克,马来酸氯苯那敏 4 毫克。

12、众生丸

【性 状】本品为糖衣浓缩丸，除去糖衣后显棕黑色；味苦、微辛。

【成 份】蒲公英 紫花地丁 黄芩 岗梅 赤芍 天花粉 玄参 当归 防风 柴胡 皂角刺 人工牛黄 白芷 胆南星 虎杖 夏枯草 板蓝根

【功能主治】清热解毒，活血凉血，消炎止痛。用于上呼吸道感染，急、慢性咽喉炎，

急性扁桃腺炎，化脓性扁桃腺炎，疮毒等症。

【用法用量】口服，一次 4~6 丸，一次 3 次；外用，捣碎，用冷水调匀，涂患处。

【注意事项】

1.忌烟酒、辛辣、鱼腥食物；

2.不宜在服药期间同时服用温补性中药；

3.孕妇慎用。脾虚大便溏者慎用；

4.糖尿病患者、儿童、年老体弱者应在医师指导下服用；

5.属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用；

6.服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊；

7.对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用；

8.本品性状发生改变时禁止使用；

9.儿童必须在成 人监护下使用；

10.请将本品放在儿童不能接触的地方；

11.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

13、复方北豆根氨酚那敏片

【成份】 本品每片含对乙酰氨基酚 300 毫克，马来酸氯苯那敏 3 毫克，咖啡因 15 毫克，北豆根提取物 50 毫克（相当于原生药 300 毫克），金银花提取物 30 毫克（相当于原生药 200 毫克），野菊花提取物 30 毫克（相当于原生药 200 毫克）。辅料为：淀粉、硬脂酸镁、羚甲淀粉钠。

【性状】 :本品为棕红色圆形薄膜衣片，除去薄膜衣后呈棕褐色，味苦，微涩。

【作用类别】 本品为感冒用药类非处方药药品。

【药理毒理】 对乙酰氨基酚能抑制前列腺素合成，有解热镇痛作用；咖啡因为中枢兴奋药，能增强对乙酰氨基酚的解热镇痛效果；马来酸氯苯那敏为抗组胺药，能减轻流涕、鼻塞、打喷嚏等症状；北豆根、金银花及野菊花提取物对多种病毒有抑制作用，能清热解毒、消肿止痛。

【适应症】 用于缓解普通感冒或流行性感冒引起的发热、头痛、鼻塞、流涕、咽痛等症状。

【用法和用量】 口服。成人一次 1～2 片，一日 3 次。

【不良反应】 可见厌食、恶心、呕吐、皮疹等；偶见粒细胞缺乏症。

【性状】 :本品为绿色圆形薄膜衣片，除去薄膜衣后呈棕褐色，味苦，微涩。

【禁忌】 对本品过敏者禁用。严重肝肾不全者禁用。

【注意事项】 用药 3～7 天，症状不缓解，请咨询医师或药师。服用本品期间禁止饮酒。肝、肾功能不全者慎用。孕妇及哺乳期妇女慎用。驾驶机、车、船、从事高空作业、机械工作者工作时间慎用。心动过缓、传导阻滞、心力衰竭患者慎用。儿童必须在成人监护下使用。当本品性状发生改变时禁用。请将此药品放在儿童不能接触的地方。

【药物相互作用】 本品不应与巴比妥类、苯妥英钠及氯霉素同服。与其它解热镇痛药同服有增加肾毒性之危险。如正在服用其它药品，使用本品前请咨询医师或药师。

14、三九/感冒灵胶囊

【成　　份】 三叉苦、岗梅、金盏银盘、薄荷油、野菊花、马来酸氯苯那敏、咖啡因、对乙酰氨基酚。

【性　　状】 本品为胶囊剂，内容物为棕褐色颗粒；味苦。

【适 应 症】 解热镇痛。用于感冒引起的头痛、发热、鼻塞流涕、咽痛。

【规　　格】 0.5g*12 粒

【用法用量】 口服，一次 2 粒，一日 3 次。

【不良反应】 可见困倦、嗜睡、口渴、虚弱感；偶见皮疹、荨麻疹、药热及粒细胞减少；长期大量用药会导致肝肾功能异常。

【禁　　忌】 严重肝肾功能不全者禁用。

【作用类别】 本品为感冒类非处方药药品。

【注意事项】 1.忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。 2.不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。 3.本品含对乙酰氨基酚、马来酸氯苯那敏、咖啡因。服用本品期间不得饮酒或含有酒精的饮料；不能同时服用与本品成份相似的其他抗感冒药；肝、肾功能不全者慎用；膀胱颈梗阻、甲状腺功能亢进、青光眼、高血压和前列腺肥大者慎用；孕妇及哺乳期妇女慎用；服药期间不得驾驶机、车、船、从事高空作业、机械作业及操作精密仪器。 4.脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。 5.心脏病、糖尿病等慢性病严重者应在医师指导下服用。 6.儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。 7.服药 3 天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。 8.对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。 9.本品性状发生改变时禁止使用。 10.儿童必须在成人监护下使用。 11.请将本品放在儿童不能接触的地方。 12.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】 1.与其他解热镇痛药并用，有增加肾毒性的危险。 2.如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

15、克拉霉素胶囊

【药理毒理 】

1．药理：本品为大环内酯类抗生素，对革兰阳性菌如金黄色葡萄球菌、链球菌、肺炎球菌等有抑制作用，对部分革兰阴性菌如流感嗜血杆菌、百日咳杆菌、淋病奈瑟菌、嗜肺军团菌和部分厌氧菌如脆弱拟杆菌、消化链球菌、痤疮丙酸杆菌等也有抑制作用，此外对支原体也有抑制作用。本品特点为在体外的抗菌活性与红霉素相似，但在体内对部分细菌如金黄色葡萄球菌、链球菌、流感嗜血杆菌等的抗菌活性比红霉素强。本品与红霉素之间有交叉耐药性。本品的作用机制是通过阻碍细胞核蛋白 50S 亚基的联结，抑制蛋白合成而产生抑菌作用。

2．毒理：本品除体外染色体畸变试验一次是弱阳性另一次为阴性结果外，其他体外致突变试验如沙门菌/哺乳动物细胞微粒体试验、细菌致突变频率试验、大鼠肝细胞 DNA 合成测定、小鼠淋巴瘤测定、小鼠显性致死试验和小鼠微核试验均为阴性。生育、生殖研究表明，雌性、雄性大鼠给用克拉霉素 160mg/kg/日（以体表面积计，是人用最大推荐剂量的 1.3 倍），对大鼠动情期、生育能力、分娩及子代的数量和存活率均无影响。给予猴子口服克拉霉素 150mg/kg/日（以体表面积计，是人用最大推荐剂量的 2.4 倍），出现胚胎丧失。动物长期毒性研究未证实克拉霉素有致癌性。

【适应症】

适用于克拉霉素敏感菌所引起的下列感染：1．鼻咽感染：扁桃体炎、咽炎、鼻窦炎。2．下呼吸道感染：急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作和肺炎。3．皮肤软组织感染：脓疱病、丹毒、毛囊炎、疖和伤口感染。4．急性中耳炎、肺炎支原体肺炎、沙眼衣原体引起的尿道炎及宫颈炎等。5．也用于军团菌感染，或与其他药物联合用于鸟分枝杆菌感染、幽门螺杆菌感染的治疗。

【用法用量】

成人：口服，常用量一次 250mg，每 12 小时 1 次；重症感染者一次 500mg，每 12 小时 1 次。根据感染的严重程度应连续服用 6～14 日。

儿童：口服，6 个月以上的儿童按体重一次 7.5mg/kg，每 12 小时 1 次。或按以下方法给药：体重 8～11kg，一次 62.5mg，每 12 小时 1 次；体重 12～19kg，一次 125mg，每 12 小时 1 次；体重 20～29kg，一次 187.5mg，每 12 小时 1 次；体重 30～40kg，一次 250mg，每 12 小时 1 次；根据感染的严重程度应连续服用 5～10 日。

【不良反应】

1．主要有口腔异味（3%），腹痛、腹泻、恶心、呕吐等胃肠道反应（2%～3%），头痛（2%），血清氨基转移酶短暂升高。

2．可能发生过敏反应，轻者为药疹、荨麻疹，重者为过敏及 Stevens—Johnson 症。

3．偶见肝毒性、艰难梭菌引起的假膜性肠炎。

4．曾有发生短暂性中枢神经系统副作用的报告，包括焦虑、头昏、失眠、幻觉、恶梦或意识模糊，然而其原因和药物的关系仍不清楚。

【禁忌症】

1．对本品或大环内酯类药物过敏者禁用。

2．孕妇、哺乳妇女期禁用。

3．严重肝功能损害者、水电解质紊乱患者、服用特非那丁治疗者禁用。

4．某些心脏病（包括心律失常、心动过缓、Q - T 间期延长、缺血性心脏病、充血性心力衰竭等）患者禁用。

【注意事项】

1.肝功能损害、中度至严重肾功能损害者慎用。

2.肾功能严重损害（肌酐清除率小于 30ml/分钟)者，须作剂量调整。常用量为一次 250mg，一日 1 次；重症感染者首剂 500mg，以后一次 250mg，一日 2 次。

3.本品与红霉素及其他大环内酯类药物之间有交叉过敏和交叉耐药性。

4.与别的抗生素一样，可能会出现真菌或耐药细菌导致的严重感染，此时需要中止使用本品，同时采用适当的治疗。

5.本品可空腹口服，也可与食物或牛奶同服，与食物同服不影响其吸收。

6.血液或腹膜透析不能降低本品的血药浓度。

16. 清火栀麦片

【主要成份】穿心莲、栀子、麦冬。

【性 状】本品为糖衣片，除去糖衣后，显褐绿色或黄褐色至棕褐色；味极苦。

【简介/商品功效】清热解毒，凉血消肿。用于肺胃热盛所致的咽喉肿痛、发热、牙痛、目赤。

【规格型号】18s

【用法用量】口服，一次 2 片，一日 2 次。

【不良反应】尚不明确。

【禁 忌】孕妇慎服。

【注意事项】

1.忌烟、酒及辛辣食物。

2.不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3.有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4.儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱及脾虚便溏者应在医师指导下服用。

5.发热体温超过 38.5℃的患者，应去医院就诊。

6.服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7.对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8.本品性状发生改变时禁止使用。

9.儿童必须在成人监护下使用。

10.请将本品放在儿童不能接触的地方。

11.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【贮 藏】密封。

17. 消渴丸

【主要成份】本品主要成分为葛根、南五味子、山药、黄芪、地黄、天花粉、格列本脲。

【性 状】本品为黑色的包衣浓缩丸；味甘、酸、微涩。

【简介/商品功效】滋肾养阴，益气生津。用于气阴两虚型消渴病（2 型糖尿病），症见：口渴喜饮、多尿、多食易饥、消瘦、体倦乏力、气短懒言等。

【规格型号】30g(120s)

【用法用量】口服。饭前用温开水送服。一次 5~10 丸，一日 2~3 次。或遵医嘱。

【不良反应】文献报道主要为：

1.低血糖反应，其诱因为进餐延迟、剧烈体力活动，或药物剂量过大，以及合用一些可增加低血糖发生的药物（见【注意事项】），发生低血糖反应后，进食、饮糖水通常均可缓解。在肝肾功能不全，年老、体弱者、若剂量偏大（对成年患者的一般剂量对年老、体弱者即可能过量），则可引起严重低血糖。

2.偶见药疹。

3.偶见轻度恶心、呕吐等消化道反应。

4.罕见脱发。

【禁 忌】

1.孕妇、哺乳期妇女不宜服用；

2.I 型糖尿病患者，2 型糖尿病患者伴有酮症酸中毒、昏迷、严重烧伤、感染、严重外伤和重大手术者禁用；

3.肝、肾功能不全者，对磺胺类药物过敏者，白细胞减少者禁用。

【注意事项】本品是中西复方制剂，鉴于尚无充分的临床研究数据证实本复方制剂可以减低或消除其中化学药品的不良反应或其他应当注意的事项，故此项下罗列与化学药品关联的相关内容，以提示医患在使用本品时予以关注。

1、本品服用量应根据病情从每次 5 丸起逐渐递增。每次服用量不超过 10 丸，每日不超过 30 丸；至疗效满意时，可逐渐减少每次服用量或减少服用次数至每日 2 次的维持剂量。每日服用 2 次时，应在早餐及午餐前各服用 1 次，晚餐前尽量不服用。请在医生指导下，进行服量控制

2、年龄超过 65 岁的糖尿病患者对低血糖耐受差，对此类糖尿病患者用药时应密切注意避免低血糖反应。其血糖控制标准略宽于一般人，空腹血糖<7.8mmol/L (140mg/dl)，餐后 2 小时血糖<11.1mmol/L（200mg/dl）即可。

3.本品不宜与其他磺胺类药物合用。

4.本品与下列药物合用，可增加低血糖的发生：

(1)抑制磺脲类药物由尿中排泄，如治疗痛风的丙磺舒、别嘌醇；

(2)延迟磺脲类药物的代谢，如酒精，H2 受体阻滞剂（西咪替丁、雷尼替丁）、氯霉素、抗真菌药咪康唑，抗凝药。磺脲类与酒精同服可引起腹痛、恶心、呕吐、头痛以及面部潮红（尤以使用氯磺丙脲时），与香豆素类抗凝剂合用时，开始二者血浆浓度皆升高，以后二者血浆浓度皆减少，故应按情况调整两药的用量；

(3)促使与血浆白蛋白结合的磺脲类药物分离出来，如水杨酸盐、贝特类降血脂药；

(4)药物本身具有致低血糖作用：酒精、水杨酸类、胍乙啶、单胺氧化酶抑制剂，奎尼丁；

(5)合用其他降血糖药物：胰岛素，二甲双胍、阿卡波糖、胰岛素增敏剂；

(6)β肾上腺受体阻滞剂可干扰低血糖时机体的升血糖反应，阻碍肝糖酵解，同时又可掩盖低血糖的警觉症状。

5.本品与下列药物合用，可增加高血糖的发生：

(1)糖皮质激素、雌激素、噻嗪类利尿剂、苯妥英钠、利福平；

(2)β肾上腺受体阻滞剂可拮抗磺脲类药物的促胰岛素分泌作用，故也可致高血糖。

6.用药期间应定期检测血糖、尿糖、尿酮体、尿蛋白和肝肾功能、血象，并进行眼科检查。

7.体质虚弱，高热、恶心和呕吐、肾上腺皮质功能减退或垂体前叶功能减退者慎用。

8.出现低血糖症状时，可采用以下措施；

(1)补充葡萄糖：轻者立即口服葡萄糖，如无葡萄糖，可予口服甜果汁，糖水；重者静脉注射葡萄糖。要观察到患者意识恢复。

(2)胰升糖素治疗：胰升糖素皮下、肌肉或静脉注射，由于其作用时间短，且会再次出现低血糖，因此在注射后仍要补充葡萄糖或进食，需继续观察以保证患者完全脱离危险期。

18. 对乙酰氨基酚栓

【主要成份】本品每粒含对乙酰氨基酚 0.15 克。辅料为：焦亚硫酸钠、混合脂肪酸甘油酯。

【性 状】本品为乳白色至微黄 色栓。

【简介/商品功效】 用于普通感冒或流行性感冒引起的发热，也用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。

【规格型号】0.15g*10 枚

【用法用量】直肠给药。6 岁以上儿童及成人一次 1 粒，若持续发热或疼痛，可间隔 4-6 小时重复一次。24 小时内不超过 4 粒。

【不良反应】偶见皮疹、荨麻疹、药热及粒细胞减少。长期大量用药会导致肝肾功能异常。

【禁 忌】严重肝肾功能不全者禁用。

【注意事项】

1.本品为对症治疗药，用于解热连续使用不超过 3 天，用于止痛不超过 5 天，症状未

缓解请咨询医师 或药师；

2.1 岁以下儿童应在医师指导下使用；

3.对阿司匹林过敏者慎用；

4.不能同时服用其他含有解热镇痛药的药品(如某些复方抗感冒药)；

5.肝肾功能不全者慎用；

6.使用本品期间不得饮酒或含有酒精的饮料；

7.对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用；

8.本品性状发生改变时禁止使用；

9.请将本品放在儿童不能接触的地方；

10.儿童必须在成 人监护下使用；

11.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】 1.应用巴比妥类(如苯巴比妥)或解痉药(如颠茄)的患者，长期应用本品可致肝损害； 2.本品与氯霉素同用，可增强后者的毒性； 3.如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理毒理】本品能抑制前列腺素合成，具有解热镇痛作用。

19. 马来酸氯苯那敏片

【主要成份】本品每片含马来酸氯苯那敏 4 毫克。辅料为：预胶化淀粉、淀粉、糊精、蔗糖、羧甲淀粉钠、硬脂酸镁、十二烷基硫酸钠。

【性 状】本品为白色片。

【简介/商品功效】本品适用于皮肤过敏症：荨麻疹、湿疹、皮炎、药疹、皮肤瘙痒症、神经性皮炎、虫咬症、日光性皮炎。也可用于过敏性鼻炎、血管舒缩性鼻炎、药物及食物过敏。

【规格型号】4mg*100s

【用法用量】口服。成 人一次 1 片，一日 3 次。

【不良反应】主要不良反应为嗜睡、口渴、多尿、咽喉痛、困倦、虚弱感、心悸、皮肤瘀斑、出血倾向。

【禁 忌】尚不明确。

【注意事项】

1.老年患者应在医师指导下使用。

2.服药期间不得驾驶机、车、船、从事高空作业、机械作业及操作精密仪器。

3.儿童剂量请向医师或药师咨询。

4.新生儿、早产儿不宜使用。

5.孕妇及哺乳期妇女慎用。

6.膀胱颈梗阻、幽门十二指肠梗阻、甲状腺功能亢进、青光眼、消化性溃疡、高血压和前列腺肥大者慎用。

7.如服用过量或出现严重不良反应，应立即就医。

8.对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9.本品性状发生改变时禁止使用。

10.请将本品放在儿童不能接触的地方。

11.儿童必须在成人监护下使用。

12.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【儿童用药】遵医嘱。

【老年患者用药】遵医嘱。

【孕妇及哺乳期妇女用药】孕妇及哺乳期妇女慎用。

【药物相互作用】 1.本品不应与含抗组胺药（如马来酸氯苯那敏、苯海拉明等）的复方抗感冒药同服。 2.本品不应与含抗胆碱药（如颠茄制剂、阿托品等）的药品同服。 3.与解热镇痛药物配伍，可增强其镇痛和缓解感冒症状的作用。 4.与中枢镇静药、催眠药、安定药或乙醇并用，可增加对中枢神经的抑制作用。 5.本品可增强抗抑郁药的作用，不宜同用。 6.如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药物过量】尚不明确。

【药理毒理】作为组织胺 H1 受体拮抗剂，本品能对抗过敏反应所致的毛细血管扩张，降低毛细血管的通透性，缓解支气管平滑肌收缩所致的喘息，本品抗组胺作用较持久，也具有明显的中枢抑制作用，能增加麻醉药、镇痛药、催眠药和局麻药的作用。本品主要在肝脏代谢。

【药代动力学】尚不明确。

20. 复方氨酚烷胺胶囊(新快康)

【简介/商品功效】用于缓解普通感冒或流行性感冒引起的发热、头痛、鼻塞、咽痛等症状，也可用于流行性感冒的预防和治疗

【规格型号】10s

【用法用量】口服。治疗用，成人一次 1 粒，一日 2 次。预防用，如与感冒患者密切

接触后，每日 1 粒，持续服用不超过 10 天

【注意事项】

1. 用药 3-7 天，症状不缓解，请咨询医师或药师。
2. 对本品成分过敏者禁用。
3. 驾驶机、车、船、从事高空作业、机械作业者工作期间禁用。
4. 儿童用量请咨询医师或药师。
5. 服用本品期间禁止饮酒。
6. 肝肾功能不全者慎用。
7. 孕妇及哺乳期妇女慎用。
8. 当本品性状发生改变时禁用。
9. 如服用过量或发生严重不良反应时应立即就医。
10. 儿童必须在成人监护下使用。
11. 请将此药品放在儿童不能接触的地方

21. 蒲地蓝消炎片

【主要成份】蒲公英、黄芩、苦地丁、板蓝根。

【性 状】本品为棕红色片，味苦。

【简介/商品功效】清热解毒，抗炎消肿。用于疖肿、咽炎、扁桃腺炎。

【规格型号】0.3g*48s

【用法用量】口服，一次 2-3 片，一日 4 次，小儿酌减。

【不良反应】尚不明确。

【禁 忌】尚不明确。

【注意事项】

1.忌食辛辣刺激性食物。

2.用药期间不宜同时服用温热性药物。

3.孕妇及脾胃虚寒症见：腹痛、喜暖、泄泻者慎用。

4.儿童、哺乳期妇女、年老体弱及糖尿病患者应在医师指导下服用。

5.疮疖较重或局部变软化脓，或扁桃体有化脓及全身高热者应到医院就诊。

6.服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7.对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8.本品性状发生改变时禁止使用。

9.儿童必须在成 人监护下使用。

10.请将本品放在儿童不能接触的地方。

11.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

22. 维生素 B2 片

【主要成份】本品每片含主要成份维生素 B25 毫克。辅料为淀粉、糊精、硬脂酸镁、羟丙纤维素。

【成 份】

化学名：7,8-二甲基-10-(1'-D-核糖基)-异咯嗪

分子式：$C_{17}H_{20}N_4O_6$

分子量：376.37

【性 状】本品为黄色至橙黄色片。

【简介/商品功效】用于预防和治疗维生素 B2 缺乏症，如口角炎、唇干裂、舌炎、阴囊炎、结膜炎、脂溢性皮炎等。

【规格型号】5mg*100s

【用法用量】口服，成人，一次 1-2 片，一日 3 次。

【不良反应】在正常肾功能状态下几乎不产生毒性，服用后尿呈黄色，但不影响继续用药。

【禁 忌】尚不明确。

【注意事项】

1.本品宜饭后服用。

2.必须按推荐剂量服用，不可超量服用。

3.儿童用量请咨询医师或药师。

4.对诊断的干扰：尿中荧光测定儿茶酚胺浓度可呈***性增高，尿胆原测定呈***阳性。

5.防治维生素 B2 缺乏症时，因常伴有 B 族其他维生素缺乏，故推荐应用复合维生素 B。

6.对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7.本品性状发生改变时禁止使用。

8.请将本品放在儿童不能接触的地方。

9.儿童必须在成人监护下使用。

10.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【儿童用药】尚不明确。

【老年患者用药】尚不明确。

【孕妇及哺乳期妇女用药】尚不明确。

【药物相互作用】 1、饮酒（乙醇）影响肠道对维生素 B2 的吸收。 2、同用吩噻嗪类、三环类抗抑郁药、丙磺舒等药时，维生素 B2 用量增加。 3、不宜与甲氧氯普胺（胃复安）合用。 4、如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药物过量】尚不明确。

【药理毒理】维生素 B2 是辅酶的组成成份，参与糖、蛋白质、脂肪的代谢，维持正常的视觉功能和促进生长。

【药代动力学】由胃肠道吸收，主要在十二指肠，嗜酒可减少维生素 B2 的吸收，吸收后分布到各种组织及乳汁，仅极少量贮于肝、脾、肾、心组织。蛋白结合率中等。半衰期（t1/2）为 66～84 分钟。肝内代谢，经肾排泄。血液透析可清除维生素 B2，但比肾排泄慢。

23. 复方鱼腥草合剂

【主要成份】鱼腥草、黄芩、板兰根、连翘、金银花。辅料为蔗糖、蜂蜜、防腐剂（苯甲酸钠、羟苯乙酯）。

【性 状】本品为黄棕色至棕色的液体；味甜、微苦涩。

【简介/商品功效】清热解毒。用于外感风热引起的咽喉疼痛；急性咽炎、扁桃腺炎有风热证候者。

【规格型号】10ml*10 支

【用法用量】口服，一次 20～30 毫升，一日 3 次。

【不良反应】尚不明确。

【禁 忌】糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1.忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2.不宜在服药期间同时服用温补性中药。

3.孕妇慎用。儿童应在医师指导下服用。

4.脾虚大便溏者慎用。

5.属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。

6.扁桃体有化脓及全身高热者应去医院就诊。

7.服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

8.对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9.药品性状发生改变时禁止服用。

10.儿童必须在成人监护下使用。

11.请将此药品放在儿童不能接触的地方。

12.如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

24. 感冒清胶囊

【主要成份】南板蓝根 大青叶 金盏银盘 岗梅 山芝麻 对乙酰氨基酚 穿心莲叶 盐酸吗啉胍 马来酸氯苯那敏。

【性 状】本品为胶囊剂，内容物为四色颗粒；味苦。

【简介/商品功效】疏风解表，清热解毒。用于风热感冒，发烧，头痛，鼻塞流涕，喷嚏，咽喉肿痛，全身酸痛等症。

【规格型号】0.5g*24s

【用法用量】口服，一次 1～2 粒，一日 3 次。

【注意事项】用药期间不宜驾驶车辆、管理机器及高空作业等。

25. 感冒清热颗粒

【主要成份】荆芥穗、薄荷、防风、柴胡、紫苏叶、葛根、桔梗、苦杏仁、白芷、苦地丁、芦根。辅料为：蔗糖、糊精。

【性 状】本品为棕黄色的颗粒；味甜，微苦。

【简介/商品功效】疏风散寒，解表清热。用于风寒感冒，头痛发热，恶寒身痛，鼻流清涕，咳嗽咽干。

【规格型号】12g*10 袋

【用法用量】开水冲服。一次 1 袋，一日 2 次。

【不良反应】尚不明确。

【禁 忌】尚不明确。

【注意事项】

1.忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2.不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3.糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4.儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。

5.发热体温超过 38.5℃的患者，应去医院就诊。

6.服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。

7.对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8.本品性状发生改变时禁止使用。

9.儿童必须在成人监护下使用。

10.请将本品放在儿童不能接触的地方。

11.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。