
A4 — sesgo del ajuste Kündig de Fitbauer sobre espectros HC de SITE (intensidades libres)
|ΔBhf| (T)
|ΔΓ| (mm/s)
|Δint2| (rel. 2)
R = ΔEQ/despl. magnético
θ (°)
10
2
1
0.5
0.1
0
15
30
54.7
75
90
6.4e-06 0.0065 0.027 0.44 0.071 0.07
1.3e-06 0.005 0.022 6.7e-05 0.15 0.095
1.4e-06 0.0016 0.0065 0.00039 0.055 0.032
3e-06 0.008 0.0016 0.0038 0.017 0.17
9.9e-05 0.00017 0.0001 0.013 0.0011 0.0016
0.4
0.3
0.2
0.1
2.9e-05 0.00052 0.0017 0.0032 0.0023 0.0042
2.4e-05 0.0034 0.014 8.3e-06 0.058 0.033
2.2e-05 0.0006 0.0028 0.00023 0.028 0.0073
3.9e-05 0.0022 0.002 0.0038 0.01 0.028
6.4e-05 0.00024 0.00014 0.0045 0.00023 0.0063
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.0022 0.23 1.2 1 1.7 2
0.00016 0.18 0.71 1.4 0.32 2
1e-05 0.18 0.69 0.19 1.5 1.3
0.00019 0.37 1.3 1.5 1.4 1.3
0.00056 0.035 0.0027 1.5 0.24 0.85
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25