لدينا ملزمة وشروحات للإحصاء

يشمل الإشتراك في الدورة مايلي:

- ملزمة مرتبة وشاملة
- شروحات لكامل الدروس
- حلول للواجبات
- شرح للواجبات
- كويزات للمعلومات النظرية

(الدورة شاملة وتغنيك عن الكتاب).

مع العلم لدينا جميع مواد التحضيري للمسار الإنساني.

نبذة عن الملزمة (اضغط هنا).

نبذة عن الشرح (اضغط هنا).

رابط متجرنا للإشتراك (اضغط هنا).

قناتنا لمعرفة كل جديد (اضغط هنا).

جامعة الملك سعود

عمادة السنة الأولى المشتركة – قسم العلوم الأساسية

مقرر أحص 102

ورقة العمل الرابعة	
اسم الطالب: ملازم عدل	الفصل الدراسي الأول – 1448
رقم الشعبة:	اسم المدرس:
دروس ورقة العمل: 3.2 الربيعيّات والمئينات	التقييم:

السؤال الأول: اكتب كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة.	
1. نسبة البيانات التي تزيد عن P_{80} تساوي 80%.	✗
2. قيم الربيعيات تكون موجودة دائمًا ضمن البيانات.	✗
3. لأجل أيّ مجموعة بياناتٍ معطاة، فإنّ $Q_2 = P_{50} = \bar{x}$.	✗
4. عدد المئينات لا يساوي 100.	✓
5. لأجل أيّ مجموعة بياناتٍ معطاة، فإنّ $Q_1 < Q_3$ دائمًا.	✗

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة مما يلي:

1. من أجل مجموعة من القيم المختلفة والمرتبة تصاعديا، إذا كان $Q_1 = x_7$, فإن عدد القيم يساوي:

أ. 29	ب. 8	ج. 7	د. 27

2. إذا كانت أعمار 90% من الأشخاص تزيد عن 27 سنة، فإنّ هذا العمر يمثل:

أ. Q_1	ب. P_{27}	ج. P_{90}	د. P_{10}

3. إذا تم قياس أوزان 60 طالبًا, و كان الوزن 62 كغم يمثل الربيع الثالث, فإن عدد الطلاب الذين لا تزيد أوزانهم عن 62 كغم يساوي:

أ. 30	ب. 45	ج. 15	د. 10

4. لمجموعة من البيانات، إذا كان $Q_1 = 70, Q_2 = 75, Q_3 = 85$, فأي العبارات الآتية صحيحة:

أ. 25% من القيم تقع بين 70 و85.	ب. 25% من القيم أصغر من 85.	ج. 25% من القيم أكبر من 70.	د. 75% من القيم أكبر من 70.

5. لمجموعة من البيانات، إذا كان $HF = 18, LF = 2, x_L = 19, x_S = 4$ ، فإن لهذه للبيانات:

أ. قيمة مُنعزلة بكبرها فقط.	ب. قيمة مُنعزلة بصغرها فقط.	ج. لا يوجد قيم مُنعزلة.	د. قيم مُنعزلة بكبرها وصغرها معاً

6. إحدى القيم الآتية لا يُمكن أن تكون قيمة منعزلة في أي مجموعة بيانات:

أ. x_L	ب. x_S	ج. Q_1	د. P_{90}

قناتنا لمعرفة كل جديد: https://t.me/mlazmadl
انقر على الرابط للدخول

السؤال الثالث: لدينا البيانات الآتية: 9, 7, 11, 8, 2, 19, 8, 5, 0, 7, 4 ,أوجد ما يلي:

1. الربيعي الثالث

$Q_3 =$

$q_r = \frac{r(n+1)}{4} = \frac{3(11+1)}{4} = 9$

$Q_r = X_k + a(X_{k+1} - X_k) \Rightarrow Q_3 = X_9 + 0(X_{10} - X_9) = 9 + 0(11-9) = 9$

2. المئين 25

$P_{25} =$

$P_r = \frac{r(n+1)}{100} = \frac{25(11+1)}{100} = 3$

$P_r = X_k + a(X_{k+1} - X_k) = X_3 + 0(X_4 - X_3) \Rightarrow P_{25} = 4 + 0(5-4) = 4$

3. المئين 60

$P_{60} =$

$P_r = \frac{r(n+1)}{100} = \frac{60(11+1)}{100} = 7,2$

$P_r = X_k + a(X_{k+1} - X_k) = X_7 + 0,2(X_8 - X_7) \Rightarrow P_{60} = 8 + 0,2(8-8) = 8$

4. الحد الأدنى للقيم المُنعزلة بكبرها

$HF = Q_3 + 1,5(Q_3 - Q_1) = 9 + 1,5(9-4) = 16,5$

5. الحد الأعلى للقيم المُنعزلة بصغرها

$LF = Q_1 - 1,5(Q_3 - Q_1) = 4 - 1,5(9-4) = -3,5$

6. حدد القيم المُنعزلة وبيّن نوعها إن وُجدت ؟ وفسّر سبب وجودها أو عدم وجودها ؟

يوجد قيمة منعزلة بكبرها وهي 19 لانها اكبر من HF.

لا يوجد قيمة منعزلة بصغرها لان لا يوجد عدد اصغر من LF.

قناتنا لمعرفة كل جديد: https://t.me/mlazmadl
انقر على الرابط للدخول

تدريب Core Up

Core Up

توجه إلى منصة Core Up عن طريق مسح الكود المرفق في الكتاب، و أجب عن جميع الأسئلة المتعلقة بالفصل الأول.