

# 有限群表示论：Peter–Weyl 定理

sun123zxy

2026-03-14

## 1 从左模到双模

有限群表示论的一个经典结果是正则表示的分解：

$$\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_i V_i^{\oplus \dim V_i}$$

这里  $\mathbb{C}[G]$  是群  $G$  的群代数， $V_i$  是  $G$  的全体不可约表示。这只是个左  $\mathbb{C}[G]$ -模的分解： $\mathbb{C}[G]$  被分解成了其单左理想的直和。但是  $\mathbb{C}[G]$  是个环，完整来说我们应该研究其作为  $\mathbb{C}$ -代数的分解。Peter–Weyl / Wedderburn–Artin 定理给出了它的分解：

$$\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_i \text{End}_{\mathbb{C}}(V_i) \cong \bigoplus_i V_i \otimes_{\mathbb{C}} V_i^*$$

可见其结构确实变得更加丰富。稍做辨析：

### 1.1 双模观点

- 这里每份投影  $\pi_i : \mathbb{C}[G] \rightarrow \text{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$  都是表示  $\rho_{V_i} : G \rightarrow \text{GL}(V_i)$  直接线性扩张得到——因此 Peter–Weyl 定理实质上是在说， $\mathbb{C}[G]$  在其每个不可约表示上的作用完全决定了  $\mathbb{C}[G]$  的代数结构。
- 容易验证每个  $\pi_i$  都是  $(\mathbb{C}[G], \mathbb{C}[G])$ -代数同态——保加法，保乘法，保数乘，保左、右  $G$ -作用。这里的分解是在此意义下的同构。
- $V_i$  是  $G$  的不可约表示，配备左  $\mathbb{C}[G]$ -模结构。
- $V_i^*$  是  $V_i$  的对偶空间，配备右  $\mathbb{C}[G]$ -模结构  $(f \cdot g)(v) := f(g \cdot v)$ 。

**注记** 在经典的有限群表示论中，那时我们希望  $V_i^*$  是左  $\mathbb{C}[G]$ -模，所以当时配备的是  $(f \cdot g)(v) := f(g^{-1} \cdot v)$ 。这里就是想要右模结构，所以不用取逆生造了。

- $V_i \otimes_{\mathbb{C}} V_i^*$  通过  $(\mathbb{C}[G], \mathbb{C})$ -双模和  $(\mathbb{C}, \mathbb{C}[G])$ -双模的张量积获得一个  $(\mathbb{C}[G], \mathbb{C}[G])$ -双模结构：

$$g \cdot (v \otimes f) \cdot h := (g \cdot v) \otimes (f \cdot h)$$

其内部乘法是缩并运算。这使得其成为一个  $(\mathbb{C}[G], \mathbb{C}[G])$ -代数。

- 对左  $\mathbb{C}[G]$ -模  $U, W$ ，为了使自然同构  $W \otimes_{\mathbb{C}} U^* \cong \text{Hom}_{\mathbb{C}}(U, W)$  成立，为  $\text{Hom}_{\mathbb{C}}(U, W)$  配备  $(\mathbb{C}[G], \mathbb{C}[G])$ -双模结构

$$(g \cdot \varphi \cdot h)(u) := g \cdot \varphi(h \cdot u)$$

特别地，在  $\text{End}_{\mathbb{C}}(V_i) = \text{Hom}_{\mathbb{C}}(V_i, V_i)$  定义内部乘法是函数复合，则  $\text{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$  也获得  $(\mathbb{C}[G], \mathbb{C}[G])$ -代数结构。

**注记** 平时仅考虑左模结构时，为使记号对齐，通常喜欢写  $\text{Hom}_{\mathbb{C}}(V, W) \cong V^* \otimes_{\mathbb{C}} W$ ——这无伤大雅，反正  $V^*$  强行通过  $g^{-1}$  获得了左  $\mathbb{C}[G]$ -模结构。但对双模的情况，左  $\mathbb{C}[G]$ -作用是由  $W$  负责，右  $\mathbb{C}[G]$ -作用是由  $V^*$  负责，我们就最好不要交换它们了。

- 不会因为仅将此分解视为环的分解受到任何处分——通过表示诱导的映射  $\pi_i : \mathbb{C}[G] \rightarrow \text{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$  足以将  $\text{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$  上的乘法结构拉回得到其  $(\mathbb{C}[G], \mathbb{C}[G])$ -双模结构。
- 反过来，仅考虑  $(\mathbb{C}[G], \mathbb{C}[G])$ -双模结构也没有问题：将会证明  $\pi_i$  是满射，即每个  $\text{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$  都是可以写作某一  $\mathbb{C}[G]$ -左作用。

## 1.2 左模观点

考虑到群代数有对极映射  $g \mapsto g^{-1}$ ，这使得可以将任何  $V$  上的  $(G, H)$ -双边表示结构强行翻成  $G \times H$ -群表示结构研究：

$$(g, h) \cdot v := g \cdot v \cdot h^{-1}$$

或在模的语言下：任何  $(\mathbb{C}[G], \mathbb{C}[H])$  双模结构可被强行翻成  $\mathbb{C}[G] \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{C}[H]$ -左模结构。这样的好处是可以直接套用之前群表示的语言来表达双模。例如，在此风格表述下的 Peter–Weyl 定理

$$\mathbb{C}[G] \cong \text{End}_{\mathbb{C}}(V_i) \cong \bigoplus_i V_i \otimes_{\mathbb{C}} V_i^*$$

应当理解为  $\mathbb{C}[G]$  作为  $G \times G$ -群表示的分解，其中

- $\otimes_{\mathbb{C}}$  是  $G \times G$ -群表示的张量积
- $\text{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$  是  $G \times G$ -表示，其上第一个  $G$ -自然作用在值域  $V_i$ ，第二个  $G$ -作用取逆作用在定义域  $V_i$
- $V_i$  是  $G \times G$ -表示，其上第一个  $G$ -作用自然，第二个  $G$ -作用平凡
- $V_i^*$  是  $G \times G$ -表示，其上第一个  $G$ -作用平凡，第二个  $G$ -作用取逆作用在定义域  $V_i$

**注记** 这似乎只是把双边代数表示翻译到 Hopf 代数表示的抽象废话，但在如 Schur–Weyl 对偶中，会看到这种翻译能有效简化表述。

## 1.3 群表示观点

在左模观点中，让我们使用对角映射  $g \mapsto (g, g)$  将 Peter–Weyl 分解

$$\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_i \text{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$$

看成  $G$ -表示的分解，于是  $\mathbb{C}[G]$  上的  $G$ -作用是共轭  $g \cdot x := gxg^{-1}$ ， $\text{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$  上的  $G$ -作用也是共轭  $(g \cdot \varphi)(v) := g \cdot \varphi(g^{-1} \cdot v)$ 。

## 1.4 词源学

Artin–Wedderburn 和 Peter–Weyl 这两种称呼的侧重点不一样：

- Artin–Wedderburn 主要强调把群代数分解成若干矩阵代数；
- Peter–Weyl 源于紧李群侧同名定理，更强调  $V_i \otimes_{\mathbb{C}} V_i^*$  的形式和所谓的正交性。

## 2 推论

来看上述分解导致的事实.

### 2.1 维数平方和

首先, 如果你选择的证明路线没有循环论证之嫌, 可以通过维数再次看出维数平方和公式

$$|G| = \sum_i (\dim V_i)^2$$

### 2.2 共轭类计数

其次, 对这分解取中心:

$$Z(\mathbb{C}[G]) \cong \bigoplus_i Z(\text{End}_{\mathbb{C}}(V_i))$$

- $Z(\text{End}_{\mathbb{C}}(V_i))$  是  $\text{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$  的中心, 而 (根据满射性) 所有  $\text{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$  都可实现为  $V_i$  上的  $G$ -左作用, 因此这中心恰为  $\text{End}_{\mathbb{C}[G]}(V_i)$ . 回忆 Schur 引理,  $V_i$  是不可约表示, 所以  $Z(\text{End}_{\mathbb{C}}(V_i)) = \text{End}_{\mathbb{C}[G]}(V_i) = \mathbb{C} \text{id}_{V_i}$ , 维数为 1.
- $Z(\mathbb{C}[G])$  是什么?

设  $\sum_{h \in G} \chi(h)h \in Z(\mathbb{C}[G])$ , 这即是要求对任意  $g \in G$ , 有

$$\sum_{h \in G} \chi(h)h = g \left( \sum_{h \in G} \chi(h)h \right) g^{-1} = \sum_{h \in G} \chi(h)ghg^{-1} = \sum_{h \in G} \chi(g^{-1}hg)h$$

即  $\chi(g^{-1}hg) = \chi(h)$ ——在共轭类上取常值—— $Z(\mathbb{C}[G])$  就是类函数全体! 其维数等于  $G$  的共轭类的数量.

两条连起来看:  $G$  的共轭类的数量等于  $G$  的不可约表示的数量.

**注记 (群表示观点的共轭类计数)** 回忆  $\mathbb{C}[G]$  也作为  $G$ -群表示分解. 两边同时取  $G$ -不变子空间, 得到

$$(\mathbb{C}[G])^G \cong \bigoplus_i \text{End}_G(V_i)$$

左边作为线性空间同构于  $G$  的类函数空间, 右边又使用 Schur 引理, 我们再次得到共轭类计数的结论.

### 2.3 交换群、循环群、DFT

省流: Peter-Weyl 表明考虑群代数等价于考虑群代数在每个不可约上的表示, 交换群时等价于考虑每个特征标, 循环群时就是 DFT.

如果  $G$  是交换群, 则每个不可约表示  $V_i$  都是 1 维. 因此在  $\mathbb{C}$ -代数同构意义下有

$$\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_i \text{End}_{\mathbb{C}}(V_i) \cong \mathbb{C}^{|G|} \cong L^2(G)$$

来考察这个同构具体是什么. 考虑到有限交换群基本定理, 不妨来考虑最简单的循环群  $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ . 此时我们可以认为其群代数是配备循环卷积乘法的多项式商环  $\mathbb{C}[x]/(x^n - 1)$ .

注意交换群不可约表示均为一维，故每个投射  $\pi_k : \mathbb{C}[\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}] \rightarrow \text{End}_{\mathbb{C}}(V_k)$  恰是  $V_k$  对应的第  $k$  个特征标  $\chi_k : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}$  线性张成的结果，它给出如下环同态：

$$\begin{aligned} \mathbb{C}[x]/(x^n - 1) &\cong \mathbb{C}[\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}] &\rightarrow \text{End}_{\mathbb{C}}(V_k) &\cong \mathbb{C} \\ x &\mapsto e_1 &\mapsto \zeta_n^k \\ \sum_{0 \leq i < n} a_i x^i &\mapsto \sum_{0 \leq i < n} a_i e_i &\mapsto \sum_{0 \leq i < n} a_i \zeta_n^{ki} \end{aligned}$$

因此 Peter–Weyl 的第  $k$  个分量相当于多项式在第  $k$  个  $n$  次单位根处求值——是谓离散 Fourier 变换 (Discrete Fourier Transform, DFT),  $\mathbb{C}[x]/(x^n - 1)$  和  $\mathbb{C}^{\oplus n}$  间的  $\mathbb{C}$ -代数同态. 矩阵语言下, DFT 矩阵  $(\zeta_n^{jk})_{0 \leq j, k < n}$  将多项式系数  $(a_i)_{0 \leq i < n}$  变换为  $n$  个单位根处取值的结果.

我们当然还有逆 DFT 变换, 请感兴趣的读者验证小节 3.3 中我们显式构造  $\iota$  在此情形下对逆 DFT 变换.

## 2.4 直和分解的典范投影

回忆有限群时我们证明过线性空间同构  $\text{Hom}_G(V, W) \cong V^* \otimes_G W$ , 在这里做应用. 对任意  $G$ -表示  $V$ , 大力自然同构

$$\begin{aligned} V &\cong \mathbb{C}[G] \otimes_{\mathbb{C}[G]} V \\ &\cong \bigoplus_i \text{End}(V_i) \otimes_{\mathbb{C}[G]} V \\ &\cong \bigoplus_i V_i \otimes_{\mathbb{C}} V_i^* \otimes_{\mathbb{C}[G]} V \\ &\cong \bigoplus_i V_i \otimes_{\mathbb{C}} \text{Hom}_G(V_i, V) \end{aligned}$$

注意  $\dim \text{Hom}_G(V_i, V)$  就是  $V_i$  在  $V$  中的重数, 因此  $V_i \otimes_{\mathbb{C}} \text{Hom}_G(V_i, V)$  就是  $V$  的各不可约成分, 上述同构给出了  $V$  的不可约成分的自然拆解——不同于证明半单性时对补空间的依赖, 由于我们将会在 Peter–Weyl 的证明中给出了完全构造性的同构小节 3.3, 这里的拆解也是完全构造性的, 可以直接写出典范嵌入

$$\begin{aligned} \iota_i : V_i \otimes_{\mathbb{C}} \text{Hom}_G(V_i, V) &\rightarrow V \\ v \otimes \varphi &\mapsto \varphi(v) \end{aligned}$$

和典范投影

$$\begin{aligned} \pi_i : V &\rightarrow \bigoplus_i V_i \otimes_{\mathbb{C}} \text{Hom}_G(V_i, V) \\ \iota_i \circ \pi_i &= \frac{\dim V_i}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi_{V_i}(g)} \rho_V(g) \end{aligned}$$

## 3 证明

我们提供几条依赖不同工具的证明路线, 读者可按前置情况任选.

- 有关有限群表示论的基础内容可参见有限群表示论速通.

### 3.1 $\pi$ 单

先证  $\pi$  是单射:

- 这里的证明依赖有限群表示论的 Maschke 定理 (半单性).

若一  $\mathbb{C}[G]$  元素在每个不可约表示上作用均为 0, 由半单性,  $\mathbb{C}[G]$  自己分解成若干不可约表示的直和, 所以该元素在  $\mathbb{C}[G]$  上作用也为 0.  $\mathbb{C}[G]$  在自己上作用当然是忠实的, 所以该元素只能是 0.

### 3.2 $\pi$ 满

则只需证  $\pi$  是满射. 这里有多种可供选择的路线:

- 依赖有限群表示论的维数平方和公式  $\sum_i (\dim V_i)^2 = |G|$ : [FH04, Proposition 3.29]  
 $\dim \text{End}_{\mathbb{C}}(V_i) = (\dim V_i)^2$ ,  $\dim \mathbb{C}[G] = |G|$  维数逼迫单射  $\pi$  也是满射.
- 依赖矩阵代数的 Burnside 定理, 该定理的证明可以仅依赖初等线性代数:
  - 复数域上矩阵代数的含么子结合代数如果不可约, 则一定是整个.

则考察含么结合代数  $\mathbb{C}[G]$  在  $\text{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$  上的像, 确为  $\text{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$  的不可约含么子结合代数. 故根据 Burnside 定理,  $\mathbb{C}[G]$  在每个  $\text{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$  上的像都必须是全体.

**注记** 依赖 Burnside 定理的满射性证明甚至不需要  $G$  是有限群.

### 3.3 $\pi \dashv \iota$ 显式构造

我们还可以显式构造  $\pi$  的逆  $\iota$  来获得构造性证明:

- 先来构造  $(\mathbb{C}[G], \mathbb{C}[G])$  双模同态  $\iota_i : \text{End}_{\mathbb{C}}(V_i) \rightarrow \mathbb{C}[G]$  ([Ser77, section 6.2, proposition 11] if you need a reference. 根据小节 2.3 一节的观点, 这可被称为逆 DFT 变换):

$$\varphi \mapsto \frac{\dim V_i}{|G|} \sum_{g \in G} \text{Tr}(\varphi \circ \rho_{V_i}(g^{-1}))g$$

等价地,  $V_i \otimes_{\mathbb{C}} V_i^* \rightarrow \mathbb{C}[G]$  的版本是

$$v \otimes f \mapsto \frac{\dim V_i}{|G|} \sum_{g \in G} f(g^{-1} \cdot v)g$$

- 下面验证  $\pi_i \circ \iota_i = \text{id}_{\text{End}_{\mathbb{C}}(V_i)}$ . 对任意  $v \in V_i$ ,  $f \in V_i^*$ ,  $w \in V_i$ , 有

$$\begin{aligned} (\pi_i \circ \iota_i)(v \otimes f)(w) &= \frac{\dim V_i}{|G|} \sum_{g \in G} f(g^{-1} \cdot v) \rho_{V_i}(g)(w) \\ &= \frac{\dim V_i}{|G|} \sum_{g \in G} f(g^{-1} \cdot v)(g \cdot w) \\ &= \dim V_i \cdot \left( \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (g \cdot w) \otimes (g \cdot f) \right) (v) \\ &= \dim V_i \cdot \left( \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g \cdot (w \otimes f) \right) (v) \end{aligned}$$

注意中间的映射是  $w \otimes f \in V_i \otimes_{\mathbb{C}} V_i^* \cong \text{Hom}_{\mathbb{C}}(V_i, V_i)$  到  $\text{Hom}_G(V_i, V_i)$  的平均化投影, 而  $V_i$  是不可约表示, 所以由 Schur 引理,  $\dim V_i \cdot \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g \cdot (w \otimes f)$  是  $V_i$  上的数乘. 则下面

关注其系数——这可以通过取迹，即取缩并计算：

$$\begin{aligned}
 \text{Tr} \left( \dim V_i \cdot \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g \cdot (w \otimes f) \right) &= \frac{\dim V_i}{|G|} \sum_{g \in G} \text{Tr}((g \cdot w) \otimes (g \cdot f)) \\
 &= \frac{\dim V_i}{|G|} \sum_{g \in G} (g \cdot f)(g \cdot w) \\
 &= \frac{\dim V_i}{|G|} \sum_{g \in G} f(w) \\
 &= \dim V_i \cdot f(w)
 \end{aligned}$$

故数乘系数为  $f(w)$ ，因此  $(\pi_i \circ \iota_i)(v \otimes f)(w) = f(w)v$ 。

- 至于  $\iota_i \circ \pi_i$ ，对任意  $h \in G$ ，

$$\begin{aligned}
 (\iota_i \circ \pi_i)(h) &= \frac{\dim V_i}{|G|} \sum_{g \in G} \text{Tr}(\rho_{V_i}(h) \circ \rho_{V_i}(g^{-1}))g \\
 &= \frac{\dim V_i}{|G|} \sum_{g \in G} \text{Tr}(\rho_{V_i}(hg^{-1}))g \\
 &= \frac{\dim V_i}{|G|} \sum_{g \in G} \text{Tr}(\rho_{V_i}(g^{-1}))gh \\
 &= \frac{\dim V_i}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi_{V_i}(g)} \rho_V(g)(h)
 \end{aligned}$$

因此

$$\iota_i \circ \pi_i = \frac{\dim V_i}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi_{V_i}(g)} \rho_V(g)$$

我们在有限群表示论中已经证明这是  $G$ -表示到其不可约成分的典范投影（这个证明当然也依赖有限群表示的半单性）。这完成了  $\iota \circ \pi = \text{id}_{\mathbb{C}[G]}$  一侧的证明。

### 3.4 正交性与泛函分析

$\iota$  还有泛函分析风格的解读。【TODO：这一部分目前有 bug】

固定  $V_i$  一组基  $(e_i^j)$  并生成  $V_i^*$  上的对偶基  $(f_i^k)$ ，并将  $\mathbb{C}[G]$  视为  $L^2(G)$ ，则  $\iota$  有如下矩阵风格的解读：考虑将  $g \in G$  映射到  $\rho_{V_i}(g^{-1})$  的第  $k$  行第  $j$  列元素取出得到一  $L^2(G)$  内函数

$$\rho_{V_i}^{k,j}(g) := f_i^k(\rho_{V_i}(g^{-1}) \cdot e_i^j)$$

回忆之前给出的  $\iota_i$  的定义，这和  $\iota_i$  把这些基底映射到  $L^2(G)$  的方式只差一个常数：

$$\iota_i(e_i^j \otimes f_i^k) = \frac{\dim V_i}{|G|} \rho_{V_i}^{k,j}$$

故为证明  $\iota$  是单射，可以往证  $\rho_{V_i}^{k,j}$  正交。

考虑  $e_{i_2}^{j_2} \otimes f_{i_1}^{j_1} \in V_{i_2} \otimes_{\mathbb{C}} V_{i_1}^* \cong \text{Hom}_{\mathbb{C}}(V_{i_1}, V_{i_2})$ ，对其平均化得

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho_{V_{i_2}}(g) \circ (e_{i_2}^{j_2} \otimes f_{i_1}^{j_1}) \circ \rho_{V_{i_1}}(g^{-1}) \in \text{Hom}_G(V_{i_1}, V_{i_2})$$

再对此  $\text{Hom}_G(V_{i_1}, V_{i_2})$  中映射取第  $k_2$  行第  $k_1$  列元素得

$$\begin{aligned} & \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f_{i_2}^{k_2} (\rho_{V_{i_2}}(g) \circ (e_{i_2}^{j_2} \otimes f_{i_1}^{j_1}) \circ \rho_{V_{i_1}}(g^{-1}) \cdot e_{i_1}^{k_1}) \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho_{V_{i_2}}^{k_2, j_2}(g^{-1}) \cdot \rho_{V_{i_1}}^{j_1, k_1}(g) \end{aligned}$$

这配对描述了  $e_{i_2}^{j_2} \otimes f_{i_1}^{j_1} \in \text{End}_{\mathbb{C}}(V_i)$  平均化后每个矩阵元素的情况.

- 回忆 Schur 引理对  $\text{Hom}_G(V_{i_1}, V_{i_2})$  的刻画,  $e_i^{j_2} \otimes f_i^{j_1}$  非零时必有  $i := i_1 = i_2$ ;
- 此时平均化结果是数乘, 只有矩阵对角有值, 故上式非零时必有  $k := k_1 = k_2$ ;
- 平均化前后的迹相等, 故为使得数乘倍率非零, 必有  $j := j_1 = j_2$ , 此时数乘倍率为  $1/\dim V_i$ .

综上各  $\rho_{V_i}^{k,j}$  正交, 构成  $L^2(G)$  的一组正交基.

**注记 (Schur 正交性)**

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho_{V_{i_2}}^{k_2, j_2}(g^{-1}) \cdot \rho_{V_{i_1}}^{j_1, k_1}(g) = \frac{1}{\dim V_{i_1}} \cdot \delta_{i_1, i_2} \delta_{k_1, k_2} \delta_{j_1, j_2}$$

is the Schur orthogonality, the one orthogonality to rule them all. 特征标表的第一和第二正交性均可由此推得:

- 取  $a := k_1 = j_1$ ,  $b := k_2 = j_2$ , 则

$$\frac{1}{\dim V_{i_1}} \cdot \delta_{i_1, i_2} \delta_{a, b} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho_{V_{i_2}}^{b, b}(g^{-1}) \cdot \rho_{V_{i_1}}^{a, a}(g)$$

对  $1 \leq a \leq \dim V_{i_1}$  和  $1 \leq b \leq \dim V_{i_2}$  求和立得

$$\delta_{i_1, i_2} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_{V_{i_2}}(g) \cdot \chi_{V_{i_1}}(g^{-1})$$

- 回忆第二正交性是说, 对任意  $g, h \in G$

$$\sum_i \chi_{V_i}(h) \cdot \chi_{V_i}(g^{-1}) = \delta_{g \text{ is conjugate to } h} \cdot \frac{|G|}{|C_G(h)|}$$

这里  $C_G(g) := \{x \in G : xg = gx\}$  是  $g$  的中心化子.

TODO

## 4 附录：绕过特征标的 Artin-Wedderburn 分解速证

梦得跳关解法一则, 可凭 Maschke、Schur 引理绕过特征标速得群代数的矩阵分解, 录之以飨读者.

记  $\text{End}(\mathbb{C}[G])_{\mathbb{C}[G]}$  是保右  $G$ -乘法的全体  $\mathbb{C}[G]$  上  $\mathbb{C}$ -线性自同态. 注意它通过  $x \mapsto (1 \mapsto x)$  完全由  $\mathbb{C}[G]$  决定, 且

$$(1 \mapsto x) \circ (1 \mapsto y) = (1 \mapsto xy)$$

故有  $\mathbb{C}$ -代数同构  $\mathbb{C}[G] \cong \text{End}(\mathbb{C}[G])_{\mathbb{C}[G]}$ . 由有限群表示半单性, 右  $G$ -模  $\mathbb{C}[G]$  有分解  $\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_i V_i^{\oplus m_i}$ , 故继续如下  $\mathbb{C}$ -代数同构

$$\begin{aligned}
 \mathbb{C}[G] &\cong \text{End}(\mathbb{C}[G])_{\mathbb{C}[G]} \\
 &\cong \text{End} \left( \bigoplus_i V_i^{\oplus m_i} \right)_{\mathbb{C}[G]} \\
 &\cong \bigoplus_i \text{End}(V_i^{\oplus m_i})_{\mathbb{C}[G]} && \text{by Schur's lemma} \\
 &\cong \bigoplus_i \text{End}_{\mathbb{C}} \left( (\text{End}_{\mathbb{C}[G]} V_i)^{\oplus m_i} \right) \\
 &\cong \bigoplus_i \text{End}_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}^{\oplus m_i}) && \text{by Schur's lemma}
 \end{aligned}$$

**注记** 上面我们在右模侧使用了 Schur 引理——这并不需要证明第二遍, 因为左  $G^{\text{op}}$ -模和右  $G$ -模范畴等价.

注意 Schur 引理只负责在右  $G$ -模层面制造同构, 上述  $\mathbb{C}$ -代数同构链的每个乘法同构是需要手动构造的.

至此矩阵分解已做完, 但  $\dim V_i$  和  $m_i$  的关系还尚不明确, 只知道

$$|G| = \sum_i m_i \dim V_i = \sum_i m_i^2$$

考虑到维数平方和定理的叙述一般为  $|G| = \sum_i (\dim V_i)^2$ , 完备起见, 下面来证明  $\dim V_i = m_i$ . 为此, 首先注意由 Schur 引理

$$m_i = \dim_{\mathbb{C}} \text{Hom}(V_i, \mathbb{C}[G])_{\mathbb{C}[G]}$$

断言后者作为线性空间同构于  $V_i^* := \text{Hom}_{\mathbb{C}}(V_i, \mathbb{C})$ , 从而由  $\dim V_i^* = \dim V_i$  完成证明.

下面证明断言. 该同构的给出方式为

$$\begin{aligned}
 \text{Hom}(V_i, \mathbb{C}[G])_{\mathbb{C}[G]} &\rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{C}}(V_i, \mathbb{C}) \\
 (v \mapsto \varphi(v)) &\mapsto (v \mapsto [e_1]\varphi(v))
 \end{aligned}$$

这里  $[e_1]\varphi(v)$  是指取出  $\varphi(v) \in \mathbb{C}[G]$  中  $e_1$  这一项的系数. 线性平凡, 来看为何是同构——这是因为借助保右  $G$ -作用的性质, 其它非  $e_1$  项的系数其实完全被  $e_1$  的系数决定:

$$[e_g]\varphi(v) = [e_1](\varphi(v) \cdot g^{-1}) = [e_1]\varphi(v \cdot g^{-1})$$

至此  $m_i = \dim V_i$  证明完毕, 维数平方和定理成立.

## 参考文献

- [FH04] William Fulton and Joe Harris. *Representation Theory*. Vol. 129. Graduate Texts in Mathematics. New York, NY: Springer, 2004. ISBN: 978-3-540-00539-1 978-1-4612-0979-9. DOI: [10.1007/978-1-4612-0979-9](https://doi.org/10.1007/978-1-4612-0979-9). URL: <http://link.springer.com/10.1007/978-1-4612-0979-9> (visited on 06/01/2025).
- [Ser77] Jean-Pierre Serre. *Linear Representations of Finite Groups*. Vol. 42. Graduate Texts in Mathematics. New York, NY: Springer, 1977. ISBN: 978-1-4684-9460-0 978-1-4684-9458-7. DOI: [10.1007/978-1-4684-9458-7](https://doi.org/10.1007/978-1-4684-9458-7).