

Jacobson–Morozov: $\mathfrak{sl}_2$ 在复半单李代数中的嵌入

幂零锥和其上的几何：以 $\mathfrak{gl}_n$ 为例

sun123zxy

2026-04-10

我们在复半单李代数 $\mathfrak{g}$ 中工作，并假设抽象 Jordan 分解、Killing 型和 Cartan 根空间分解理论已建立完毕。这一部分的标准参考是 [McG93, section 3.2–3.3].

定理 1 (Jacobson–Morozov) [McG93, theorem 3.3.1] 设 $\mathfrak{g}$ 为一复半单李代数，对任意幂零元 $e \in \mathfrak{g}$ ，存在 $h, f \in \mathfrak{g}$ 使得 e, h, f 满足 $\mathfrak{sl}_2$ 的 Lie 括号关系 $[h, e] = 2e, [h, f] = -2f, [e, f] = h$.

1 讨论

完整证明很长，先来做一点讨论.

1.1 半单元

首先注意满足上述条件的 h 一定是半单的：这是通过 e, f, h 将 $\mathfrak{g}$ 实现为 $\mathfrak{sl}_2$ 的表示后，使用 $\mathfrak{sl}_2$ 表示论的完全可约性得到的结果。所以将来的证明中，构造半单的 h 也是必经之路。

1.2 A 型的显式构造

对任意幂零元 $X \in \mathfrak{sl}_n$ ，适当共轭可将其化为 Jordan 标准型 J_λ ，于是可以分块考虑。熟记 $\mathfrak{sl}_2$ 的标准 $m+1$ 维不可约表示

$$X := \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & 1 \\ & & & & 0 \end{pmatrix} \quad Y := \begin{pmatrix} 0 & & & & \\ 1 \cdot m & 0 & & & \\ & 2 \cdot (m-1) & 0 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & m \cdot 1 & 0 \end{pmatrix}$$
$$H := \text{diag}(m, m-2, \dots, -m+2, -m)$$

这就通过 $e \mapsto X, f \mapsto Y, h \mapsto H$ 给出了 $\mathfrak{sl}_n$ 的情形下 Jacobson–Morozov 定理的一个显式构造 [McG93, corollary 3.2.7].

2 Jacobson–Morozov 定理的证明

这里给出的证明跟随 [McG93, theorem 3.3.1]. 对维数 $\mathfrak{g}$ 做归纳, 则可以先假设 e 不落在 $\mathfrak{g}$ 任何真半单子李代数中——否则直接在那个更小的半单李代数中构造 h 和 f 即可. 这会帮我们在后面排除一大类讨论情况.

下面开始构造. 先构造 $h \in \mathfrak{g}$ 使得 $[h, e] = 2e$, 为此只需证明 $e \in [e, \mathfrak{g}]$. 注意

- e 的中心化子 $\mathfrak{z}(e)$ 和 $[e, \mathfrak{g}]$ 互为 (Killing 型意义下的) 正交补:

$$\kappa(\mathfrak{z}(e), [e, \mathfrak{g}]) = \kappa([\mathfrak{z}(e), e], \mathfrak{g}) = 0$$

故 $\mathfrak{z}(e)$ 与 $[e, \mathfrak{g}]$ 正交. 又由正合列

$$0 \longrightarrow \mathfrak{z}(e) \longrightarrow \mathfrak{g} \xrightarrow{\text{ad } e} [e, \mathfrak{g}] \longrightarrow 0$$

考察维数并使用 Killing 型在半单李代数中的非退化性就有正交补关系. 注意此部分证明与 e 的幂零性无关.

- $e \in \mathfrak{z}(e)^\perp$: 对任意与 e 交换的 $x \in \mathfrak{z}(e)$, $\text{ad } x$ 也与 $\text{ad } e$ 交换, 故 e 幂零即是 $\text{ad } e$ 幂零进而导致 $\text{ad } e \circ \text{ad } x$ 幂零. 因此 $\kappa(e, x) = \text{Tr}(\text{ad } e \circ \text{ad } x) = 0$.

综上 $e \in [e, \mathfrak{g}]$, 于是存在 $h \in \mathfrak{g}$ 使得 $[h, e] = 2e$.

再修改 h 使其半单. 考虑 h 的抽象 Jordan 分解 $h = h_s + h_n$, 其中 h_s 半单, h_n 幂零. 注意 $\text{ad } h_s, \text{ad } h_n$ 都是可写成关于 $\text{ad } h$ 的多项式, 故也与 $\text{ad } h$ 共享特征向量 e . h_n 幂零, 故特征值 $[h_n, e] = 0$, 因此 $[h_s, e] = [h, e] - [h_n, e] = 2e$. 取新的 $h := h_s$ 即可.

半单的 h 使得可以关于它将 $\mathfrak{g}$ 做权空间分解 $\mathfrak{g} = \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} \mathfrak{g}_i$, 于是 $h \in \mathfrak{g}_0$, $e \in \mathfrak{g}_2$, 且容易验证 $[e, \mathfrak{g}_i] \subseteq \mathfrak{g}_{i+2}$. 现在来构造 f . 它需要满足 $[h, f] = -2f$, 故应当在 $\mathfrak{g}_{-2}$ 中寻找. 它还需满足 $[e, f] = h$, 故只需证 $h \in [e, \mathfrak{g}_{-2}]$. 如果我们暂时断言 $h \in [e, \mathfrak{g}]$, 则 $h \in \bigoplus_i [e, \mathfrak{g}_i]$. 但 $h \in \mathfrak{g}_0$, 逼迫 $h \in [e, \mathfrak{g}_{-2}]$, 证毕.

现在来证明断言 $h \in [e, \mathfrak{g}]$, 已有的条件是 $[h, e] = 2e$ 及 h 半单. 仍然用关系 $[e, \mathfrak{g}] = \mathfrak{z}(e)^\perp$, 只需证 h 与 $\mathfrak{z}(e)$ 正交. 考察 $\mathfrak{z}(e)$ 相对 h 的权空间分解 $\mathfrak{z}(e) = \bigoplus_i \mathfrak{z}(e)_i$, 这里 $\mathfrak{z}(e)_i = \mathfrak{z}(e) \cap \mathfrak{g}_i$. 于是对任意 $z_i \in \mathfrak{z}(e)_i$,

$$0 = \kappa([h, h], z_i) = \kappa(h, [h, z_i]) = i \cdot \kappa(h, z_i)$$

故 h 与 $\mathfrak{z}(e)_i$ 正交对任意 $i \neq 0$ 成立.

现在只需证 h 与 $\mathfrak{z}(e)_0$ 正交. 对任意 $z_0 \in \mathfrak{z}(e)_0$, 注意 z_0 与 e 和 h 交换. 不失一般性, 可设 z_0 半单:

- 因为其半单部分 $(z_0)_s$ 与 h 正交当且仅当 z_0 与 h 正交: 为此只需证幂零部分 $(z_0)_n$ 与 h 正交, 这是因为 $(z_0)_n$ 与 z_0 交换进而与 h 交换, 故 $\text{ad } h \circ \text{ad } (z_0)_n$ 是幂零, 因此 $\kappa(h, (z_0)_n) = \text{Tr}(\text{ad } h \circ \text{ad } (z_0)_n) = 0$.

下面证明在上述限制下只能有 $z_0 = 0$, 从而 h 与 $\mathfrak{z}(e)_0$ 的正交性平凡. 为此反设 $z_0 \neq 0$, 需要使用一个结论:

- 约化李代数任意半单元的中心化子是也是约化李代数 [McG93, lemma 2.1.2].

于是 $\mathfrak{z}(z_0)$ 是约化李代数. $\mathfrak{g}$ 半单中心平凡保证 $\mathfrak{z}(z_0)$ 比 $\mathfrak{g}$ 严格更小. 注意 $e, h \in \mathfrak{z}(z_0)$, 于是 $2e = [h, e] \in [\mathfrak{z}(z_0), \mathfrak{z}(z_0)]$, 后者是一个半单李代数. 终于, 我们把 e 放到了一个比 $\mathfrak{g}$ 严格更小的半单李代数 $[\mathfrak{z}(z_0), \mathfrak{z}(z_0)]$ 中, 但是这与整个证明一开始的假设冲突. 因此 $z_0 = 0$, h 与 $\mathfrak{z}(e)$ 正交, 断言得证.

参考文献

- [McG93] William M. McGovern. *Nilpotent Orbits In Semisimple Lie Algebra: An Introduction*. New York: Routledge, 1993. 192 pp. ISBN: 978-0-203-74580-9. DOI: [10.1201 / 9780203745809](https://doi.org/10.1201/9780203745809).