Jacobson–Morozov：$\mathfrak{sl}_2$ 在复半单李代数中的嵌入

幂零锥和其上的几何：以 $\mathfrak{gl}_n$ 为例

sun123zxy

2026-04-10

我们在复半单李代数 $\mathfrak{g}$ 中工作，并假设抽象 Jordan 分解、Killing 型和 Cartan 根空间分解理论已建立完毕．这一部分的标准参考是 [McG93, section 3.2–3.3].

定理 1（Jacobson–Morozov） [McG93, theorem 3.3.1] 设 $\mathfrak{g}$ 为一复半单李代数，对任意幂零元 $e \in \mathfrak{g}$，存在 $h, f \in \mathfrak{g}$ 使得 e, h, f 满足 $\mathfrak{sl}_2$ 的 Lie 括号关系 $[h,e] = 2e$, $[h,f] = -2f$, $[e,f] = h$.

1 讨论

完整证明很长，先来做一点讨论.

1.1 半单元

首先注意满足上述条件的 h 一定是半单的：这是通过 e, f, h 将 $\mathfrak{g}$ 实现为 $\mathfrak{sl}_2$ 的表示后，使用 $\mathfrak{sl}_2$ 表示论的完全可约性得到的结果．所以将来的证明中，构造半单的 h 也是必经之路.

1.2 A 型的显式构造

对任意幂零元 $X \in \mathfrak{sl}_n$，适当共轭可将其化为 Jordan 标准型 J_λ，于是可以分块考虑．熟记 $\mathfrak{sl}_2$ 的标准 $m+1$ 维不可约表示

$$X := \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & 1 \\ & & & & 0 \end{pmatrix} \qquad Y := \begin{pmatrix} 0 & & & & \\ 1\cdot m & 0 & & & \\ & 2\cdot(m-1) & 0 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & m\cdot 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$H := \operatorname{diag}(m, m-2, \dots, -m+2, -m)$$

这就通过 $e \mapsto X$, $f \mapsto Y$, $h \mapsto H$ 给出了 $\mathfrak{sl}_n$ 的情形下 Jacobson–Morozov 定理的一个显式构造 [McG93, corollary 3.2.7].

2 Jacbobson–Morozov 定理的证明

这里给出的证明跟随 [McG93, theorem 3.3.1]．对维数 $\mathfrak{g}$ 做归纳，则可以先假设 e 不落在 $\mathfrak{g}$ 任何真半单子李代数中——否则直接在那个更小的半单李代数中构造 h 和 f 即可．这会帮我们在后面排除一大类讨论情况.

下面开始构造．先构造 $h \in \mathfrak{g}$ 使得 $[h,e] = 2e$，为此只需证明 $e \in [e, \mathfrak{g}]$．注意

- e 的中心化子 $\mathfrak{z}(e)$ 和 $[e,\mathfrak{g}]$ 互为（Killing 型意义下的）正交补：

  $$\kappa(\mathfrak{z}(e),[e,\mathfrak{g}])=\kappa([\mathfrak{z}(e),e],\mathfrak{g})=0$$

  故 $\mathfrak{z}(e)$ 与 $[e,\mathfrak{g}]$ 正交．又由正合列

  $$0\longrightarrow\mathfrak{z}(e)\longrightarrow\mathfrak{g}\xrightarrow{\operatorname{ad}e}[e,\mathfrak{g}]\longrightarrow 0$$

  考察维数并使用 Killing 型在半单李代数中的非退化性就有正交补关系．注意此部分证明与 e 的幂零性无关．

- $e\in\mathfrak{z}(e)^{\perp}$：对任意与 e 交换的 $x\in\mathfrak{z}(e)$，$\operatorname{ad}x$ 也与 $\operatorname{ad}e$ 交换，故 e 幂零即是 $\operatorname{ad}e$ 幂零进而导致 $\operatorname{ad}e\circ\operatorname{ad}x$ 幂零．因此 $\kappa(e,x)=\operatorname{Tr}(\operatorname{ad}e\circ\operatorname{ad}x)=0$.

综上 $e\in[e,\mathfrak{g}]$，于是存在 $h\in\mathfrak{g}$ 使得 $[h,e]=2e$.

再修改 h 使其半单．考虑 h 的抽象 Jordan 分解 $h=h_s+h_n$，其中 h_s 半单，h_n 幂零．注意 $\operatorname{ad}h_s,\operatorname{ad}h_n$ 都是可写成关于 $\operatorname{ad}h$ 的多项式，故也与 $\operatorname{ad}h$ 共享特征向量 e．h_n 幂零，故特征值 $[h_n,e]=0$，因此 $[h_s,e]=[h,e]-[h_n,e]=2e$．取新的 $h:=h_s$ 即可．

半单的 h 使得可以关于它将 $\mathfrak{g}$ 做权空间分解 $\mathfrak{g}=\bigoplus_{i\in\mathbb{Z}}\mathfrak{g}_i$，于是 $h\in\mathfrak{g}_0$，$e\in\mathfrak{g}_2$，且容易验证 $[e,\mathfrak{g}_i]\subseteq\mathfrak{g}_{i+2}$．现在来构造 f．它需要满足 $[h,f]=-2f$，故应当在 $\mathfrak{g}_{-2}$ 中寻找．它还需满足 $[e,f]=h$，故只需证 $h\in[e,\mathfrak{g}_{-2}]$．如果我们**暂时断言** $h\in[e,\mathfrak{g}]$，则 $h\in\bigoplus_i[e,\mathfrak{g}_i]$．但 $h\in\mathfrak{g}_0$，逼迫 $h\in[e,\mathfrak{g}_{-2}]$，证毕．

现在来证明断言 $h\in[e,\mathfrak{g}]$，已有的条件是 $[h,e]=2e$ 及 h 半单．仍然用关系 $[e,\mathfrak{g}]=\mathfrak{z}(e)^{\perp}$，只需证 h 与 $\mathfrak{z}(e)$ 正交．考察 $\mathfrak{z}(e)$ 相对 h 的权空间分解 $\mathfrak{z}(e)=\bigoplus_i\mathfrak{z}(e)_i$，这里 $\mathfrak{z}(e)_i=\mathfrak{z}(e)\cap\mathfrak{g}_i$．于是对任意 $z_i\in\mathfrak{z}(e)_i$，

$$0=\kappa([h,h],z_i)=\kappa(h,[h,z_i])=i\cdot\kappa(h,z_i)$$

故 h 与 $\mathfrak{z}(e)_i$ 正交对任意 $i\neq 0$ 成立．

现在只需证 h 与 $\mathfrak{z}(e)_0$ 正交．对任意 $z_0\in\mathfrak{z}(e)_0$，注意 z_0 与 e 和 h 交换．不失一般性，可设 z_0 半单：

- 因为其半单部分 $(z_0)_s$ 与 h 正交当且仅当 z_0 与 h 正交：为此只需证幂零部分 $(z_0)_n$ 与 h 正交，这是因为 $(z_0)_n$ 与 z_0 交换进而与 h 交换，故 $\operatorname{ad}h\circ\operatorname{ad}(z_0)_n$ 是幂零，因此 $\kappa(h,(z_0)_n)=\operatorname{Tr}(\operatorname{ad}h\circ\operatorname{ad}(z_0)_n)=0$.

下面证明在上述限制下只能有 $z_0=0$，从而 h 与 $\mathfrak{z}(e)_0$ 的正交性平凡．为此反设 $z_0\neq 0$，需要使用一个结论：

- 约化李代数任意半单元的中心化子是也是约化李代数 [McG93, lemma 2.1.2].

于是 $\mathfrak{z}(z_0)$ 是约化李代数．$\mathfrak{g}$ 半单中心平凡保证 $\mathfrak{z}(z_0)$ 比 $\mathfrak{g}$ 严格更小．注意 $e,h\in\mathfrak{z}(z_0)$，于是 $2e=[h,e]\in[\mathfrak{z}(z_0),\mathfrak{z}(z_0)]$，后者是一个半单李代数．终于，我们把 e 放到了一个比 $\mathfrak{g}$ 严格更小的半单李代数 $[\mathfrak{z}(z_0),\mathfrak{z}(z_0)]$ 中，但是这与整个证明一开始的假设冲突．因此 $z_0=0$，h 与 $\mathfrak{z}(e)$ 正交，断言得证．

参考文献

[McG93] William M. McGovern. *Nilpotent Orbits In Semisimple Lie Algebra: An Introduction*. New York: Routledge, 1993. 192 pp. ISBN: 978-0-203-74580-9. DOI: 10.1201/9780203745809.