



厦门大学《概率统计 I》期末试卷

____学院____系____年级____专业

主考教师： 试卷类型：（A 卷）

分数	阅卷人

一、（16 分）（1）设随机变量 X 和 Y 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1+xy}{3} & 0 < x < 2, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求 X 和 Y 的相关系数；

（2）对随机变量 X 和 Y ，已知 $D(X)=2$ ， $D(Y)=3$ ， $\text{Cov}(X, Y)=1$ ， $Z=3X-2Y+1$ ， $U=X+4Y-3$ ，求 Z 和 U 的相关系数。

解（1） $f_X(x) = \frac{1}{3} + \frac{x}{6}, 0 < x < 2$; $f_Y(y) = \frac{2}{3} + \frac{2y}{3}, 0 < y < 1$

$$E(X)=10/9, E(Y)=5/9, E(XY)=17/27,$$

$$\text{Cov}(X, Y)=1/81.$$

$$E(X^2)=\frac{14}{9}, D(X)=\frac{26}{81}; E(Y^2)=\frac{7}{18}, D(Y)=\frac{13}{162}. \rho_{XY} = \frac{2}{3\sqrt{91}} = \frac{1}{13}$$

$$(2) \text{Cov}(Z, U)=3DX+10\text{Cov}(X, Y)-8DY=-8.$$

$$D(Z)=9DX+4DY-12\text{Cov}(X, Y)=18$$

$$D(U)=DX+16DY+8\text{Cov}(X, Y)=58$$

$$\rho_{Z, U} = -\frac{4}{3\sqrt{29}}$$

分数	阅卷人

二、(14 分) 某药厂生产的某种药品医治一种疑难的血液病, 医院检验员任意抽查 100 个服用此药品的病人,

(1) 若此药品对这种疾病治愈率是 0.8, 问多于 75 人治愈的概率是多少?

(2) 若有 80 人治愈, 求治愈率 p 的置信水平为 0.95 的置信区间? $\Phi(1.25) = 0.8944$, $\Phi(1.96) = 0.975$

解 (1) X 服从 $B(100, 0.8)$,

$$P\left\{\sum_{i=1}^{100} X_i > 75\right\} = 1 - P\{X \leq 75\} \approx 1 - \Phi\left(\frac{75 - 100 \times 0.8}{\sqrt{100 \times 0.8 \times 0.2}}\right) \\ = 1 - \Phi(-1.25) = \Phi(1.25) = 0.8944.$$

(3) X 服从 $b(100, p)$

$$P\left\{\left|\frac{100\bar{X} - 100p}{\sqrt{100p(1-p)}}\right| < 1.96\right\} \approx 1 - \alpha$$
 解不等式: $\left|\frac{100\bar{x} - 100p}{\sqrt{100p(1-p)}}\right| < 1.96$
 $\bar{x} = 0.8$

$$(100\bar{X} - 100p)^2 < 1.96^2 \times 100p(1-p)$$

$$64 - 163.841p + 103.841p^2 < 0$$

$$p \in (0.7889 - \sqrt{0.006}, 0.7889 + \sqrt{0.006}) = (0.711, 0.8667)$$

分数	阅卷人

三、(12分) 设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{\sigma} \exp \left\{ -\frac{x+1}{\sigma} \right\}, \quad x > -1$$

其中 σ 是未知参数, 从总体中抽取 $n=5$ 的简单随机样本, 样本值为 1, 1, 2, 3, 3, 求 σ 的矩估计和最大似然估计。

计算一阶矩

$$EX = \int_{-1}^{\infty} \frac{x}{\sigma} \exp \left\{ -\frac{x+1}{\sigma} \right\} dx = \int_0^{\infty} \frac{1}{\sigma} (\sigma t - 1) e^{-t} dt = \sigma - 1$$

所以

$$\hat{\sigma} - 1 = \bar{X} = \frac{1}{5}(1+1+2+3+3) = 2$$

σ 的矩估计量为

$$\hat{\sigma} = 3.$$

数据的似然函数为

$$L = \prod_{i=1}^5 \frac{1}{\sigma} \exp \left\{ -\frac{x_i+1}{\sigma} \right\} = \left(\frac{1}{\sigma} \right)^5 \exp \left\{ -\frac{1}{\sigma} \sum_{i=1}^5 (x_i+1) \right\} = \frac{1}{\sigma^5} \exp \left\{ -\frac{15}{\sigma} \right\}$$

取对数, 求导,

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \sigma} = \frac{\partial (-5 \ln \sigma - \frac{15}{\sigma})}{\partial \sigma} = -\frac{5}{\sigma} + \frac{15}{\sigma^2} = 0$$

所以 σ 的最大似然估计量为

$$\hat{\sigma}_{MLE} = 3.$$

$$= \sigma^{-5} e^{-\frac{5 \sum_{i=1}^5 x_i + 5}{\sigma}} = \sigma^{-5} e^{-\frac{15}{\sigma}}$$

$$\ln L = -5 \ln \sigma - \frac{15}{\sigma}$$

分数	阅卷人

四、(12分) 设某种砖头的抗压强度 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$ ，今随机抽取 9 块砖头，测得数据如下：

64 69 49 92 55 97 41 84 88

(1) 求 μ 的置信概率为 0.95 的置信区间；

(2) 求 σ^2 的置信概率为 0.95 的置信区间。

$$(t_{0.025}(8) = 2.306, \chi_{0.025}^2(8) = 17.534, \chi_{0.975}^2(8) = 2.18)$$

解 $\bar{X} = 71, S^2 = 408.5, S = 20.21$

$$\mu \text{ 的置信概率为 } 0.95 \text{ 的置信区间 } (71 \pm 2.306 \frac{20.21}{3}) = (55.464, 86.535)$$

$$\sigma^2 \text{ 的置信概率为 } 0.95 \text{ 的置信区间 } (\frac{8 \times 408.5}{17.534}, \frac{8 \times 408.5}{2.18}) = (186.38, 1499.082)$$

分数	阅卷人

五、（12分）溪流混浊是由于水中有悬浮固体，分别以 X, Y 表示晴天和雨天的混浊度（以 NTU 单位计）的总体。设 $X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$, $Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$ ，

$\mu_X, \mu_Y, \sigma_X^2, \sigma_Y^2$ 均未知。今取到总体 X 的容量 $n_1 = 9$ 的样本，算得样本均值为 $\bar{x} = 93$ ，样本标准差为 $s_X = 12.9$ ；取到总体 Y 的容量为 $n_2 = 11$ 的样本，算得样本均值为 $\bar{y} = 132$ ，样本标准差为 $s_Y = 7.1$ ，两样本独立。

（1）试检验假设 ($\alpha = 0.05$): $H_0: \sigma_X^2 = \sigma_Y^2$, $H_1: \sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2$;

（2）如能接受 H_0 ，接着检验假设 ($\alpha = 0.025$) $H'_0: \mu_X \geq \mu_Y$, $H'_1: \mu_X < \mu_Y$ 。

$t_{0.025}(18) = 2.1009$, $F_{0.025}(8,10) = 3.85$, $F_{0.025}(10,8) = 4.3$

解：（1）这是一个两个正态总体的方差之比的检验问题，属于双边检验。检验统计量为 $F = \frac{s_X^2}{s_Y^2}$

代入本题中的具体数据得到 $F = \frac{12.9^2}{7.1^2} = 3.301$ 。

检验的临界值为 $F_{0.025}(8,10) = 3.85$, $F_{0.975}(8,10) = \frac{1}{4.3} = 0.2326$ 。因为 $0.2326 < F = 3.301 < 3.85$ ，所以样本值没有落入拒绝域，因此接受原假设，即认为两总体方差相等。

（2）因为两总体方差相等，所以这是一个方差相等的两个正态总体的均值之差的检验问题，属于左边检验。检验统计量为

$$t = \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - 0}{s_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

代入本题中的具体数据得到 $t = \frac{(93 - 132) - 0}{10.1 \times \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{1}{11}}} = -8.5929$ 。

检验的临界值为 $t_{0.025}(18) = 2.1009$ 。因为 $t = -8.5929 < -2.1009$ ，所以样本值落入拒绝域，因此拒绝原假设。

分数	阅卷人

六、（12 分）美国《教育统计文摘》1993 年版给出该国 18 岁或以上的人持有学士或更高学位的年龄分布如下

年 龄	18~24	25~34	35~44	45~54	55~64	65 或以上
百分比	5	29	30	16	10	10

在阿拉斯加州随机选择 500 个 18 岁或以上的持有学士或更高学位的一项调查给出如下数据

年 龄	18~24	25~34	35~44	45~54	55~64	65 或以上
人 数	30	150	155	75	35	55

试取 $\alpha = 0.1$ 检验该地区年龄分布是否和全国一样。 $\chi^2_{0.1}(5) = 9.236$

解：根据题意，要检验以下假设：

H_0 ：阿拉斯加州的年龄分布律为

年 龄	18~24	25~34	35~44	45~54	55~64	65 或以上
概 率	0.05	0.29	0.30	0.16	0.10	0.10

检验统计量为 $\chi^2 = \sum_{i=1}^6 \frac{f_i^2}{np_i} - n$ 。所需计算列表如下：

A_i	f_i	p_i	np_i	$f_i^2 / (np_i)$
A_1	30	0.05	25	36
A_2	150	0.29	145	155.172
A_3	155	0.30	150	160.167
A_4	75	0.16	80	70.313
A_5	35	0.10	50	24.5
A_6	55	0.10	50	60.5

$\chi^2 = \sum_{i=1}^6 \frac{f_i^2}{np_i} - n = 506.652 - 500 = 6.652$ ，检验的临界值为 $\chi^2_{0.1}(6-1) = 9.236$ 。因为

$\chi^2 = 6.652 < 9.236$ ，所以样本值没有落入拒绝域，因此接受原假设，即认为阿拉斯加州的年龄分布与全国的分布一样。

分数	阅卷人

七、(10 分) 灯泡厂用 4 种不同的材料制成灯丝, 检验灯线材料这一因素对灯泡寿命的影响. 若灯泡寿命服从正态分布, 不同材料的灯丝制成的灯泡寿命的方差相同, 试根据表中试验结果记录, 在显著性水平 0.05 下检验灯泡寿命是否因

灯丝材料不同而有显著差异? $F_{0.05}(3,14) = 3.34$.

		试验批号				
		1	2	3	4	5
灯丝	A_1	19	22	20	18	15
材料	A_2	20	21	33	27	40
水平	A_3	16	15	18	26	17
	A_4	18	22	19		

【解】

$$r = 4, n = \sum_{i=1}^r n_i = 18;$$

$$S_T = \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 x_{ij}^2 - \frac{T_{..}^2}{n} = 8992 - 386^2/18 = 714.44,$$

$$S_A = \sum_{i=1}^4 \frac{1}{n_i} T_i^2 - \frac{T_{..}^2}{n} = 318.98,$$

$$S_E = S_T - S_A = 395.46$$

$$F = \frac{S_A / (r-1)}{S_E / (n-r)} = \frac{318.98/3}{395.46/14} = 3.76,$$

$$F_{0.05}(3,14) = 3.34 < F.$$

故灯丝材料对灯泡寿命有显著影响.

分数	阅卷人

八、(12分) 某医院用光色比色计检验尿贡时, 得尿贡含量与肖光系数读数的结果如下:

尿贡含量 x	2	4	6	8	10
肖光系数 y	64	138	205	285	360

求: (1) 求 y 与 x 的一元线性回归方程.

(2) 对所得的回归方程作显著性检验. ($\alpha=0.01$) $F_{0.99}(1,3)=34.1, t_{0.005}(3)=5.8409$

【解】由数据可以求得, $n=5$

$$\sum_{\alpha} x_{\alpha} = 30, \bar{x} = 6$$

$$\sum_{\alpha} y_{\alpha} = 1052, \bar{y} = 210.4$$

$$\sum_{\alpha} x_{\alpha}^2 = 220, \sum_{\alpha} x_{\alpha} y_{\alpha} = 7790, \sum_{\alpha} y_{\alpha}^2 = 275990$$

$$l_{xx} = 40, l_{xy} = 1478, l_{yy} = 54649.2$$

则, 最小二乘估计为:

$$\hat{\beta}_0 = -11.3, \hat{\beta}_1 = 36.95$$

检验假设 $H_0: \beta_1 = 0$

$$\sigma^2 = (l_{yy} - \hat{\beta}_1 l_{xy}) / (n-2) = 12.36 = \hat{\sigma}^2 = \frac{S_{yy} - \hat{\beta}_1 S_{xy}}{n-2}$$

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\hat{\sigma}^2}$$

$$t = \frac{\hat{\beta}_1 \sqrt{l_{xy}}}{\sqrt{(l_{yy} - \hat{\beta}_1 l_{xy}) / (n-2)}} = 66.46 > t_{0.005}(3) = 5.8409,$$

$$|t| = \left| \frac{\hat{\beta}_1 \sqrt{S_{xx}}}{\hat{\sigma}} \right|$$

因此, 拒绝原假设。

即两变量的线性相关关系是显著的.

或者

检验假设 $H_0: \beta_1 = 0$ 可用统计量

$$F = \frac{\hat{\beta}_1^2 l_{xy}}{(l_{yy} - \hat{\beta}_1 l_{xy}) / (n-2)} = 4416 > F_{1-\alpha}(1,3) = 34.1, \alpha = 0.01$$

因此, 拒绝原假设。

即两变量的线性相关关系是显著的.

