

# 高等代数 (II) 第一次作业情况

李卓远      数学科学学院

[zy.li@stu.pku.edu.cn](mailto:zy.li@stu.pku.edu.cn)

## 1 补充说明

- 上交作业写清姓名和学号, 多张纸标好页码, 如没有装订须在每页正面写上个人信息;
- 注意叙述的科学性. 两个多项式的最大公因式有且仅有一个, 不应出现“存在/一个……的最大公因式”等类似表述; 在未说明  $g|f$  时不应出现形如  $\frac{f}{g}$  的表述.

## 2 2 月 21 日作业

无.

## 3 2 月 24 日作业

P8: 4, 5, 6, 7; P13: 3(2), 4, 7, 8

P8: 5. (注意零因子和零的差别) 若不然, 设可逆元  $r \in R$  为左零因子, 那么根据定义存在非零  $s \in R$  使得  $rs = 0$ , 于是有

$$s = 1s = r^{-1}rs = r^{-1}0 = 0,$$

这与  $s \neq 0$  的假设矛盾. 同理  $r$  也不可能为右零因子.

□

## 4 2 月 28 日作业

P21: 1(2), 2, 3, 4, 5

P21: 1(2).

$$\begin{aligned}
& (x^4 + 6x^3 - 6x^2 + 6x - 7, x^3 + x^2 - 7x + 5) \\
&= ((x+5)(x^3 + x^2 - 7x + 5) + (-4x^2 + 36x - 32), x^3 + x^2 - 7x + 5) \\
&= (-4x^2 + 36x - 32, x^3 + x^2 - 7x + 5) \\
&= (x^2 - 9x + 8, x^3 + x^2 - 7x + 5) \\
&= (x^2 - 9x + 8, (x+10)(x^2 - 9x + 8) + (75x - 75)) \\
&= (x^2 - 9x + 8, 75x - 75) \\
&= (x^2 - 9x + 8, x - 1) \\
&= ((x-8)(x-1), x-1) = x-1
\end{aligned}$$

Conversely,

$$\begin{aligned}
& x-1 \\
&= \frac{1}{75}(0(x^2 - 9x + 8) + (75x - 75)) \\
&= \frac{1}{75}(-(x+10)(x^2 - 9x + 8) + (x+10)(x^2 - 9x + 8) + (75x - 75)) \\
&= \frac{1}{75} \cdot \frac{1}{4}((x+10)(-4x^2 + 36x - 32) + 4(x^3 + x^2 - 7x + 5)) \\
&= \frac{1}{300}((x+10)((x+5)(x^3 + x^2 - 7x + 5) + (-4x^2 + 36x - 32)) \\
&\quad + (4 - (x+10)(x+5))(x^3 + x^2 - 7x + 5)) \\
&= \frac{1}{300}((x+10)(x^4 + 6x^3 - 6x^2 + 6x - 7) + (-x^2 - 15x - 46)(x^3 + x^2 - 7x + 5)) \\
&= \frac{x+10}{300}(x^4 + 6x^3 - 6x^2 + 6x - 7) + \frac{-x^2 - 15x - 46}{300}(x^3 + x^2 - 7x + 5)
\end{aligned}$$

□

题目 4.1. 设  $f, g \in \mathbb{F}[x]$ ,  $\lambda \in \mathbb{F}$ , 则

$$R(f, (x - \lambda)g) = (-1)^{\deg f} f(\lambda) R(f, g).$$

题目 4.2. 设

$$\begin{aligned}
f &= 2x^3 - 3x^2 + \lambda x + 3 \\
g &= x^3 + \lambda x + 1.
\end{aligned}$$

$\lambda$  为何值  $f$  和  $g$  有非平凡重因子.

题目 4.3. 求

$$R(x^n + x + 1, x^2 - 3x + 2).$$