

高等代数 (II) 第五、六次作业情况

李卓远 数学科学学院

zy.li@stu.pku.edu.cn

1 4月14日作业

P112: 3, 5, 7, 8, 9

P112: 9. 若不然, 不妨设

$$k_1 \mathcal{A}^{n_1} \alpha + k_2 \mathcal{A}^{n_2} \alpha + \cdots + k_s \mathcal{A}^{n_s} \alpha = 0$$

满足 $0 \leq n_1 < n_2 < \cdots < n_s \leq m-1$ 且 k_1, k_2, \cdots, k_s 均不为零. 于是有

$$0 = \mathcal{A}^{m-1-n_1} 0 = \sum_{j=1}^s k_j \mathcal{A}^{m-1-n_1} \mathcal{A}^{n_j} \alpha = \sum_{j=1}^s k_j \mathcal{A}^{n_j-n_1-1} \mathcal{A}^m \alpha = k_1 \mathcal{A}^{m-1} \alpha \neq 0,$$

矛盾. 另法: 若不然, 存在 $f \in \mathbb{F}[x]$ 满足

$$f(\mathcal{A})\alpha = 0, \quad \deg f < m.$$

结合 $\mathcal{A}^m \alpha = 0$ 可知 $(f, x^m)(\mathcal{A})\alpha = 0$. 而 x^m 的因式必为 x 的幂, 结合 $\deg f < m$ 可知存在 $l < m$ 使得 $\mathcal{A}^l \alpha = 0$, 这与 $\mathcal{A}^{m-1} \alpha \neq 0$ 矛盾.

P116: 3, 4, 5, 7

P116: 5

(1) (\Rightarrow)

$$A^2 = A \Rightarrow (A - I)A = 0 \Rightarrow \operatorname{im} B = \operatorname{im} A \subseteq \ker(A - I) \Rightarrow (A - I)B = 0.$$

(\Leftarrow)

$$AB = B \Rightarrow \operatorname{im} B = \operatorname{im} AB \subseteq \operatorname{im} A.$$

(2) (\Rightarrow)

$$A^2 = A \Rightarrow A(A - I) = 0 \Rightarrow \operatorname{im}(A - I) \subseteq \ker A = \ker B \Rightarrow B(A - I) = 0.$$

(\Leftarrow)

$$AB = A \Rightarrow \ker A = \ker AB \supseteq \ker B.$$

2 4月18日作业

P121: 2, 5, 9, 12, 14

P136: 2, 3, 4, 5, 9

题目 2.1. 设 $V_i = \ker p_i^{e_i}(\mathcal{A})$, 记 $P_{V_i}: V = \bigoplus_i V_i \rightarrow V$ 为到 V_i 上的投影, 则 P_{V_i} 为 \mathcal{A} 的多项式.

证明. 记 $g_k(x) = \prod_{j \neq k} p_k^{e_k}(x)$, 由于 $(g_1, \dots, g_s) = 1$, 存在 u_1, \dots, u_s 使得 $\sum_k u_k g_k = 1$. 对任意 $\alpha \in V$, 设 $\alpha_k = u_k(\mathcal{A})g_k(\mathcal{A})\alpha$, 则

$$\alpha = \sum_k u_k(\mathcal{A})g_k(\mathcal{A})\alpha = \sum_k \alpha_k, \alpha_k \in V_k.$$

故而设 $P_{V_i} = u_i(\mathcal{A})g_i(\mathcal{A})$ 即可. □

3 4 月 28 日作业

P139: 4

P147: 1(2), 2(4), 7, 8, 10

P152: 1, 2, 3

4 5 月 9 日作业

P159: 1(5)(6), 2, 7, 11, 12

题目 4.1. 刻画所有 n 阶方阵的相似分类的有理标准形.

题目 4.2. 求 $A = \begin{pmatrix} 6 & -3 & -2 \\ 4 & -1 & -2 \\ 10 & -5 & -3 \end{pmatrix}$ 的有理标准形.

题目 4.3. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 满足 $A^2 = -I$, 求其有理标准形.