

BioMaster 双 warm 成功案例

药物已见 · 靶点已见 · 精确药物-靶点关系未进入 FULL_FIT 训练

案例 1 · 主展示

Lorlatinib → PLK4

18 / 720

前 2.5%

模型条件	药物 warm、PLK4 warm、精确关系未见；口袋/结构分支启用。
三 seed 排名	49、4、27；集成后稳定进入高优先级区。
外部实验支持	化学蛋白组学结合效力 $K_i \approx 0.1074 \mu\text{M}$ ；本地外部激酶面板记录 1 μM 下 80.575% inhibition，后续研究亦观察到 PLK4 剂量依赖性 MIB binding 降低。

目前最适合作为 BioMaster 双 warm 关系发现能力的主展示案例。

案例 2 · 辅助展示

Pitavastatin → IDO1

25 / 720

前 3.5%

模型条件	归一化活性部分 warm、IDO1 warm、精确关系未见；口袋/结构分支启用。
三 seed 排名	80、98、9；集成达到高优先级，但 seed 间波动高于案例 1。
外部实验支持	2024 年体外酶抑制实验报告 pitavastatin calcium 对 hIDO1 的 IC50 为 $351 \pm 16 \text{ nM}$ 。

作为非激酶靶点方向的第二案例，说明命中不局限于 kinase-family 邻近关系。

- Liao et al., Cell Chemical Biology (2024), DOI: 10.1016/j.chembiol.2023.09.011; Matkar et al., Molecular Cancer Therapeutics (2025), DOI: 10.1158/1535-7163.MCT-24-0684.
- Scientific Reports (2024), DOI: 10.1038/s41598-024-59353-4.