ARTICLE 16 October 2026

自主研究如何塑造科学理解

Jiangjie Qiu[1,*], Yijun Li[1,*], Yaotian Yang[1,*], Honghao Chen[1], Wentao Li[1], Xiaonan Wang[1,†]
[1]Beijing Key Laboratory of Artificial Intelligence for Advanced Chemical Engineering Materials, State Key Laboratory of Chemical Engineering and Low-Carbon Technology, Department of Chemical Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084, China.
* Jiangjie Qiu, Yijun Li and Yaotian Yang contributed equally.
† Correspondence: wangxiaonan@tsinghua.edu.cn.

全部插图为 ImageGen 预览；几何仅作示意，精确数值见保留证据。

自主科学的承诺，是将实验自主性转化为科学理解，但研究如何组织自身的证据基础仍缺乏理解。我们提出 ChemWorld：智能体自主选择实验，而底层规律与信息供给可被独立控制的可编程化学世界。通过六个体系的重复研究与受控比较，我们连接研究条件、实验经历和后续判断。智能体能够将预期转化为检验，修订局部关系，并根据结果选择后续实验；其解释也会改变资源使用及之后获取证据的机会。研究大幅改善结晶预测，但细粉点预测的改善与不确定性估计的恶化并存；平衡研究提高整体预测，却损害极稀区域的判断。目标与信息对操作成果和预测也有不同后果。这些发现揭示自主探索如何形成有用认识，同时留下尚未充分解决的适用范围，并为研究探索与科学理解如何相互塑造提供受控实证基础。

科学发现能够引入理解现象的新方式，并由此开辟新的研究方向。爱因斯坦在 1905 年狭义相对论论文的开篇指出，磁体与导体相对运动的可观察效应，与当时理论描述中的不对称并不相称，随后提出原理并推演其对时间和运动的后果 [1]。提出值得进一步研究的解释性可能，是这一创造性活动的一个方面，也是反绎推理所关注的内容 [2]。更广泛地说，发展中的认识会改变研究者比较什么、哪些结果需要解释，以及接下来探索什么。

随着 AI Scientist 与自主实验室承担更多研究组织工作，这一联系成为具体的科学问题 [3,4]。机器人科学家与自主实验室已经展示假设检验、材料发现和反应优化 [5–8]，语言模型智能体进一步连接科学指令与实验室工具及操作 [9,10]。实验成功确立了一项成果，却不能单独说明研究者形成了什么关系认识，以及证据在多大范围内支持这一认识 [11,12]。

自主研究者获得的证据，本身就是探索的结果。目标与已有知识影响实验选择；实验使特定现象可见，也消耗资源；由此形成的判断又可能改变后续研究方向。成功的实验可以支持有用的局部关系，失败的实验也可以排除一种预期并改变下一项决定。理解这一过程，需要同时追踪证据如何改变判断，以及判断如何改变继续获取证据的机会 [13–15]。

我们在 ChemWorld 中研究这些联系。核心问题是：当初始信息不足以决定答案时，智能体如何组织探索、发展科学理解，而这些理解又如何塑造后续研究？覆盖六个化学体系的四个互补矩阵连接研究目标与信息、连续研究经历、实验机会和匹配世界中的区分证据。我们在完整轨迹中追踪具体判断，并在重复会话间比较其后果，由此将研究的组织方式与其建立、修订和采用的关系联系起来。

使自主科学探索成为可检验的研究对象

ChemWorld 将材料、操作和仪器组合为由热力学、动力学及耦合过程关系驱动的持续化学世界。反应、热处理、平衡、分离与结晶组件可以连接为多阶段流程。样品状态持续保留：上游反应或热历史会改变下游分离与测量。智能体在固定资源额度内选择数量、处理顺序、测量及后续实验；评价者独立控制世界参数与公开信息，记录实际提交的操作，并获得不向研究者公开的参照结果（图 1）。

这一安排使证据选择与证据解释能够共同接受检查。知识测试和给定数据任务考察重要的科学能力 [16,17]，交互式发现环境也已经将行动与观察连接起来 [18–21]。ChemWorld 使这些选择在可组合化学过程中可被核对。公开记录确定智能体看见和提出了什么，执行记录确定哪些干预改变了样品，独立世界响应检验后续预测。操作请求可能失败而没有产生预期实验；在一种条件下得到支持的关系，在另一条件下仍可能未决。

整合设计包含四个矩阵、450 场计划研究。目标—信息矩阵包括电化学与反应处理各 90 场；过程矩阵包括分配、纯化、平衡和反应耦合结晶各 45 场；机会矩阵在平衡与结晶中分别比较有研究与无研究，每体系 30 场；另有 30 场使用匹配水相世界。最近实验块贡献 300 场，另外 150 场沿用早期固定协议，各块及其失败分别报告（方法；扩展数据图 2）。

Opaque 提供任务与操作合同，不附加实例资料；Aligned 提供正确但不完整的信息；MisIndexed 提供指定错配。发现任务强调研究科学关系，优化任务强调形成有效方案。世界、接口和额度按各固定块设计保持，每单元有三次独立开启的会话，模型采样随机种子不可控。这些对照规定研究的起始条件，实际路径由智能体组织。

实验结束后，研究者依次封存科学说明、在无实验室访问条件下预测十二项新干预，并在没有真值反馈时反思。我们将同期判断与实际操作、观察、修订和后续用途连接起来。全部 300 场新研究的公开经历均已阅读，包括不完整经历与失败检验；随后按解释内容选取示例轨迹。稳定的研究标签将下文核心案例与补充材料中的完整记录和关键时点对应。世界中成立什么、特定时点的证据支持什么，以及研究者实际采用什么判断，始终分别考察。

科学探索的自主组织与适应

目标与信息为研究提供不同起点，其后果取决于研究者实际探索什么。在重复电化学矩阵中，相较发现任务，优化任务使世界等权的推荐复测分数从 0.4813 升至 0.5852，产率从 0.1310 升至 0.4225；但分数、产率和法拉第效率的预测误差分别从 0.1539、0.0665 和 0.1677 升至 0.1829、0.0781 和 0.2218，三个误差方向均见于全部五个世界（图 2a、b）。形成更有效的方案，并不保证对新干预的判断更准确。




图 1 | 自主研究塑造自身的证据基础。a，智能体在持续化学世界中选择材料、操作和测量。b，底层规律与信息供给独立受控，参照结果不向研究者公开。c，公开预期、所选比较、观察、判断修订和后续行动在研究历史中连接；资源与样品状态限制剩余实验机会。图示是分析框架，不表示每场研究均遵循同一循环。ImageGen 预览，几何仅作示意。

信息也产生分化的后果。反应优化任务中，Aligned 相较 Opaque 使推荐分数从 0.2735 升至 0.4429，产率从 0.5502 升至 0.7116；风险预测误差从 0.2389 降至 0.1226，而转化率误差从 0.0355 升至 0.1595，四个方向均见于五个世界（图 2c、d）。比较对象是完整的目标或信息条件。这些结果明确了需要解释的后果，并不将某条选定经历认定为其唯一原因。

纯化研究 A 直接展示结果如何改变研究组织（图 3a）。无洗流程已得到纯度 0.8140、回收 0.0479；增加有机相量提高了回收，却使纯度停留在 0.7886，低于要求的 0.80。第 11 批之前，研究者预测 0.005 L 的小体积洗涤可以跨过纯度门槛，并事先规定行动标准：只有回收同时超过 0.0479，才重复这一洗涤方案。这里区分了预期的科学响应与继续推进流程的条件。

第 11 批纯度达到 0.8013，回收却只有 0.0441。第一项预期实现，继续条件没有满足。因此，第 12 批回到较早的无洗流程，重复得到纯度 0.8149、回收 0.0368。终末说明承认合格状态可重复，同时回收存在变动；后续预测保留了观察到的纯度—回收权衡。研究者没有把一个响应的改善视为继续替代方案的充分理由。事前标准、实际检验与下一行动具有时间上的对应；接近阈值的洗涤结果仍是局部观察，不能据此认定稳健合格。

纯化研究 B 展示判断如何改变之后仍可获得的证据。前四批回收偏低后，研究者提出可能遗漏了一个投料组分，并说明后续会补入该组分。接下来四批实际使用两种投料命令，但两者消耗同一共享库存；库存耗尽使计划中的温度实验无法完成。终末笔记正确地将这些拒绝或空白操作排除于温度响应证据之外。该解释同时涉及化学与操作语义，但实际序列清楚：候选解释改变材料使用，材料使用改变剩余研究机会。记录没有将这一解释的作用与选择的所有其他决定因素隔离。

两条电化学经历进一步把任务比较与局部证据的不同用途联系起来。电化学研究 A 以匹配的正负极性比较开始：负电位产生响应，所测正电位条件基本不活跃。后续批次沿负侧细化材料和时长，终末笔记明确将极性结论限制于已测流程。然而，随后的数值预测仍给未经检验、位于已研究电位幅值之内的正侧条件近背景响应，区间没有覆盖参照结果。公开声明的适用边界与新判断中的实际应用可以分离。

同样承担优化任务的电化学研究 B，则把极性依赖的范围变成了实验问题（图 3c）。十批材料与时长研究之后，研究者记录正极性尚未受到挑战，并留出一次匹配反向检验和一次精确重复。第 11 批在 −1.0 V 下仍得到产率 0.384；正电位流程及其末批重复分别约为 0.911 和 0.905。终末说明将认识从表面的极性特异性修订为极性优势，后续预测也保留反向产物。这是优化过程中实际发生的解释检验，形成了更有范围、仍然有用的关系。两条经历的世界和信息条件不同，因此展示的是不同路径，不是检验策略的随机对照。

关键在于，一项判断是否改变了实际比较，以及结果随后被怎样使用。历史五模型平衡研究提供另一种对照：部分准确预测来自主动进入稀释区域，另一些则来自局部观察上的外推（扩展数据图 7）。这些研究扩




图 2 | 目标与信息对操作和预测产生不同后果。a、b，电化学发现—优化重复比较，每任务 45 场，覆盖五世界、三信息条件；优化下推荐分数和产率提高，三项预测误差上升。c、d，反应优化的 Opaque—Aligned 比较，每组 15 场；推荐分数和产率提高，风险误差下降，转化率误差上升。配对标记概括五个固定世界，总体标注为先在世界内、再在世界间等权平均。这是条件间比较，不是同一智能体的发展过程。ImageGen 预览，几何示意，精确世界数值见补充材料。

展了可观察路径的范围，但不增加当前矩阵的重复数，也不定义模型的固定性格。

科学认识在实验中的形成与演变

反应研究 A 追踪一项预期如何从观察进入新实验，再进入后续应用（图 3b）。390 K、加热 1,800 s 后直接终止，转化率为 0.41718；另一批同样加热后不立即淬灭，而等待 1,800 s，虽然降温约 44 K，转化率仍升至 0.61847。研究者据此认为，停止外部加热并不等于化学变化结束。末批之前，它预测若先淬灭再等待相同时长，转化应保持在约 0.42，而不是未淬灭等待的约 0.62。

末批真正执行这一顺序，得到转化率 0.42724。随后笔记保留了淬灭操作与抑制进一步转化之间的局部关系。这项新证据改变了研究者对哪一段处理历史仍具有化学后果的认识；后续预测将该关系用于新流程，但未观测溶剂和投料条件下的迁移仍较不准确。已经建立的进展是具体的：事前明确提出的操作比较，支持了一项有用的局部预期。

这一结果的实验含义取决于所实现的世界。淬灭改变温度、风险和时钟，但不额外积分反应；未淬灭等待则可以继续化学变化。两批的冷却历史也不同。因此，观察支持已测操作顺序下的反应抑制，却没有将非热机制与相伴的温度改变分开。这一具体边界保留检验本身的科学内容，并将其与完整反应网络解释区分。

匹配世界矩阵在独立控制底层化学的条件下考察相关问题（图 4）。五对水相世界共享公开说明与部分参数，区别在于是否耦合额外中性离子对。将实际动作在配对世界重放，表明三十场研究均获得至少一个在两个响应通道上相差三倍测定标准差的观察。这量化了物理上可获得的信息；研究者是否认识到这些信息解决了什么，仍须放回实际经历中检查。

匹配世界研究 A 中，研究者事先提出：尖锐沉淀起始点和被缓冲的溶解响应将支持溶解度限制解释，而平滑变化也容许经验分配描述。六次测定之后，它提出更密集的浓度采样、中点重复与增加投料；后六批实施这些选择。最终说明保留平滑单调关系，预测也明确表示，由于没有分辨出尖锐阈值，将采用这一关系。匹配世界研究 B 先提出将浓样从 0.75 M 稀释至 0.375 M 的响应预期，再执行稀释；归一化 pH 从 0.08045 升至 0.10803。研究者支持近似可逆性，但最近的独立配制对照为 0.4 M，沉淀读数也来自不同仪器。这些记录把明确的候选与实际比较、有范围的结论连接起来；单有物理区分力不能建立这种联系。

互补经历显示，认识也可以通过失败预期继续发展（扩展数据图 8）。更强混合推翻暂定的分配平台；第四次结晶热循环没有延续第三次的改善；进一步稀释使可回收颗粒消失，收窄了原先设想的操作窗口。这些检验通过修订判断作出贡献，即使最终方案没有改善。实验未分离同时变化的因素时，它们各自的作用仍然未决。




图 3 | 三条核心经历中的预期、检验与后续研究。a，纯化研究 A：小洗量实现纯度预期，但回收未达到事前继续标准，研究者因此重复较早无洗流程。b，反应研究 A：未淬灭等待引出淬灭后等待的预测与检验，并获得局部支持。c，电化学研究 B：反向仍产生明显产物，将绝对特异性修订为极性优势，末批重复正侧流程。各行是独立选取的完整轨迹；文字概括公开笔记，数值是个别观察而非处理均值，批次与笔记定位见补充材料。ImageGen 预览，几何示意。

我们在完整研究轨迹中追踪这些具体判断。同一会话中，一项有依据的修订可以与另一处未经支持的前提并存。支持案例涉及研究者如何重建实际做过什么：有的把回滚操作视为已完成检验，另一些则明确排除它们（扩展数据图 6）。焦点加热案例的公开返回同时包含成功标识、明确回滚信息和零时间及温度变化。因此，后续解释涉及接口呈现与实验经历重建的共同作用，不能单独归为化学推断失败。方法与补充材料保留了这些冲突信号，并区分终末说明与在后续行动之前已经记录的前提。

这些经历中的认识发展，体现为实际比较、证据支持的关系，以及进入下一项决定的内容发生变化。它们是研究中相互连接的转变；最终答案正确或使用科学语言，都不能单独证明这些转变已经全部发生。

自主探索中科学进展的性质与条件

机会矩阵测量获得研究机会的后果。两个体系分别在五个固定世界、每组每世界三次新会话中，比较十二批研究与不开展源实验；两组共享 Opaque 信息与评价。该对照估计选择实验、接收反馈和记录判断这一完整机会包的作用。它补充过程记录，但不把差异归因于单一推理活动。

新结晶比较确立了明显的研究收益（图 5a、b）。三十场均有有效预测。相较无研究，世界等权 MAE 在纯度上从 0.13853 降至 0.01661，在粒径指数上从 0.23619 降至 0.07641；回收误差从 0.13532 降至 0.11579，细粉误差从 0.37683 降至 0.30110。纯度的名义 80% 区间覆盖从 0.46667 升至 0.98333，宽度从 0.44744 缩至 0.09743。更窄的区间覆盖了更多参照结果，但高于名义水平的覆盖本身不能证明校准。真实实验经历大幅改善了后续判断。

同一队列也区分了更好的点预测与更好的不确定性估计。细粉区间宽度从 0.68500 缩至 0.38450，覆盖却从 0.42778 降至 0.35556。兼顾宽度与漏覆盖惩罚的区间评分，世界等权均值从 1.4794 恶化至 1.8047，全部五个世界均恶化。研究降低了细粉的平均点预测误差，但形成的区间表现出超出其实际表现所支持的确定性。收益与局限属于同一比较中的同一响应。

新增的同队列诊断把这些收益与证据利用并列考察。十五场 Research 会话中，保留的源观测均值参考在纯度、粒径上的误差为 0.00450、0.01786，均低于智能体的 0.01661、0.07641，且两项均见于全部十五场。回收的方向相反：智能体 0.11579 优于参考 0.18828，十五场中十四场更好。参考只使用本场公开源观测，并在相同目标上评分，拟合时不接收目标真值。它诊断已有信息的利用，不是无研究对照。因此，同一批新研究既确立了实验的明显收益，也显示进一步利用证据的空间。较早修正版结晶的诊断则继续作为独立支持结果保留（扩展数据图 3）。

保留的平衡机会比较揭示区域边界（图 5c、d）。十四份有效 Research 预测与十五份 NoResearch 预测之间，整体归一化宏平均误差从 0.132086 降至 0.035632，五个世界均改善；事前指定的三道极稀问题误差却从




图 4 | 物理信息与解释的发展。a，配对世界回放表明，三十场均至少一次在两个通道达到三倍测定标准差的区分；360 次测定中有 158 次符合。b，一条真实轨迹连接研究前的条件预期、前六次测定、加密与重复计划、实际执行和最终有范围的关系。c，另一条轨迹事先提出并执行 0.75 至 0.375 M 稀释，pH 变化与并不相同的 0.4 M 比较条件界定其认识范围。图中不由示意图推断平滑响应曲线。选例不估计机制识别率。ImageGen 预览，文字为分析概括，几何示意。

0.061467 升至 0.103677，四个世界恶化，其他九道则从 0.155625 降至 0.012950。允许缺失的 Research 预测取合法范围内任意误差，也不会逆转两个总体方向（方法）。局部证据可以改善多数预测，同时使另一条件区域中的应用更不可靠。保留的平台关系历史展示了这样一种应用，但不构成总体逆转的唯一原因（扩展数据图 5）。

信息比较进一步说明进展的条件。Aligned、Opaque 和 MisIndexed 下，分配比例误差分别为 0.04654、0.05621 和 0.07700，Aligned 优于 MisIndexed 的方向见于全部五世界；纯化纯度误差则相近，约 0.152—0.154，MisIndexed 的回收误差最低。结合反应对照，这表明一份信息可以帮助某项判断，而不改善全部响应。历史先验与预算比较在独立队列中提供进一步边界（扩展数据图 1；补充材料）。

定量与过程证据回答互补问题。机会比较确立研究可用时改变了什么；连续经历显示预期如何成为检验、结果如何进入选择，以及有用关系如何获得适用范围。目标与信息比较则说明这些后果依赖研究如何开始。在这些系统中，科学进展包含有效流程、可靠局部关系、成功迁移与恰当不确定性，它们可以在同一次研究中以不同方式发展。




图 5 | 研究对不同响应和条件下的判断产生不同后果。a，结晶有无研究的点误差，每组十五份有效预测。b，纯度覆盖改善而细粉区间评分恶化；覆盖对应名义 80% 预测区间，不是均值置信区间。c、d，保留平衡比较中整体预测改善、极稀预测恶化，Research 十四份有效、NoResearch 十五份。世界配对概括独立实验块；先在世界内平均会话，再对五世界等权。精确世界数值见补充材料。ImageGen 预览，几何示意，缺失明确保留。

讨论

自主研究通过塑造认识赖以形成的证据，参与塑造科学理解。纯化轨迹使这一联系具体可见。一位研究者将纯度预期的实现与继续方案的标准区分，并据此改变下一实验；另一位根据解释采取行动，耗尽库存，从而失去后来检验温度的机会。二者体现判断进入研究组织后的不同后果。证据获取依赖持续发展的研究，包括其目标、解释、资源和操作语义。

反应与电化学检验展示这种组织如何产生科学进展。差异观察引出前瞻比较；结果支持操作关系，或使看似绝对的关系变成有条件的优势。反绎仍为理解解释性可能的提出提供有用视角，与预测、比较和修订共同参与研究。本文的实证贡献在于追踪这些活动实际建立了什么，以及所得认识如何被继续采用。局部关系可以指导研究，同时保留尚未解决的解释候选与应用条件。

结晶对照将获取证据的收益与有效使用证据区分开来。研究大幅改善纯度和粒径预测，同一批经历中的源观测参考又揭示尚未充分利用的信息；细粉点预测改善与区间评分恶化并存。这些发现区分了获取证据的价值、证据应用的质量，以及对未解决条件的不确定性[12,22,23]。不能只凭最终流程成功或平均预测改善来推定科学理解。

这一分析也明确各设计能够解释什么。对照估计完整的目标、信息或研究机会条件，选定轨迹并不识别这些效应的唯一中介；匹配世界回放量化固定动作下的信息，而非另一种反馈如何改变下一行动。独立的固定配方淬灭比较测量物理后果，不含研究者适应（扩展数据图 4）。明确各类证据的贡献，使论文能够解释认识的实质性发展，而无需为每个案例指定同一因果机制。

证据限于可编程世界，重复矩阵还限于一种模型配置。新会话不是受控模型随机种子的重复，也不是化学规律的独立抽样。公开笔记定位的是已表达的判断而非内部认知，中间表述缺失限制时间推断。全部新公开经历均已阅读，但核心轨迹的选择与解释是事后的，缺乏独立人类第二评分者验证。接口歧义作为研究环境的一部分保留，不全部归因于科学推理。这些边界界定了当前比较和记录能够支持的结论。

ChemWorld 为研究自主探索如何形成自身的证据基础提供实验条件。研究者不仅积累观察，也改变比较什么、哪些关系被视为获得支持，以及接下来如何研究。理解这一发展过程，将实验自主性的承诺连接到可直接研究的科学问题：探索如何产生可靠认识，而这些认识又如何使进一步探索成为可能。

资助

本研究获得深圳市科技计划项目（AI2026004）、清华大学自主科研计划，以及青年教师科研创新能力支持项目（ZYGXQNJSKYCXNLZCXM-E7）资助。

参考文献

1. A. Einstein. Zur elektrodynamik bewegter körper. *Annalen der Physik* **322** 891–921 (1905). https://doi.org/10.1002/andp.19053221004.
2. I. Douven. Peirce on abduction. *The stanford encyclopedia of philosophy: abduction* (2025). https://plato.stanford.edu/entries/abduction/peirce.html.
3. G. Tom et al. Self-Driving Laboratories for Chemistry and Materials Science. *Chemical Reviews* **124** 9633–9732 (2024). https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.4c00055.
4. D. A. Boiko, R. MacKnight, B. Kline, and G. Gomes. Autonomous chemical research with large language models. *Nature* **624** 570–578 (2023). https://doi.org/10.1038/s41586-023-06792-0.
5. R. D. King et al. The Automation of Science. *Science* **324** 85–89 (2009). https://doi.org/10.1126/science.1165620.
6. B. Burger et al. A mobile robotic chemist. *Nature* **583** 237–241 (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2442-2.
7. B. P. MacLeod et al. Self-driving laboratory for accelerated discovery of thin-film materials. *Science Advances* **6** eaaz8867 (2020). https://doi.org/10.1126/sciadv.aaz8867.
8. N. J. Szymanski et al. An autonomous laboratory for the accelerated synthesis of inorganic materials. *Nature* **624** 86–91 (2023). https://doi.org/10.1038/s41586-023-06734-w.
9. A. M. Bran et al. Augmenting large language models with chemistry tools. *Nature Machine Intelligence* **6** 525–535 (2024). https://doi.org/10.1038/s42256-024-00832-8.
10. T. Dai et al. Autonomous mobile robots for exploratory synthetic chemistry. *Nature* **635** 890–897 (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-024-08173-7.
11. A. N. Elmachtoub and P. Grigas. Smart Predict, then Optimize. *Management Science* **68** 9–26 (2022). https://doi.org/10.1287/mnsc.2020.3922.
12. G. Shmueli. To Explain or to Predict? *Statistical Science* **25** 289–310 (2010). https://doi.org/10.1214/10-sts330.
13. J. R. Platt. Strong Inference. *Science* **146** 347–353 (1964). https://doi.org/10.1126/science.146.3642.347.
14. D. V. Lindley. On a Measure of the Information Provided by an Experiment. *The Annals of Mathematical Statistics* **27** 986–1005 (1956). https://doi.org/10.1214/aoms/1177728069.
15. K. Chaloner and I. Verdinelli. Bayesian Experimental Design: A Review. *Statistical Science* **10** 273–304 (1995). https://doi.org/10.1214/ss/1177009939.
16. A. Mirza et al. A framework for evaluating the chemical knowledge and reasoning abilities of large language models against the expertise of chemists. *Nature Chemistry* **17** 1027–1034 (2025). https://doi.org/10.1038/s41557-025-01815-x.
17. B. P. Majumder et al. DiscoveryBench: Towards Data-Driven Discovery with Large Language Models. *International Conference on Learning Representations* **2025** 4556–4579 (2025). https://proceedings.iclr.cc/paper_files/paper/2025/file/0d70af566e69f1dfb687791ecf955e28-Paper-Conference.pdf.
18. R. Wang, P. Jansen, M.-A. Côté, and P. Ammanabrolu. ScienceWorld: Is your Agent Smarter than a 5th Grader? *Proceedings of the 2022 conference on empirical methods in natural language processing* 11279–11298 (2022). https://doi.org/10.18653/v1/2022.emnlp-main.775.
19. P. Jansen et al. DiscoveryWorld: A virtual environment for developing and evaluating automated scientific discovery agents. *Advances in neural information processing systems* **37** (2024). https://doi.org/10.52202/079017-0324.
20. K. Gandhi et al. BoxingGym: Benchmarking progress in automated experimental design and model discovery. (2025). https://arxiv.org/abs/2501.01540.
21. Y. Chen, P. Piękos, M. Ostaszewski, F. Laakom, and J. Schmidhuber. PhysGym: Benchmarking LLMs in Interactive Physics Discovery with Controlled Priors. *Advances in Neural Information Processing Systems* **38** (2025). https://doi.org/10.52202/085713-1556.
22. T. Gneiting and A. E. Raftery. Strictly Proper Scoring Rules, Prediction, and Estimation. *Journal of the American Statistical Association* **102** 359–378 (2007). https://doi.org/10.1198/016214506000001437.
23. Y. Ovadia et al. Can you trust your model's uncertainty? Evaluating predictive uncertainty under dataset shift. *Advances in Neural Information Processing Systems* **32** (2019). https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2019/file/8558cb408c1d76621371888657d2eb1d-Paper.pdf.

方法

世界、接口与实验单位

ChemWorld 将兼容的过程组件编译为具有持续状态的虚拟化学环境。公开契约指定材料、合法操作、仪器、资源和任务目标，私有参数决定具体世界的响应。智能体能够访问实验室和公开记录，不能访问评估者状态、模拟器代码、私有参数或封存参考结果。操作改变样品，测量可能消耗材料。候选转变在提交之前接受校验；被拒绝的操作不构成所请求的物理干预，但尝试可能消耗契约规定的资源。精确重放核对环境状态转变，不重新生成模型决策。

广度研究覆盖电化学、分配、反应与热处理、水溶液平衡、反应耦合结晶和纯化。这些是受控虚拟系统，不是对具名现实物质经过实验验证的预测。整合重复设计通过互补矩阵覆盖六个体系。五个固定世界在不同条件与重复中复用，世界参数、初始状态和键控观测映射保持固定。重复单位是新模型会话，不是独立世界抽样或受控模型 seed 重复。接口没有可用的模型采样 seed；相同干预可以得到相同键控观测，因此也不是独立噪声实现。

整合矩阵与新增会话覆盖

四矩阵覆盖设计包含 450 场计划研究，由新增 300 场与保留 150 场组成。目标—信息矩阵在电化学和反应处理中各采用五世界 × 三信息 × 两任务 × 三会话，每体系 90 场。过程矩阵新增发现任务下分配 45 场、优化任务下纯化 45 场，各为五世界 × 三信息 × 三会话，加上保留的平衡 45 场与修正版结晶 45 场。机会矩阵包括新结晶 30 场和保留平衡 30 场，均为五世界 × 研究/无研究 × 三会话，全部 Opaque。保留的 30 场匹配世界研究构成第四矩阵。保留 150 场、历史广度 300 场与新增 300 场明确区分；共同覆盖结构不意味着协议和时期相同。

新参与者使用 gpt-5.6-sol，要求 medium 推理强度。源研究允许十二批，十五位无研究参与者没有源实验。科学说明、十二题预测与反思依次封存，没有参考真值反馈。300 场取得 288 条完整链、298 份有效预测、3,379/3,420 次源终检和 898/900 个有效封存阶段。电化学 90/90 全链、1,080 次终检；反应 88/90 全链、1,080 次终检、88 份有效预测；分配 45/45 全链、540 次终检；纯化 35/45 全链、499/540 次终检，但 45 份预测均保留；结晶 30/30 全链、30 份预测、180 次研究终检。285 份源回放和 240 份推荐回放凭据已验证。

十场纯化保留材料耗尽造成的缺口，不替换经历。一场反应在工具预算耗尽后缺少预测，另一场预测因区间不符合评估要求而无效；相关操作及后来可用说明全部保留。按预先确定的技术补跑规则，四场明确服务中断在主队列完成后补跑；中断尝试全部保留，不增加科学单位。此前运行时开发尝试与本块分开。不因科学分数替换已完成结果；稿件编译不开展模型或模拟器实验。

新矩阵测量与汇总

各响应保留原生评估定义。电化学和纯化参照为单个固定键终末观测；分配为采样前无噪声相分数；反应点误差参照五观测均值，覆盖使用十二题共六十个参考观测；结晶为终检采样前无噪声响应及初始投料回收。分配使用名义 90% 区间，其他体系为 80%。两个分配相分数互补，并非独立证据。不形成跨响应、跨体系科学能力总分。

先计算每场响应误差和区间诊断，再在每个固定世界内平均可用会话，最后对五世界等权。电化学任务比较还在每世界内平均三种信息条件，每任务 45 份预测全部可用。反应优化的 Opaque—Aligned 比较每组 15 份有效预测；另两个存在缺失的反应条件各为 14/15，并明确标记。纯化保留源预算不完整会话的可用预测。计划响应缺失时，不给完整网格估计；可用案例均值不将缺失填为零。重复会话、问题和响应共享世界，不作为独立抽样来估计置信区间或显著性。固定格的三次重复描述波动，不建立总体可靠率。

操作比较使用封存推荐的独立复测，与新查询干预下的预测分开。分数和产率保留公开定义，分别汇总。区间宽度、经验覆盖和保留评估器提供的适当区间评分与点误差共同报告；新结晶机会比较采用 alpha=0.2 及对应合法响应尺度。研究与无研究共享科学背景和封存评估，研究额外提供实验预算、经历与记录机会。差异估计整个组合，而非某个推理操作。

新研究经历的完整精读

新增 300 场均精读，包括十五份无研究说明、873 版笔记和 31,922 条公开操作。899 份非空封存内容中，一份含无效预测，因此仅 898 个有效阶段；另有一份预测缺失。电化学 268 版笔记、7,647 条操作；反应 293 版、7,917 条；分配与纯化 262 版、13,253 条；结晶 50 版、3,105 条。逐场阅读核对 1,363 处公开原句。缺失笔记、失败检验、被拒请求、终点修订及后期反思均保留；阅读覆盖不是解释成功率分母。

每项焦点判断区分实际提出的现象、候选解释或经验预期、首次表述、前瞻后果、真正提交的干预、测量、修订地位与后续用途。条件计划不算已执行检验，后来预测不倒填入此前笔记。终末解释可以支持后来预测的用途判断，不能单独证明此前源行动受其引导。依据源阶段公开契约与冻结执行语义，区分请求被拒、状态回滚和任务质量失败。反应风险超阈值不意味着回滚，直接加热与控制器配置具有不同温度上限。淬灭推进时钟、改变状态但不积分额外反应，淬灭前等待则可能继续反应。结晶晶种专题比较请求量和提交量，不将重复被拒请求当作剂量。

全部经历均作语义阅读，示例判断则按解释意义事后选取。同一会话可以有证据支持与结果不同的多项判断。我们在完整轨迹中追踪具体判断，并在比较中保留会话与世界层级；不推断内部认知，也不以单一成败标签概括整

场研究。解释与来源核查由助手分析流程承担，没有独立人类编码、盲法或第二评分者一致性估计。下文旧行动关联窗口及解释历史保留原定义和分母。

同队列源观测参考与执行状态解释

我们进一步汇总十五场新结晶 Research 结果中已经保留的源观测参考。这是既有输出的事后分析，不执行模型或模拟器实验。常数参考使用本场合格公开终检测量的均值；原有最近邻参考按原公开配方特征空间选择最接近问题的源配方。目标真值只用于评分。资格要求四个评价响应均为数值：180 次源测定中 179 次合格；第一世界第三重复的一次测定缺少完整响应向量，该场参考由十一项源测定拟合。十五场及每响应 180 道问题全部保留。误差使用与智能体相同的无噪声测定前参照，先在世界内平均会话，再对世界等权。这些只给点预测的参考诊断已有观察的利用，区别于 NoResearch 组。逐场误差、拟合数和源均值保留于证据包。

在支持性的加热经历重建案例中，可见返回外层包含 `ok: true` 和 `experiment_completed: true`，同时还包含 `transaction_status: rolled_back`、明确回滚错误，以及零温度和时间变化。因此，两次请求的 600 s 操作不能构成 1,200 s 化学暴露。冲突的公开标识与后来说明及预测一并保留；这一案例没有将智能体推理与接口歧义的作用分开。另一场则明确将回滚加热排除于化学解释。控制器与直接加热上限按各自公开合同核对。这些执行检查定位证据差异，不把每种不一致都解释为化学误解。

历史与保留证据层

历史广度研究包含 240 场 Sol-medium 研究，以及 Luna、Terra、GPT-5.5 和 Astra 的 60 场额外平衡研究，均请求 medium 推理强度。五模型平衡比较中的十五场 Sol 已包含在 240 场内。请求的模型标签不代表实际计算量相等。原 240 场包含电化学 60、分配 30、反应 60、平衡 45、结晶 30 和纯化 15 场；按其原规则保留 3,597/3,600 次最终测量、全部 720 个后测阶段与 238 场协议符合研究。额外六十场保留 720 批和 240 个阶段。两场原始源研究完成度失败仍予保留。更早的选定笔记案例另有 24 场，不与广度或保留平衡—结晶过程队列合并。

保留平衡—结晶过程队列由早期 48 场及其 42 场扩展中的 45 场平衡研究，以及统一回收描述后完整重跑的 45 场结晶研究组成。每个体系覆盖五世界、Opaque/Aligned/MisIndexed 三信息条件、每格三场，每场十二批。平衡保留 39 条完整链、41 份有效预测；修正版结晶分别为 41 和 42。该保留队列合计分母为 90 场、80 条完整链、83 份有效预测。旧结晶作为受协议影响的历史证据保留，不加入修正版计算当前结果或过程频率。

修正版结晶完成 510/540 个源批次、125/135 个后测阶段，保留 145 版笔记和 42 次推荐复测。全部 45 条源轨迹与 42 条复测轨迹通过重放。四条不完整链中，三条缺失预测，另一条有有效预测但缺失随后的反思。平衡子集与独立的研究机会块各自保留失败表。缺失不填零，已完成结果不由后来更有利的结果替代。稿件整合不改变任何实验块原有的开发或资格证据地位。

信息、自主性与记录

历史目标比较在世界、信息条件、批次预算和先验位置内，匹配独立开展的发现与优化研究。电化学的十二与二十四批条件合计三十对；反应处理的参数和结构先验块均采用十二批，合计三十对。操作结果来自封存推荐的独立复测。联合结果计数采用公开评分的预测 MAE，反应先验比较则采用六项归一化响应误差的平均值，两者不互换。预算比较同样涉及具有完整资源范围的独立会话，不估计继续同一项研究的作用。

历史五模型平衡比较包含五世界、三信息条件，每格一场十二批研究，共七十五场，其中十五场 Sol 已计入广度研究。1 mM 阈值描述实际测量的最低正投料名义浓度，不是发现判据。浓度按名义配方投料计算，三道极稀评估题在模型配置间相同。各条件的预测误差、原始预测区间与已获证据均保留。选定的 Astra 和电化学轨迹属于事后过程示例，其科学解释在实验后写成，不是同期笔记记录，也不是额外重复。完整历史设计、响应表和案例数值保留在补充材料。

Opaque 提供公开任务和操作背景，不提供额外实例资料。Aligned 提供与体系相符的部分信息；平衡包括有效酸度区间和带锚点的局部稀释关系。MisIndexed 使用另一世界的历史关系，格式与限定相同。结晶 Aligned 提供匿名材料名义描述，MisIndexed 交换 S1/S3 溶剂描述，保留 S0、S2 和催化剂描述。两者均不是完整世界规律。

原平衡 Opaque/Aligned 早于 MisIndexed 扩展；修正版结晶是更晚的完整实验块。这些描述性比较并非全部同期随机处理，新旧结晶也不能估计修正提示的因果作用。下文单列的新研究机会比较采用共同的同期协议。

智能体在固定预算内选择操作、用量、测量、重复与操作分组。平衡允许十二批、180 次操作尝试、十二次中间仪器与十二次最终测量；结晶采用固定十二批材料预算和 720 次尝试上限。记录角色要求在适用时先写出可检验预期，后续由智能体自主更新，不要求每批书写，也不自动重新注入笔记。记录角色可能影响研究，不被视为被动观察。笔记保存版本与公开事件游标，不揭示内部认知。没有调用笔记读取工具，不代表无法访问会话中此前出现的内容。

后测与回收定义

源研究及操作推荐结束后，智能体依次封存科学解释、在无实验工具条件下回答十二个固定新干预问题，再在没有真值反馈的情况下反思。平衡另有结构化补充评估。证据中的 K1/Q/K2/EQS 分别表示这些阶段。源研究期间不展示预测问题；后测提出的方案不计为已执行源实验。

平衡点误差以每题五个参考观测的均值为比较对象，覆盖率检查全部五次观测。结晶使用最终测量采样之前的无噪声完整流程响应，源观测则带噪声。修正版保留六十个参考批次，数值与旧参考一致，并对每份可用的已提交推荐单独复测。

修正后的回收定义为：扣除晶种贡献的固相目标产物摩尔量，除以所跟踪的初始试剂投料摩尔量，截断到 [0,1]。源指令、预测提示、观测与评分现在指向同一完整流程量。内部结晶阶段指标则以分离前的目标产物为分母。旧过程指令描述后者，而观测与评分使用初始投料；原分数作为受协议影响的诊断值保留，不进入修正版队列。修正版完整重跑，没有事后为旧分数更名。

质量要求有颗粒、纯度至少 0.80、细粉至多 0.50；联合推荐成功还要求修正定义的回收率至少 0.10。按可用复测，修正版联合成功为 Opaque 13/15、Aligned 10/14、MisIndexed 10/13，每臂仍各计划十五场。粒度采用公开指数 min(d50/250 微米, 1)，其误差不能写成微米。

研究路径与过程解释

我们追踪公开提出的关系与预期、实际实验、获得的观察、修订和后续用途。科学说明或准确预测本身不能建立这一序列。解释基于具体历史，不构成一般推理能力量表。新实验块的五条具名核心历史为纯化研究 A、B，反应研究 A 和电化学研究 A、B；补充材料将稳定标签对应到信息条件、完整公开记录、笔记版本、操作位置及批次序列。匹配世界研究 A、B 保留独立实验块中的身份与锚点。选例在完整阅读之后进行，仍是事后选择。早期 92 个行动关联窗口描述保留平衡—结晶队列的记录覆盖，平衡机会案例不属于该窗口队列。

事后解释历史案例组固定为主例平衡机会会话，以及前稿已展示的四个修正版结晶案例：低投料、插值与两个对照的播种记述。我们沿五场研究追踪七项相关判断，保留全部笔记版本和终点修订。字段区分所解释现象、智能体实际提出的候选或预期、首次出现、条件性预测、执行操作、观测、后续地位与用途。没有给出的条件性表述保留为缺失，不由分析者补写。平衡的负载预期、组分假说和背景解释是同一探索的相连线索，不是三项独立发现。案例不是用于估计频率的抽样，不从窗口数量推断解释层面的发生率或可靠率。

操作语义核查使用保留的执行版本与轨迹机制身份，不以当前运行时假设替代。该世界只有一种非催化进料，试剂操作和组分 0 都选择它，并更新平衡响应计算读取的同一初始投料记录。因此，在同等投料下切换命令不改变物种身份。扩展数据图 5 的最终名义浓度为实际提交的摩尔数除以加入的总溶剂体积，分步稀释批次按最终 0.8 mol/L 展示。此核查不调用新模拟器实验。较低投料和正交测量仍是保留历史中未执行的提议；经验平台的支持范围与智能体提出的机制分别考察。

事后路径提取覆盖历史电化学六十场、平衡四十五场和修正版结晶四十五场。五十个世界内条件比较保留目标、预算、信息与队列。计数采用实际提交操作，溶剂覆盖包括再悬浮添加；拒绝请求不构成成功材料使用，中断会话保留在计划分母中。

结构提取检查保留九十场、268 版笔记构成的全部 178 对相邻版本。入选需要早期笔记、下一版之前至少一次新的已提交最终测定，以及后版之后的已提交研究操作；仅测量或终止不构成继续研究。178 对均有新增测定，其中 92 对满足继续研究：平衡 34 个窗口分布于 30 场，结晶 58 个分布于 35 场。另 86 对（平衡 44、结晶 42）之后没有继续执行已提交研究操作，完整记录仍保留在证据包。没有完整窗口的二十五场不被归类为没有学习。

入选先依据事件时序计算，不以某个计划是否最终成功执行为条件。但该规则确实要求后续继续开展已提交研究，因此终点修订不进入这一行动关联分母。92 个入选窗口全部编码；标签针对每个窗口选定的即时计划，不穷尽笔记里的所有提议：83 个匹配、7 个部分匹配、2 个无明确下一计划，其中修正版结晶为 52 个匹配、6 个部分匹配。即使某个所选行动匹配，完整笔记仍保留未落实、被拒及改变的其他提议。全部 182 条更新/计划引文及测定/操作游标经源记录核对；证据包包含全部相邻版本、所选编码、全文笔记和执行历史。

编码和内部科学复查由同一分析者完成，没有独立第二评分者一致性估计、盲法或经独立裁决的机制发生率。团队已将复查交给本流程，完成的内部复查与独立重复明确区分。反例包括合理撤回、正确识别未执行检验，以及准确但明确标为推测的外推。说明案例为事后选择。

匹配化学世界与解释历史

保留的匹配世界前瞻实验包含五组参数配对、两种化学网络、每世界三次 Sol-medium 新会话，共三十场。网络 A 将弱酸解离与自由离子直接沉淀耦合，B 额外包含中性水相离子对。每对的酸解离、溶度积、阳离子、活度和初态参数，以及公开操作契约相同。自主研究前提供两次实际起始测定，分别为 6×10^{-7} mol 配 0.080 或 0.075 L；配对的无噪声响应在每个通道相差不超过一个声明的终检标准差。任务提供化学背景与投料、稀释、尺度维度，不公开私有网络身份与参数。初始笔记因而位于给定观测之后，并非无证据前测。

执行候选的资格检查覆盖 230 个物理状态与测定、三十次精确重放及 120 项运行时均值核对。五次有界干扰参数重拟合中，受测直接网络族不能充分拟合网络 B；这不证明相对于所有替代解释均可识别。更早失败的物理候选单独保留。这些检查描述世界实际具有的信息结构，不描述智能体的学习。

每场十二个自主批次后，依次封存科学解释、十二道预测及不反馈真值的反思。源研究期间不展示题目，但智能体可能主动访问对应物理条件。三十场全部完成，合计 360 次源终检、九十个封存阶段及 1,080 条逐题逐响应预测。八十版笔记来自二十场各三版、十场各两版，不能假设每场都有连续中期修订。同一世界的三次新会话共享固定观测随机键，模型采样 seed 不可控。

实际源动作序列在自身及配对世界原样重放，三十次源回放与六十条自身/配对轨迹均通过。区分量为无噪声均值的绝对差除以终检标准差：归一化 pH 为 0.002，两项比例各 0.006。360 次终检中，326 次在至少一个通道达到三倍标准差，158 次在至少两个通道达到该值；三十场均包含后一类测定。阈值表示物理信息，不表示统计显著性或研究者识别了机制。反事实回放固定动作，不估计智能体面对另一种观测后会如何适应。

预测误差以每题五个保留参考观测的均值计算，区间覆盖检查全部五个观测；同世界会话共享这些参考。先在世界内平均会话，再对十世界等权。名义 80% 预测区间不是均值的置信区间，较高经验覆盖率必须与宽度一起理解，不能单独证明校准良好。该块没有无研究组，化学规律也不同于研究机会比较。

结合实际动作，精读全部八十版笔记与九十个封存阶段；六十七条选定焦点历史保留 365 条经核对引文。另对 105 场既有研究的 309 版笔记进行回溯阅读，追踪 112 条选定历史和 218 个笔记锚点，四个选定封存后续增加十三个锚点。105 场由保留九十场与十五场研究机会会话组成，不是新增实验。历史可在同一会话内相互交叠，并包含终点修订；它们是按解释相关性选择的描述单位，不是独立发现或总体发生频率。初始预期、候选解释、经验关系、实际检验和后续使用分别记录，分析者不补入原文没有的因果或条件表述。

源操作共 1,901 次尝试：1,893 次提交、六次回滚、两次验证拒绝；另外 131 次恢复的工具故障单独计数。第一轮启动包含四场启动失败、二十六场未启动，没有科学操作；修复线程配置后，整块三十场重新执行。旧失败与资源记录完整保留，不因科学结果优劣替换已完成结果。

仅使用源观测的预测参照

对每份有效修正版结晶预测，只利用该研究者成功的源最终测量构建两个透明参照。第一个平均全部可用测量；第二个只平均与查询具有相同已提交溶剂标识集合的测量，无匹配时回退到整体均值。溶剂集合包括成功加溶剂与再悬浮操作，排除拒绝请求。拟合函数不接收测试真值。这些是描述性计算，不是另行训练的智能体或完整机理基线。

有效会话 42 场，共 504 题。同溶剂回退发生在 186/504 题，其中 Opaque 1/180、Aligned 95/168、MisIndexed 90/156。该匹配不控制热史、用量或最终液相组成，参照没有预测区间。回收、纯度、粒度和细粉均按各自公开尺度报告，不合成一个跨响应分数。

修正版分布分析使用同一组 42 场有效会话及其 504 次源最终测定。各响应公开源观测、逐题参考均值、预测、有符号误差和会话汇总。描述性合并均值与分位数保留重复的目标题目，不是独立条件估计。有符号误差为预测减参考值；世界等权均值先平均每会话十二题，再平均世界内会话，最后平均五世界。三场缺失预测仍保留在 45 的计划分母。计算仅使用修正版队列，不沿用历史结晶的纯度水平或偏差方向。

保留的平衡研究机会比较

固定设计为五个平衡世界、Research/NoResearch 两条件、每格三场 Sol-medium 新会话，共三十场，全部采用 Opaque 信息。共同公开背景包含任务及测量定义、材料目录、合法操作/仪器和初态，实例档案先验为空。Opaque 表示没有额外实例规律，不表示缺少公开化学背景或模型预训练知识。完整初始公开输入随稿提供；十五个世界内同重复配对在仅排除非科学会话标识后，确认科学输入一致。Research 额外得到十二批自主实验和既有笔记机会，NoResearch 没有源操作或观测；两组评估提示、模式、顺序与限制一致。

三十场全部终态，研究组完成 180/180 批，两组合计完成 117/120 个后测阶段、29 份有效预测。第三世界第三次 Research 在科学解释后出现预测流断连，Q 与随后两阶段缺失，没有替换。因此 Research 有十四份有效预测、NoResearch 十五份，Research 的第三世界为两次，其余每格三次。十五条源轨迹及二十五条参考轨迹（300 批）精确重放通过。29/30 场资源账本完整，另一场仅有已记录的部分用量；记录到的输入加输出共 13,428,656 tokens。缺失用量不按零处理，金额不可得。

首次执行尝试因评估传输配置缺少必要字段而失败。已启动四场、其中两场已完成的二十四批源研究和资源消耗单独保留，没有完成科学解释阶段。修复执行缺陷后，按原设计从头重跑整个三十场块。这属于协议修复，不是根据科学结果替换。仅完整重启后的实验块进入比较。

该比较估计共同评估条件下整段研究机会的作用，不能单独识别自主选择相对给定数据、反馈本身、笔记或内部表征变化。比较在新会话之间进行，没有会话内前测。世界与条件顺序采用事先固定的平衡启动安排，不是对世界规律进行随机抽样。

定量汇总与缺失

平衡宏平均绝对误差在指定问题中等权平均归一化 pH、解离分数和沉淀信号。极稀组为重复块执行前固定的三题，其余九题不被假定全部处于分布内。先在世界内平均有效会话，再对五世界等权。逐场数值和缺失阶段均保留。响应、问题、参考观测和批次嵌套相关，不能充当独立研究者样本。

名义 80% 区间同时报告覆盖率、平均宽度和适当区间分数 [22]。下界 l、上界 u、观测 y、alpha = 0.2 时，分数为 (u-l)，若 y 低于 l 加上 (2/alpha)(l-y)，若高于 u 加上 (2/alpha)(y-u)，越低越好。汇总按世界等权；智能体区间不是组均值的置信区间。

事后敏感性分析允许唯一缺失的研究机会预测取 [0,1] 内任意宏平均误差，并按每格计划三次和五世界等权重算。有研究减无研究的保守范围，总体为 [-0.098659, -0.031992]，极稀为 [+0.036768, +0.103434]。这是缺失结果影响的界限，不是填补、置信区间或总体推断。固定条件下三次会话描述波动，不建立总体可靠率。

匹配淬灭干预

独立保留的对照将原第一期十八份结晶推荐置于五个世界中，比较有无单个淬灭操作，共九十对、一百八十条轨迹。其他动作参数和初态匹配；淬灭从原位置删除，或插入首次播种/结晶冷却之前。没有智能体适应，也不向智能体反馈结果。


全部轨迹保留并重放，七十五对具有两侧最终测量。五对无淬灭侧缺颗粒，十对有淬灭侧使后续固定冷却请求失效，失败不修复。完整对中，有减无的平均细粉变化为 +0.30937、回收变化为 +0.00741，联合成功从 34 降至 4。这些条件性效果描述实际初始投料回收口径下的物理操作。淬灭改变多个物理状态量，不单独识别冷却速率或科学判断的成因。供体配方来自历史队列，不来自修正版。

数据与代码可用性


随稿证据包包含新增 300 场机器摘要、全部 1,380 个计划会话—响应行、推荐结果、失败、完整整理的公开经历、语义精读与引文锚点，以及五体系覆盖表和四矩阵设计。保留平衡机会数据、旧 90 场过程队列 178 对相邻笔记、修正版结晶分布与 30 场匹配世界经历分别可查。缺失明确保留；公开科学内容纳入，原始提供方封包和凭据不纳入。原回放与资源记录保留在项目证据位置，永久公开存档仍待落实。

五张主图和八张扩展图全部为 ImageGen 预览。数字标注依据保留证据，但点位、曲线和分布形状仅作示意，不是精确观测或统计不确定性。新定量表是新矩阵的数值依据；旧原生图仅对应其历史队列。投稿前须将预览替换为数据绘图。补充材料区分每个实验块，并完整保留 34 张历史数值表。编译读取保留数据，不改变实验及证据地位。


扩展数据




扩展数据图 1 | 局部先验与迁移范围。a，局部平台、极稀参照行为与未经支持的延续示意。b，历史 Sol/Opaque 与 Aligned 在两组条件的误差。c，五模型的定性模式，不是数值效应估计。历史各条件仅一场；极稀分组在该队列中为事后划分，在后续重复块前固定。本图不合并重复队列估计。ImageGen 预览：几何仅作示意，精确数值见保留证据。




扩展数据图 2 | 整合设计与新实验覆盖。a，四矩阵共 450 场计划研究，新增 300 场、另 150 场按独立协议保留。b，新块保留 288 条完整链与 298 份有效预测；完成不等于科学成功。c，完整精读覆盖 873 版笔记和 31,922 条公开操作，核对 1,363 处引文。d，十场纯化因材料耗尽缺少 41 次终检，两场反应预测缺失或无效。四场服务中断经技术补跑解决，不替换科学结果。ImageGen 预览：几何仅作示意。




扩展数据图 3 | 修正版结晶响应分布。a–d，源观测、目标参照与智能体预测的分布示意。e–h，有符号误差分布示意，其几何与分箱计数不是实测值。保留队列含 42 份有效预测，每响应有 504 源测定和 504 题；共享目标不是独立研究者样本。数字标注来自保留汇总；粒径为无量纲指数。三份缺失预测仍计入 45 场计划分母。ImageGen 预览：几何仅作示意，精确数值见保留证据。




扩展数据图 4 | 淬灭操作的匹配物理效应。a，十八个历史配方在五世界形成九十对，七十五对完整，五个无淬灭组无颗粒，十个有淬灭组使后续冷却无效。b，完整配对中有淬灭减无淬灭的平均变化。c，同一 75 对中的联合任务成功。结果采用已实现的初始投料回收口径；智能体未适应或接收这些结果，不据此推断判断形成效应。ImageGen 预览：几何仅作示意，精确数值见保留证据。




扩展数据图 5 | 局部模式与未解决的解释。a–c，平衡研究 A 的源响应模式示意；试剂命令与组分命令在该执行版本中加入同一物种。d，公开历史从初始预期连接终点未决与后续使用；文字为分析概括，不是额外引文。e，保留的极稀解离预测、原始 80% 预测区间与封存均值。数值准确性不建立发现机制。ImageGen 预览：几何仅作示意，精确数值见保留证据。



扩展数据图 6 | 重建实验实际检验了什么。a，一场反应的两次回滚加热在终末说明中成为 1,200 s 阴性结果，后来预测引用诱导期或历史解释。b，另一场将回滚加热排除在化学解释之外。c，一版结晶中途笔记在实际仅提交 0.05 g 时声称已检验 1 g，再提出更高剂量。时点区分后来预测用途与后续源行动受到影响。焦点加热返回同时含外层成功及完成标识、明确回滚错误和零时间及温度变化；这是接口呈现与经历重建的共同证据。不同经历并非随机纠错组。ImageGen 预览：文字为分析概括，几何仅作示意。



扩展数据图 7 | 从证据到预测的不同路径。a，各模型 15 场中到达不高于 1 mM 的数量。b，示意性的局部解离平台。c，Sol/Opaque 极稀 MAE 是五世界汇总，不是每世界单独数值。d，一场 Astra 研究的选定阶段、封存预测及原 80% 预测区间。历史科学说明为事后记录；结果不建立固定模型特征。ImageGen 预览：几何仅作示意，精确数值见保留证据。



扩展数据图 8 | 检验改变工作关系的范围。a，事前淬灭—等待预期为转化约 0.42，实际为 0.427。b，更强混合使分配平台预期被撤回，时长与转速仍混杂。c，第三次结晶热循环取得近阈值结果，第四次未继续改善。d，进一步稀释未保留可回收颗粒，收窄拟议操作窗口。各面板为不同选定研究；数值是单次观测，不是处理均值或置信区间估计。ImageGen 预览：几何仅作示意，精确记录随稿保留。