

# PIPINO

Scientific Name: *Cucumis sativus*



Ang pipino ay isang uri ng pananim na gumagapang at ang bunga nito ay ginagawang atsara. Masarap itong pampagana.

Ibat-ibang uri:

- **Pang-atsara** – Chicago Pickling, Ohio MR 17, Wisconsin SMR 15, Pixie SMR 59
- **Pang-ensalada** – Table green at Satico Hybrid, Ashely, Marketeer, Submarine, Polaris

Makatutubong mabuti ang pipino kung itanim ito pagkatapos ng tag-ulan, mula Nobyembre hanggang Enero. Tumutubo itong mabuti sa malabo at buhaghag na lupa na may 500 sentimetrong taas mula sa kapatagan ng dagat.

## Paraan ng pagtatanim

Maaaring itanim sa isahan o dalawahang hanay, subalit lalong mabuti kung sa dalawahang hanay, pagkat marami ang maitatanim. Itanim ang 3-4 na binhi sa bawat tundos na 30-40 sentimetrong agwat sa hanay. Sa sandaling sumibol ang mga punla, bawasan ang punla at mag-iwan lamang ng 2-3 malulusog na tanim sa bawat tundos. Kung dalawang hanay, dapat 50 sentimetrong pagitan at tatsulok ang ayos ng mga tundos.

Maglagay ng balag kapag nagsimula nang gumapang sa lupa ang pananim upang hindi masira ang mga bunga.

Maglinang samantalang lumalaki ang pananim upang mamatay ang mga damo, maging mabuhaghag ang lupa at kumalat ang mga ugat. Patubigan kung kailangan. Huwag labis-labis ang patubig pagkat makasasama ito.

Sa malawakan at pangkomersyal na pagtatanim, maaaring magsalit-tanim ng mais, okra at iba pa.

Kapag walang compost, gumamit ng abonong komersyal. Sa panahon ng pagtatanim, maglagay ng 6 na sakong ammonium sulfate, o 126 kilo ng purong nitrohen, o kaya'y 3 sako ng urea o 135 kilo ng purong nitrohen sa bawat hektarya. Magbudbod sa gilid ng pananim ng complete fertilizer sa damang 150-200 kilo sa bawat hektarya.

Ang mga mapaminsalang kulisap sa pipino ay ang kuto ng halaman, squash bug o uwang. Ang karaniwang sakit nito ay downy mildew at powdery mildew.