Troubles de l’humeur et suicide

Prof. Sylvie Blairy

Département de psychologie

Unité de recherche en Psychologie et Neurosciences Cognitives

PLAN

- Comprendre et définir les troubles de l’humeur
- Prévalence des troubles de l’humeur
- Les causes des troubles de l’humeur
- Les traitements
- Le suicide

Comprendre et définir les troubles de l'humeur

Deux ensembles symptomatologiques peuvent contribuer séparément ou en combinaison à tous les troubles de l'humeur spécifiques : **les épisodes dépressifs et les épisodes maniaques**

Comprendre et définir les troubles de l'humeur

Episode dépressif caractérisé

1. • **Humeur dépressive présente quasiment toute la journée**
2. • **Diminution marqué de l'intérêt ou du plaisir**
3. • Perte ou gain de poids (en l'absence de régime)
4. • Insomnie ou hypersomnie tous les jours
5. • Agitation ou ralentissement psychomoteur presque tous les jours
6. • Fatigue ou perte d'énergie presque tous les jours
7. • Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou inappropriée
8. • Diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer ou indécision presque tous jours

A connaitre pour l'examen: les critères DSM 5 d'un épisode dépressif caractérisé- Livre p. 215 tableau 7.1

Critère B: Détresse cliniquement significative ou altération du fonctionnement social

Critère C: L'épisode n'est pas imputable aux effets physiologiques d'une substance ou à une autre affection médicale

Aperçu de la dépression

Comprendre et définir les troubles de l'humeur

La dépression est un trouble dont les manifestations symptomatologiques sont extrêmement hétérogènes.

La présence et la combinaison des différents symptômes

Etude de Zimmerman, Ellison, Young, Chelminski et Dalrymphe (2015)

L'intensité et nombre des symptômes

Des différences de genre

Le décours de la maladie et la réponse au traitement

Tableau clinique

Représentation picturale de différentes configurations d'évolution de la dépression (intensité et nombre de symptômes)



Comprendre et définir les troubles de l'humeur

Comprendre et définir les troubles de l'humeur

Critères de définition supplémentaires pour les troubles dépressifs

(1) avec caractéristiques psychotiques (congruentes ou non congruentes à l'humeur.

(2) avec détresse anxieuse (légère à grave)

(3) caractéristiques catatonie

(4) avec caractéristiques mélancoliques

(5) avec caractéristiques atypiques

(6) Avec caractéristiques mixtes

(7) Avec début lors du péripartum

(8) avec caractère saisonnier

Comprendre et définir les troubles de l'humeur

Avec caractéristiques psychotiques

L'occurrence de symptômes psychotiques accompagnant les épisodes dépressifs est assez rare puisqu'ils participent à environ 5 % à 20 % des cas cliniquement identifiés de dépression

Comprendre et définir les troubles de l'humeur

Avec détresse anxieuse

Pour tous les troubles dépressifs (et bipolaires), la présence de l'anxiété indique un état plus grave, suggérant plus probable la présence de pensées suicidaires et de suicides, et prédit un moins bon résultat du traitement

Comprendre et définir les troubles de l'humeur

Avec catatonie

Il s'agit d'un état grave, qui implique une absence totale de mouvement. C'est une forme de **stupeur** ou de **catalepsie** dans laquelle les muscles deviennent raides ou semi-rigides, de telle sorte que les patients maintiennent leur bras ou leurs jambes dans n'importe quelle position.

Comprendre et définir les troubles de l'humeur

Avec caractéristiques mélancoliques

Des symptômes somatiques les plus sévères (perturbations des fonctions corporelles ou symptômes végétatifs) : réveils très matinaux, perte de poids, de libido (pulsion sexuelle),

Des **sentiments de culpabilité excessifs** ou **inappropriés**, et **anhédonisme** (diminution partielle de l'intérêt ou du plaisir à participer à certaines activités du quotidien).

Comprendre et définir les troubles de l'humeur

Avec caractéristiques atypiques

Les individus porteurs de ces caractéristiques souffrent d'une **profonde hypersomnie et d'une suralimentation lorsqu'ils sont en crise**.

La dépression avec caractéristiques atypiques comparée à la dépression typique est associée à un **pourcentage plus élevé de femmes et à un âge de survenue plus précoce**.

Plus de TS et plus de comorbidité (alcool-drogue)

Comprendre et définir les troubles de l'humeur

Avec caractéristiques mixtes

Des épisodes dépressifs dans lesquels sont présents plusieurs (au moins trois) symptômes maniaques.

Comprendre et définir les troubles de l'humeur

Avec un début lors du périnatal

Cette spécification peut s'appliquer à la fois à la dépression caractérisée et à l'épisode maniaque

Entre 13 % à 19 % des femmes qui accouchent (1/8) satisfont aux critères diagnostiques de dépression appelée *dépression périnatale.*

Comprendre et définir les troubles de l'humeur

Avec un début lors du périnatal

Des auteurs ont suivi 11 833 mères et 8431 pères pendant 8 semaines après la naissance de leur enfant.

10 % ont manifesté une augmentation marquée de symptômes dépressifs

4 % des pères ont manifesté une augmentation marquée de symptômes dépressifs.

Comprendre et définir les troubles de l'humeur

Avec un début lors du périnatal

« baby blues » : 1 à 5 jours après l'accouchement.

Pour 50 à 80 % des femmes s'agit d'une réaction normale au stress lié à la naissance d'un enfant

Comprendre et définir les troubles de l'humeur

Avec caractéristiques saisonnières

S'applique aussi au trouble bipolaire.

Pas moins de 15 % à 25 % de la population pourraient avoir une certaine vulnérabilité saisonnière de l'humeur sans entièrement satisfaire aux critères d'un trouble thymique (Kessler & Wang, 2009 ; Sohn & Lam, 2005).

Trouble affectif saisonnier ou trouble thymique à caractère saisonnier

Comprendre et définir les troubles de l'humeur

Avec caractéristiques saisonnières

La prévalence des troubles affectifs saisonniers est plus élevée dans les latitudes septentrionales, où l'on trouve moins de soleil, que dans les latitudes méridionales.

Aux USA, des études ont indiqué une prévalence inférieure à 2 % de troubles affectifs saisonniers en Floride contre près de 10 % dans le New Hampshire (Terman, 1988).

Comprendre et définir les troubles de l'humeur

Avec caractéristiques saisonnières

Le trouble serait lié à des variations de la production de mélatonine (hormone secrétée par l'hypophyse).

La faible intensité lumineuse est associée à plus de morosité

Des facteurs cognitifs et comportementaux sont associés ce trouble: intensité et sévérité des préoccupations et des ruminations prédisent la sévérité des symptômes dépressifs durant l'hiver.

Comprendre et définir les troubles de l'humeur

Survenue et durée des troubles dépressifs

L'âge moyen de survenue du trouble dépressif caractérisé est de 30 ans

La durée moyenne du premier épisode est de 2 à 9 mois si non traité

La survenue précoce du trouble.

Comprendre et définir les troubles de l'humeur

Du deuil à la dépression

La douleur intense que la plupart d'entre nous ressentent évolue vers ce qu'on appelle un **deuil intégré** dans lequel la finalité de la mort et ses conséquences sont reconnues et l'individu s'adapte à la perte.

Les souvenirs, surtout positifs de la personne décédée sont incorporés dans la mémoire sans plus dominer et interférer avec le fonctionnement de la personne endeuillée

Les caractéristiques du deuil normal, intégré, et du deuil complexe persistant sont reprises dans le tableau 7.2

Comprendre et définir les troubles de l'humeur

Du deuil à la dépression

Le deuil peut devenir une pathologie psychologique à part entière pour 7 % des personnes endeuillées

- les pensées suicidaires augmentent sensiblement et deviennent principalement axées autour du désir de rejoindre la personne décédée
- La capacité de se projeter dans le futur est généralement altérée, car il est difficile d'imaginer un avenir sans la personne décédée
- Les personnes endeuillées ont également des difficultés à réguler leurs propres émotions qui ont tendance à devenir rigides et inflexibles

Comprendre et définir les troubles de l'humeur

Les autres troubles dépressifs

Le trouble dysphorique prémenstruel (TDPM)

Un petit groupe de femmes, de 2 % à 5 %, qui souffraient de réactions émotionnelles graves et parfois invalidantes pendant la phase lutéale active.

Ce groupe de femmes diffère sensiblement des 20 % à 40 % de femmes qui éprouvent des symptômes prémenstruels inconfortables (SMP) sans que néanmoins ceux-ci **n'interfèrent avec leur fonctionnement**

A connaitre pour l'examen: livre p 226 tableau 7.5.
Quels sont les critères DSM 5 du trouble dysphorique prémenstruel?

Comprendre et définir les troubles de l'humeur

Les autres troubles dépressifs

Le trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle

Apparition du trouble entre 6 ans et 18 ans

Caractérisé par des crises de colère sévères et récurrentes. Agressivité verbale et physique. Affect négatif chronique.

Ces enfants ne montrent aucun signe de périodes d'humeur élevée (manie). Risque accru de troubles dépressifs et anxieux supplémentaires plutôt que des épisodes maniaques.

A connaitre pour l'examen: livre p 227 tableau 7.6. Quels sont les critères DSM 5 du trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle?

Comprendre et définir les troubles de l'humeur

Episode maniaque

- Augmentation de l'estime de soi ou idée de grandeur.
- Réduction du besoin de sommeil.
- Plus grande communicabilité que d'habitude ou désir constant de parler
- Fuite des idées ou sensation subjectives que les pensées défilent
- Distractibilité
- Augmentation de l'activité orientée vers un but (social, professionnel, ou sexuel) ou agitation psychomotrice (c'est-à-dire sans objectif)
- Engagement excessif dans des activités à potentiel élevé de conséquences dommageables (achats inconsidérés, conduites sexuelles inconséquentes, investissements commerciaux déraisonnables)

A connaitre pour l'examen: les critères DSM 5 d'un épisode maniaque - Livre p. 216 tableau 7.2

Critère B: Détresse cliniquement significative ou altération du fonctionnement social

Critère C: L'épisode n'est pas imputable aux effets physiologiques d'une substance ou à une autre affection médicale

Comprendre et définir les troubles de l'humeur

Les troubles bipolaires

La tendance à alterner des épisodes maniaques avec des épisodes dépressifs est la caractéristique principale qui permet d'identifier les troubles bipolaires.

- ✓ **Bipolaire I** : dépression majeure et état maniaque
- ✓ **Bipolaire II** : dépression et manie mineure
- ✓ **Cyclothymie**: dépression mineure et manie mineure mais chronique.

Spécification avec cycle rapide: 4 phases dépressives ou 4 phases maniaques. Gamme plus sévère de ces troubles.

Comprendre et définir les troubles de l'humeur

Survenue et durée des troubles bipolaires

L'âge moyen de survenue du trouble bipolaire I est de 15 à 18 ans.

L'âge moyen de survenue du trouble bipolaire II est de 19 à 22 ans

Des cas des deux troubles peuvent commencer dès l'enfance

Il est relativement rare qu'un trouble bipolaire survienne pour la première fois après l'âge de 40 ans. Cependant, une fois qu'il s'est manifesté, son évolution est chronique.

Comprendre et définir les troubles de l'humeur

Survenue et durée des troubles bipolaires

Suicide: les estimations de tentatives de suicide oscillent entre 17 et 48 % sur une durée de vie.

Taux d'environ 20% plus élevé que pour les personnes ne présentant pas de trouble bipolaire.

Le taux de suicide abouti est de 4 fois plus élevé que chez les personnes souffrant de dépression caractérisée récurrente.

Même soignés, les patients continuent à avoir du mal à s'adapter.

Prévalence des troubles de l'humeur

Les études épidémiologiques

Trouble dépressif caractérisé

Environ 16% de la population traversent un trouble dépressif caractérisé au cours de leur vie et environ 6% ont connu un trouble dépressif caractérisé au cours des douze derniers mois

Trouble bipolaire

Les estimations de la prévalence du trouble bipolaire sont de 1% pour la durée d'une vie et de 0,8% au cours de l'année écoulée

Prévalence des troubles de l'humeur

Les études épidémiologiques

Trouble dépressif caractérisé

Les femmes seraient deux fois plus exposées que les hommes au trouble dépressif caractérisé

Trouble bipolaire

Relativement également distribué dans les deux sexes

Les femmes sont plus susceptibles que les hommes d'être sujettes aux cycles rapides, mais aussi à l'anxiété, et à se trouver en phase dépressive plutôt que maniaque

Prévalence chez les enfants - dépression

Prévalence des troubles de l'humeur

Les enfants

- Les troubles dépressifs surviennent moins fréquemment chez les enfants prépubères que chez les adultes.
- Parmi les enfants âgés de 2 à 5 ans, les taux de trouble de l'humeur est d'environ 1,5 %.
- 20 % à 50 % des enfants éprouvent des symptômes dépressifs

Le sex-ratio des troubles dépressifs est d'environ 50/50

Prévalence des troubles de l'humeur

Prévalence les adolescents-dépression

Les adolescents

Les adolescents souffrent de trouble dépressif caractérisé aussi souvent que les adultes

Trouble très largement un trouble féminin comme chez les adultes

Ce déséquilibre entre les sexes n'est pas observé dans les dépressions plus légères.

Prévalence des troubles de l'humeur

Prévalence chez les enfants les personnes âgées - dépression

Les personnes de plus de 65 ans

La prévalence globale du trouble dépressif caractérisé pour les personnes de plus de 65 ans est d'environ la moitié de celle de la population générale

Des symptômes plus légers qui n'atteignent pas le niveau de critère diagnostique du trouble dépressif caractérisé seraient plus fréquents parmi la population âgée

Prévalence des troubles de l'humeur

Prévalence chez les enfants, les adolescents et les personnes âgées –troubles bipolaires

Le trouble bipolaire semble se produire à peu près au même taux (1 %) chez les enfants et les adolescents que chez les adultes

Prévalence des troubles de l'humeur

Influences développementales sur les troubles de l'humeur, tout au long de la vie

Les enfants de moins de 3 ans peuvent manifester la dépression par:

1) des expressions faciales tristes
2) de l'irritabilité
3) de la fatigue
4) de l'agitation
5) des accès de colère
6) des problèmes pour manger et dormir

Nécessité de respecter le critère de durée de 2 semaines pour diagnostiquer le trouble dépressif caractérisé, car les fréquentes fluctuations d'humeur sont normales à ce jeune âge

Prévalence des troubles de l'humeur

Influences développementales sur les troubles de l'humeur, tout au long de la vie

Lors d'une étude prospective de grande envergure, Fergusson et Woodward (2002) observèrent que 13 % d'un groupe de 1265 adolescents qui avaient développé un trouble dépressif caractérisé entre l'âge de 14 et 16 ans étaient significativement plus à risque entre l'âge de 16 et 21 ans de développer un autre trouble

Prévalence des troubles de l'humeur

Influences développementales sur les troubles de l'humeur, tout au long de la vie

1. trouble dépressif caractérisé,
2. troubles anxieux,
3. dépendance à la nicotine
4. tentative de suicide
5. d'abus d'alcool et de drogue,
6. sous-performances scolaires
7. se retrouver parents à un âge précoce

En comparaison à des adolescents qui ne présentaient pas de trouble dépressif

Prévalence des troubles de l'humeur

Influences développementales sur les troubles de l'humeur, tout au long de la vie

Weissman *et al.* (1999) suivirent pendant 10 à 15 ans 83 enfants ayant vécu des épisodes dépressifs caractérisés avant la puberté.

L'évolution de ce groupe vers l'âge adulte:

On observa un taux plus élevé de tentatives de suicide et de difficultés sociales

Prévalence des troubles de l'humeur

Influences développementales sur les troubles de l'humeur, tout au long de la vie

Fergusson, Horwood, Ridder et Beautrais (2005) ont constaté que l'étendue et la gravité des symptômes dépressifs à l'adolescence prédisent la gravité de la dépression et des comportements suicidaires à l'âge adulte

La dépression infantile ou durant l'adolescence est une condition menaçante pour l'avenir et doit être traitée.

Prévalence des troubles de l'humeur

Influences développementales sur les troubles de l'humeur, tout au long de la vie

Influences liées a l'âge chez les personnes âgées

Certaines études estiment que 14 à 42 % des résidents des maisons de retraite sont victimes de trouble dépressif caractérisé

Une étude révèle que les personnes âgées de 56 à 85 ans souffrant de dépression et suivies pendant six ans, révéla qu'à peu près 80 % d'entre elles n'en guérissent pas (ou fluctuent entre la normalité et la dépression).

Prévalence des troubles de l'humeur

Influences développementales sur les troubles de l'humeur, tout au long de la vie

Influences liées a l'âge chez les personnes âgées

Les dépressions à survenue tardive sont aussi associées à des difficultés marquées de sommeil, au trouble d'anxiété de la maladie

Il peut être difficile de diagnostiquer une dépression chez une personne âgée car la présence de ce trouble de l'humeur est souvent compliquée par la présence de maladies ou de symptômes dégénératifs, comme une démence.

Prévalence des troubles de l'humeur

Influences développementales sur les troubles de l'humeur, tout au long de la vie

Influences liées a l'âge chez les personnes âgées

Evènements à l' origine des dépressions :

- Les problèmes de santé touchant la mobilité et l'autonomie fonctionnelle
- Les pathologies comme les démences, l' hypothyroïdie ou par la prise de certains médicaments
- Les changements dans l'environnement social (veuvage, solitude, peu d' appui social…)
- La dégradation de la situation socio-économique.

Prévalence des troubles de l'humeur

À travers les cultures

Certaines cultures possèdent leurs propres modes d'expression pour décrire une phase dépressive.

Les Hopi, une tribu de natifs américains, parlent de « coeur brisé » (Manson & Good, 1993).

Les aborigènes du centre de l'Australie qui sont clairement déprimés en attribuent les symptômes à de la faiblesse ou à une blessure de l'esprit (Brown *et al.*, 2012).

Les symptômes somatiques qui caractérisent les troubles de l'humeur sont à peu près équivalents à travers les cultures, il est difficile de comparer les sentiments subjectifs qui les accompagnent.

Les causes des troubles de l'humeur

Dimensions psychologiques

Stress et dépression



il apparaît clairement que les situations stressantes sont fortement liées à la survenue de troubles de l'humeur.

Les causes des troubles de l'humeur

Dimensions psychologiques

Stress et dépression

Déterminer l'importance de la signification de certains faits majeurs.

Quel est le contexte de l'évènement? Quel est le sens ou la signification de celui-ci?

Quelles sont les valeurs du patient?

Influence de l'humeur négative sur les souvenirs d'où l'importance d'avoir une approche prospective

Les causes des troubles de l'humeur

Dimensions psychologiques

Stress et dépression

Il semble que 20% à 50% des individus développent une dépression dans un contexte de stress –

50% à 80% des personnes exposées au stress sont indemnes.

Interaction **vulnérabilité x stress**

Les causes des troubles de l'humeur

Dimensions psychologiques

Stress et dépression

La rupture relationnelle à l'adolescence et à l'âge adulte

- ✓ Le décès d'une personne aimée
- ✓ La séparation

Etude de jumeaux de Kendler et al., (2003) – séparation amoureuse.
10 fois plus de risque que son jumeau d'être déprimé que le jumeau n'ayant pas vécu de rupture.
Si humiliation, 20 fois plus de risques

- ✓ L'humiliation
- ✓ La perte
- ✓ Le rejet

Les causes des troubles de l'humeur

Dimensions psychologiques

Stress et dépression

Une relation réciproque.

Le stress déclenche la dépression, et les personnes déprimées sont exposés à des événements stressants.

Les causes des troubles de l'humeur

Dimensions psychologiques

Stress et trouble bipolaire

La relation entre événements stressants et apparition d'épisodes bipolaires est également forte

Des ensembles d'événements stressants mais positifs semblent être à l'origine d'épisodes maniaques

Le vécu associé aux efforts investis dans la réalisation d'objectifs importants, avoir réussi le concours d'entrée dans une haute école, l'obtention d'un nouvel emploi ou une promotion, se marier, ou la réalisation de tout objectif lié à la popularité ou à la réussite financière déclenchent des épisodes maniaques chez les personnes vulnérables

Les causes des troubles de l'humeur

Dimensions psychologiques

Stress et trouble bipolaire

Au fur et à mesure que la pathologie progresse, les épisodes semblent se développer par eux-mêmes.

Certains des événements qui précipitent les épisodes maniaques semblent liés au manque de sommeil, comme cela se passe en période de post-partum, décalage horaire…

Les causes des troubles de l'humeur

Dimensions psychologiques

L'impuissance acquise face à la dépression

L'étude de Martin Seligman (1975)

Les personnes ne deviennent anxieuses et dépressives que lorsqu'elles « décident » de n'avoir aucun contrôle sur le stress dans leur vie.

Les causes des troubles de l'humeur

Dimensions psychologiques

L'impuissance acquise face à la dépression

Le modèle d'imputation d'un état dépressif a trois caractéristiques principales. Les imputations sont :

(1) *internes*, l'individu s'attribue la cause de l'événement négatif survenu, s'auto- accusant en disant « tout cela est de ma faute »

(2) *stables*, puisque même après la fin d'un incident négatif, l'auto-accusation selon laquelle « les mauvaises choses qui m'arriveront encore seront toujours de ma faute » demeure.

(3) *globales* car bien qu'étroitement limitées à un petit domaine de la vie, elles s'étendent jusqu'à en englober de nombreux autres.

Les causes des troubles de l'humeur

Dimensions psychologiques

La vulnérabilité psychologique

Chez une personne possédant une vulnérabilité non spécifique à l'anxiété ou à la dépression, les événements stressants stimulent un sens psychologique d'« incontrôlabilité » des événements de la vie.

(Barlow, 1988, 2002 ; Barlow *et al.*, 2013)

Les causes des troubles de l'humeur

Dimensions psychologiques

Le rôle des évitements expérientiels

Rumination mentale

Evitements comportementaux

Les causes des troubles de l'humeur

Dimensions psychologiques

Styles cognitifs négatifs

En 1967 puis en 1976, Aaron T. Beck a suggéré que la dépression pouvait être le résultat d'une tendance à interpréter les situations du quotidien de façon continuellement négative.

Les causes des troubles de l'humeur

Dimensions psychologiques

La triade cognitive dépressive de Beck

Les personnes dépressives font des erreurs cognitives car elles songent négativement à elles-mêmes, à leur environnement proche ainsi qu'à leur futur. La combinaison de ces trois domaines porte le nom de **triade cognitive dépressive ou triade cognitive de Beck**

Les causes des troubles de l'humeur

Dimensions psychologiques

La triade cognitive dépressive de Beck



FIGURE 7.5 La triade cognitive dépressive de Beck

La triade cognitive dépressive de Beck

Les causes des troubles de l'humeur

Dimensions sociales et culturelles

Les relations conjugales

La rupture relationnelle à l'âge adulte

Bruce et Kim (1992) population expérimentale de 695 femmes et 530 hommes.

21% des femmes ayant signalé une rupture conjugale ont développé une forme sévère de dépression. Ce taux est 3 fois plus élevé que chez les femmes mariées.

17% des hommes ayant signalé une rupture conjugale ont développé une forme sévère de dépression. Ce taux est 9 fois plus élevé que chez les hommes mariés.

Les causes des troubles de l'humeur

Dimensions sociales et culturelles

Les relations conjugales

Sans antécédents de dépression sévère :
14% des hommes
5% des femmes

Autrement dit, *seuls les hommes* se sont trouvés confrontés à un risque beaucoup plus important de développer un premier trouble de l'humeur immédiatement après une scission conjugale.

La rupture est-elle plus stressante pour les hommes que les femmes ??

Les causes des troubles de l'humeur

Dimensions sociales et culturelles

Relations conjugales et dépression: quelles relations ?

Un intense conflit et un faible soutien conjugal interviennent de façon importante dans une dépression.

Les causes des troubles de l'humeur

Dimensions sociales et culturelles

Relations conjugales et dépression: quelles relations ?

L'état dépressif, et le trouble bipolaire, en particulier s'il est continu, peut conduire à une détérioration considérable des relations entre époux.

Vivre quotidiennement avec une personne qui est en permanence au creux de la vague, d'humeur triste et pessimiste, conduit à une fatigue considérable. Ces modes d'interaction précipitent les disputes ou, pire, font que le conjoint a envie de partir.

Les causes des troubles de l'humeur

Dimensions sociales et culturelles

Relations conjugales et dépression: quelles relations ?

Chez les hommes.

La dépression de la partenaire semble conduire les hommes à se replier sur eux-mêmes.

Les causes des troubles de l'humeur

Dimensions sociales et culturelles

Relations conjugales et dépression: quelles relations ?

Chez les femmes

Les problèmes conjugaux sont le plus souvent la cause de la dépression

Problèmes conjugaux avec le partenaire. Rupture

Dépression

Les causes des troubles de l'humeur

Dimensions sociales et culturelles

Les troubles de l'humeur chez la femme

L'auto-accusation et la rumination contribueraient aux taux plus élevés de troubles de l'humeur chez les femmes que chez les hommes.

Les causes des troubles de l'humeur



FIGURE 7.6 La disparité entre les sexes dans les diagnostics de dépression dans le monde entier, exprimée en rapports de risques relatifs. Ces rapports de risques relatifs expriment la probabilité comparative des femmes à vivre un épisode dépressif caractérisé au cours de la dernière année, par rapport aux hommes. Au Brésil, par exemple, les femmes sont 2,6 fois plus susceptibles que les hommes de déclarer avoir vécu un épisode dépressif caractérisé l'année précédente. (Adapté de Bromet *et al.* (2011), pp. 11-16.)

Les causes des troubles de l'humeur

Dimensions sociales et culturelles

Les troubles de l'humeur chez la femme

Ces différences entre hommes et femmes dans le développement des troubles émotionnels soient fortement influencées par **la perception des aspects incontrôlables d'une situation**

En réponse à un stress et à certains sentiments dépressifs, les femmes réfléchissent davantage à leur situation (ruminations) et ont plus tendance à se blâmer d'être déprimées.

Ce style de réaction prédit le développement ultérieur de la dépression en cas de stress.

Les causes des troubles de l'humeur

Dimensions sociales et culturelles

Les troubles de l'humeur chez la femme

Les hommes tendent à ignorer leurs sentiments et, peut-être en s'engageant dans certaines activités personnelles servant d'alternatives pour en débarrasser leur esprit.

Les femmes ont tendance à accorder plus de valeur aux relations intimes que les hommes, ce qui constitue une protection si les réseaux sociaux sont forts, mais qui aussi peut les mettre en danger si perturbations.

Les causes des troubles de l'humeur

Dimensions sociales et culturelles

Les troubles de l'humeur chez la femme

Assignation des rôles masculins et féminins

Les femmes *sont* désavantagées dans nos sociétés car elles subissent davantage de discriminations, de harcèlements sexuels, d'abus et de pauvreté que les hommes. Elles bénéficient également de moins de respect et accumulent moins de pouvoirs.

Les causes des troubles de l'humeur

Dimensions sociales et culturelles

Le soutien social – vivre seul.e

Le risque pour une personne vivant seule de contracter une dépression est 80 % supérieur au risque encouru par une personne ne vivant pas seule

L'observation d'un grand nombre de femmes ayant vécu des situations très pénibles a permis à des chercheurs de mettre en évidence que seulement 10% de celles qui avaient des amis intimes auxquels elles pouvaient se confier développaient une dépression.

En revanche, 37 % des femmes sans amis intimes sombraient dans une phase dépressive

Une théorie intégrative des causes des troubles de l'humeur

Les causes des troubles de l'humeur



Les traitements psychologiques

Les traitements

L’activation comportementale:
https://www.youtube.com/watch?v=CvyoLyV_K6s

Les thérapies de remédiation cognitives

Les thérapies interpersonnelles

La prévention rechute

Le suicide

Le comportement suicidaire

On entend par "comportement suicidaire" toute une **variété de comportements** qualifiés soit de **tentative de suicide** (définie comme un geste intentionnel dans le but de se donner la mort), soit de **suicide** proprement dit.

Le suicide

Faits importants

- ✓ Les hommes sont plus concernés que les femmes (73 % contre 27 %).

- ✓ Le pic de suicide se situe dans la tranche d'âge 45-64 ans (40 %), mais tous les âges sont concernés :

  5 % des décès par suicide concernent des individus de moins de 25 ans

  27 % entre 25 et 44 ans

  28 % après 64 ans.

- ✓ Les suicides représentent environ **2 % de la mortalité générale.**

Le suicide

Faits importants

- ✓ il s’agit de la première cause de mortalité entre 25 et 34 ans (20 % du nombre total de décès) et de la deuxième entre 15 et 24 ans (16 %) ainsi qu’entre 35 et 44 ans (16 %).

- ✓ Il est à noter que ces chiffres peuvent être sous-estimés (absence de mention explicite dans le certificat de décès).

Le suicide

Tentative de suicide, suicide et dépression. Quels sont les liens?

L' évaluation est approximative. Les raisons à cela sont d'ordre méthodologique :

- ✓ les données sont recueillies rétrospectivement et il n'est pas toujours aisé de déterminer le statut de dépressivité préalable des suicidés.
- ✓ D'autre part, les méthodes de diagnostic de la dépression et les seuils utilisés sont variés.

Néanmoins divers travaux ont pu montrer que **le suicide était étroitement lié aux maladies psychiatriques et notamment à la dépression**. La dépression est le chemin final commun vers le suicide.

Comportement suicidaire : un profil complexe

Le suicide

Les comportements suicidaires peuvent être classés en fonction de plusieurs critères :

- l’intentionnalité du sujet (désir de fuite, de vengeance, suicide altruiste, prise de risque, comportement de "jeu avec la mort", autosacrificiel),
- l’idéation suicidaire (justification de l’acte),
- le moyen utilisé (violent ou non),
- le degré de létalité (nécessité ou non d’une hospitalisation en soins intensifs),
- l’importance des altérations du fonctionnement cognitif (agressivité, impulsivité),
- les circonstances aggravantes ou précipitantes (confusion mentale, intoxication, contexte sociodémographique particulier),
- la présence de comorbidités psychiatriques ou autres.