PSYC1008 - Approche de la démarche clinique en psychologie


Séance 9
Analyser et interpréter les résultats à un outil d'évaluation

Trecy Martinez Perez



Démarche clinique en psychologie

Approche Centrée sur la Personne (ACP)



Ce que le psychologue (l'étudiant) fait

Prise de contact	Symptomatologie	Demande(s)	Choix des objectifs	Elaboration d'un plan thérapeutique	Mener l'intervention / Suivre l'évolution du patient	Faire le point	Ajuster l'intervention / Suivre l'évolution du patient	…

9



Quels <u>processus</u> de pensée et de prise de décision (= raisonnement clinique) amènent le psychologue (l'étudiant) à agir ainsi ?

Quelles <u>informations</u> alimentent le raisonnement clinique du psychologue (de l'étudiant) ?





Aujourd’hui

Administrer les outils

Analyser les normes

Corriger et analyser le résultat

Interpréter le résultat

Ressources

Prochains rendez-vous

Volets à considérer

1. **Communication** = Comment présenter/proposer un outil d'évaluation au patient ?
2. **Standardisation** = Quels sont les éléments à prendre en compte pour proposer une évaluation standardisée ?
3. **Observation** = Sur quoi peut porter la prise de note pendant l'évaluation outillée ?

Volets à considérer

- **Communication** = Comment présenter/proposer un outil d'évaluation au patient ?
    - Voir l'évaluation collaborative (cours précédent)
    - Profiter du partage d'expérience avec M. Goosse (4 novembre)
    - Illustration dans la vidéo réalisée par A. Wagener et un patient-formateur (eCampus)
    - Illustration dans la vidéo réalisée par S. Willems et un patient-simulé (eCampus)

Volets à considérer

- **Standardisation** = Quels sont les éléments à prendre en compte pour proposer une évaluation standardisée ?
  - L'ordre d'administration dans une batterie
  - Les consignes (et items d'entrainement) + les différentes règles (départ, retour, arrêt)
  - Les temps de présentation et le chronométrage
  - Les items et le matériel
  - La correction
  - MAIS s'assurer du confort et de la compréhension des consignes, sinon résultat ininterprétable !
  - **Quid de l'adaptation des consignes ou modalités de passation ?**

Volets à considérer

- **Observation** = Sur quoi peut porter la prise de note pendant l'évaluation outillée ?
  - Coopération
  - Fatigue
  - Concentration
  - Attitude face à l'échec ou la réussite
  - Signes cliniques en relation avec un trouble spécifique ?
  - Comment le patient procède-t-il ? Quelle est sa méthode de résolution des problèmes ?
  - …

Volets à considérer

- **Observation** = Sur quoi peut porter la prise de note pendant l'évaluation outillée ?

Thomas – 29 ans
Traumatisme crânien (accident de voiture)

8/16 pour le rappel libre différé dans une épreuve de mémoire épisodique



- Agité, sueur et tremblements
- Peu coopératif et fatigué

Samuel – 27 ans
Traumatisme crânien (accident de voiture)

9/16 pour le rappel libre différé dans une épreuve de mémoire épisodique




- Semble relativement peu anxieux (cf. score faible à l'échelle STAI-état)
- Soucieux de bien faire

Volets à considérer

- **Observation** = Sur quoi peut porter la prise de note pendant l'évaluation outillée ?

Lucas - 9 ans, 3e P
Suspicion de difficultés anxieuses ?

NS 16 à une échelle d'anxiété-état



- Passe le bilan à 18h30 après l'école
- Sont arrivés en retard, parent énervé, …

Perrine – 8 ans et demi, 3e P
Suspicion de difficultés anxieuses ?

NS 15 à une échelle d'anxiété-état



- Passe le bilan pendant les vacances
- Sont arrivés à l'avance, parent calme et réconfortant…



Aujourd’hui

Administrer les outils

Analyser les normes

Corriger et analyser le résultat

Interpréter le résultat

Ressources

Prochains rendez-vous

Éléments à analyser

1. Composition
2. Taille
3. Actualisation
4. Distribution et types de scores proposés

Éléments à analyser

1. **Composition**
    - Échantillon représentatif de la **population générale**
    - Échantillon représentatif des personnes souffrant d'un trouble (**population clinique**)
        - Quelles sont les caractéristiques géographiques, socio-économiques, culturelles, linguistiques, d'âge et de genre de cet échantillon ?

Éléments à analyser

1. Composition
2. **Taille**
    - min. 100 participants pour un échantillon représentatif de la population générale (Friberg, 2010)
    - min. 30 personnes pour un échantillon clinique (Cornet & Bachelier, 2016)
    - Plus l'échantillon est petit, moins la moyenne, l'écart-type et les percentiles des normes sont estimés avec précision

Éléments à analyser

1. Composition
2. Taille
3. **Actualisation**
   - De quand datent les normes ?
   - Ex. : des personnes âgées testées en 2008 réussissent mieux que celles testées en 1991 (de Rotrou et al., 2013) → des normes anciennes risquent de sous-détecter un déficit





Figure 1. CEP global score and sub-scores of 1991- and 2008-samples.
doi:10.1371/journal.pone.0078646.g001

Éléments à analyser

1. Composition
2. Taille
3. Actualisation
4. **Distribution et types de scores proposés**
   - La distribution des scores suit-elle la loi normale (la « courbe de gauss ») ?
   - Asymétrie ? Aplatissement ?




"La déesse à laquelle les neuropsychologues vouent un culte passionnel est une cloche".

Cf. Petit guide de psychométrie clinique

Éléments à analyser

1. Composition
2. Taille
3. Actualisation
4. **Distribution et types de scores proposés**
   - Rangs percentiles
   - Scores Z
   - Notes standard (Moyenne de 10, ET de 3)
   - Notes composites (Moyenne de 100, ET de 15)
   - Notes T (Moyenne de 50, ET de 10)
   - À rechercher aussi : sensibilité, spécificité et score seuil
   - À rechercher aussi : erreur standard de mesure (ESM) – voir plus loin

Éléments à analyser



Rang percentile

1 5 10 20 30 50 70 80 90 95 99

Score z

−4 −3 −2 −1 0 +1 +2 +3 +4

Note T

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Note composite

55 70 85 100 115 130 145

Note standard

1 4 7 10 13 16 19

MAIS la distribution des normes suit rarement la loi normale !!

Erreur standard de mesure (ESM)

Un score observé = score vrai + erreur de mesure

1. ESM = ET × √(1 − fidélité)
2. Exemple : note standard (ET = 3), fidélité = 0,80 → ESM ≈ 1,34
3. Thomas (8/16) et Samuel (9/16) : un point d'écart est très probablement dans la marge d'erreur
4. Pour comparer deux passations (suivi), utiliser un indice de changement fiable plutôt que la simple différence



Aujourd’hui

Administrer les outils

Analyser les normes

Corriger et analyser le résultat

Interpréter le résultat


Ressources

Prochains rendez-vous

Distinguer les 2 étapes


Pour mettre en lumière les **précautions** à prendre lors de l'analyse d'un résultat

Pour mettre en évidence qu'un score peut être analysé comme dans les normes (à l'étape « analyse statistique ») **mais par la suite** (à l'étape « interprétation clinique ») considéré par le clinicien comme un indicateur de situation à risque, d'une réelle difficulté, d'une dégradation



Willems et al. (2025)

Après le calcul du score du patient…



Raisonnement dichotomique

- Mon patient appartient-il (hypothèse nulle) ou non (hypothèse alternative) à la même population que l'échantillon normatif ?
- Ce score est-il compatible avec ce que l'on observe dans l'échantillon normatif (H0) ou suffisamment rare pour conclure qu'il s'en écarte (H1) ? Le lien avec une difficulté se fait à l'étape clinique.

1) **Quel est le taux d'erreur que je tolère pour cette décision/le choix du seuil ?**
2) **Ce score est-il hors norme ou pas ?**

Raisonnement comparatif


- Où se situe mon patient en comparaison de la population représentée par cet échantillon normatif ?
- Quelle est la probabilité d'avoir ce score dans l'échantillon normatif ?

3) **Quelle est la fréquence de ce score ?**
4) **Comment décrire cette fréquence ?**

1)Quel est le taux d'erreur que je tolère pour cette décision/le choix du seuil ?

Risque d'erreur (α) = la probabilité, acceptée à l'avance, de conclure que le patient est différent de l'échantillon normatif alors qu'il ne l'est pas (faux positif)

- Ex. : seuil fixé à z = −1 → ≈ 16 % des personnes de l'échantillon normatif ont un score plus bas (si loi normale) → on accepte ≈ 16 % de faux positifs, soit presque 1 erreur sur 6




1) Quel est le taux d'erreur que je tolère pour cette décision/le choix du seuil ?

Risque d'erreur (α) = la probabilité, acceptée à l'avance, de conclure que le patient est différent de l'échantillon normatif alors qu'il ne l'est pas (faux positif)

Convention statistique : α = 0,05

- Si je conclus « hors norme » au seuil de 5 %, j'accepte que ≈ 5 % des personnes de la population normative soient classées à tort hors norme
- = 5 % de **faux positifs** et 95 % de **vrais négatifs**

1)Quel est le taux d'erreur que je tolère pour cette décision/le choix du seuil ?




*Le paramétrage du test prend en compte le caractère uni ou bilatéral de l'analyse

Seuil clinique

Adapté de Allain et al. (2025) et Willems et al. (2025)

Un petit coup de pouce


Distribution normale et analyse unilatérale



Correspond au score Z de + OU - 1,65 = Seuil libéral

Un petit coup de pouce

Distribution normale et analyse bilatérale




Seuils considérés = 2,5 et 97,5%

Correspond au score Z de + ET - 1,96 = Seuil libéral

Un petit coup de pouce

Distribution non-normale et analyse unilatérale



Seuil supérieur = 98%


Seuil inférieur = 2%

Correspond au score Z de + OU – 2,05 = Seuil conservateur

Jury de consensus (Willems et al., 2025, Rec. 6-7) : si la distribution s'écarte de la normale, préférer les percentiles ; le seuil z strict est surtout recommandé quand l'effectif normatif est inconnu.

Un petit coup de pouce

Distribution non-normale et analyse bilatérale



Seuils considérés = 1 et 99%


Correspond au score Z de + et – 2,33 = Seuil conservateur

Jury de consensus (Willems et al., 2025, Rec. 6-7) : si la distribution s'écarte de la normale, préférer les percentiles ; le seuil z strict est surtout recommandé quand l'effectif normatif est inconnu.


Pourquoi un seuil plus strict ?

Le seuil z = −1,65 ne garantit 5 % d'erreur que si…

1. la distribution des normes est normale ET l'échantillon normatif est grand
2. Petit échantillon (loi normale) : le risque réel de faux positifs grimpe (graphique)
3. Distribution asymétrique ou aplatie : jusqu'à 10,65 % avec N = 10
4. Il faut N > 50 pour rester sous ≈ 5,5 %




Valeurs : Willems et al. (2025), p. 127-128



Et si je fais passer plusieurs tests ?

Chaque score testé à 5 % ajoute un risque de faux positif

1. Vaut aussi en psychologie clinique : sous-échelles d'un questionnaire (p. ex. 9 dimensions de la SCL-90-R, 10 échelles cliniques du MMPI-2)
2. Un score isolé « hors norme » dans une batterie est donc attendu par hasard
3. Pistes (Rec. 5) : scores composites, seuil plus strict, hypothèses a priori
4. MAIS un seuil plus strict augmente les faux négatifs : chercher un compromis selon la question clinique



Valeurs : Willems et al. (2025), tableau 2

Seuils de décision

Raisonnement dichotomique et analyse **unilatérale (tableau 1)**

	Rang percentile	Score z	Note standard	Note composite	Note T
Seuil libéral (N ≥ 30 et distribution ≈ normale ; percentile : toute distribution)	≤ 5 OU ≥ 95	≤ −1,65 OU ≥ +1,65	≤ 5 OU ≥ 15	≤ 75 OU ≥ 125	≤ 34 OU ≥ 67
Seuil conservateur (effectif normatif inconnu)	–	≤ −2,05 OU ≥ +2,05	≤ 4 OU ≥ 16	≤ 69 OU ≥ 131	≤ 30 OU ≥ 71
N < 30 : test t modifié	p ≤ 0,05 (unilatéral) si distribution normale · p ≤ 0,02 si distribution asymétrique/aplatie ou inconnue				

Choisir le côté selon le sens de l'échelle : score bas = difficulté → seuil inférieur ; score élevé = symptômes → seuil supérieur.

Distribution qui s'écarte de la normale : préférer les percentiles (Rec. 7).

Willems et al. (2025)

Seuils de décision

Raisonnement dichotomique et analyse **bilatérale (tableau 2)**

	Rang percentile	Score z	Note standard	Note composite	Note T
Seuil libéral (N ≥ 30 et distribution ≈ normale ; percentile : toute distribution)	≤ 2,5 ET ≥ 97,5	≤ −1,96 ET ≥ +1,96	≤ 4 ET ≥ 16	≤ 71 ET ≥ 129	≤ 30 ET ≥ 70
Seuil conservateur (effectif normatif inconnu)	–	≤ −2,33 ET ≥ +2,33	≤ 3 ET ≥ 17	≤ 65 ET ≥ 135	≤ 27 ET ≥ 73
N < 30 : test t modifié	p ≤ 0,05 (bilatéral) si distribution normale · p ≤ 0,02 si distribution asymétrique/aplatie ou inconnue				

En bilatéral, les 5 % d'erreur se répartissent des deux côtés : 2,5 % en bas + 2,5 % en haut.
Distribution qui s'écarte de la normale : préférer les percentiles (Rec. 7).

Willems et al. (2025)

Avant de choisir un seuil : 3 questions

À se poser avant toute décision « hors norme / dans les normes »

1. Quel est mon objectif ? Repérer une difficulté d'un seul côté (unilatéral) ou décrire le fonctionnement des deux côtés (bilatéral) ?
2. Quel est le sens de l'échelle ? Un score élevé = meilleure performance, ou plus (+) de symptômes ?
3. Que sais-je des normes ? Type de score, effectif (N ≥ 30 ?), forme de la distribution

Un tableur ou un logiciel de calcul ne répond pas à ces questions à votre place

2) Le score est-il hors ou dans les normes ?

Échelle de détresse psychologique (+ le score est élevé, + la détresse est élevée) + analyse unilatérale + N = 150 + normalité :

- Score z = 1,8


Test de fluence verbale (+ le score est élevé, + la performance est bonne) + analyse bilatérale (décrire forces et faiblesses) + N = 100 + normalité :

- P 90

Échelle de détresse psychologique (+ le score est élevé, + la détresse est élevée) + analyse unilatérale + N = 25 + normalité :

- Score brut = 14; Moyenne = 18, écart-type = 2,1

Si analyse unilatérale + N = 150 + normalité : Score Z = 1.8



Seuil clinique

Si analyse unilatérale + N = 150 + normalité : Score Z = 1.8

	Rang percentile	Score z	Note standard	Note composite	Note T
Seuil libéral (N ≥ 30 et distribution ≈ normale ; percentile : toute distribution)	≤ 5 OU ≥ 95	≤ −1,65 OU **≥ +1,65**	≤ 5 OU ≥ 15	≤ 75 OU ≥ 125	≤ 34 OU ≥ 67
Seuil conservateur (effectif normatif inconnu)	–	≤ -2,05 OU ≥ +2,05	≤ 4 OU ≥ 16	≤ 69 OU ≥ 131	≤ 30 OU ≥ 71
N < 30 : test t modifié	p ≤ 0,05 (unilatéral) si ribution normale · p ≤ 0,02 si distribution asymétrique/aplatie ou inconnue				

Oui, z = 1,8 ≥ +1,65 : hors norme

D'après Willems et al. (2025)

2) Le score est-il hors ou dans les normes ?

Échelle de détresse psychologique (+ le score est élevé, + la détresse est élevée) + analyse unilatérale + N = 150 + normalité :

- Score z = 1,8


Test de fluence verbale (+ le score est élevé, + la performance est bonne) + analyse bilatérale (décrire forces et faiblesses) + N = 100 + normalité :

- P 90

Échelle de détresse psychologique (+ le score est élevé, + la détresse est élevée) + analyse unilatérale + N = 25 + normalité :

- Score brut = 14; Moyenne = 18, écart-type = 2,1

Si analyse bilatérale + N = 100 + normalité : P90



Si analyse bilatérale + N = 100 + normalité : P90

	Rang percentile	Score z	Note standard	Note composite	Note T
Seuil libéral (N ≥ 30 et distribution ≈ normale ; percentile : toute distribution)	**≤ 2,5 ET ≥ 97,5**	≤ −1,96 ET ≥ +1,96	≤ 4 ET ≥ 16	≤ 71 ET ≥ 129	≤ 30 ET ≥ 70
Seuil conservateur (effectif normatif inconnu)	–	≤ −2,33 ET ≥ +2,33	≤ 3 ET ≥ 17	≤ 65 ET ≥ 135	≤ 27 ET ≥ 73
N < 30 : test t modifié	p ≤ (latéral) si distribution normale · p ≤ 0,02 si distribution asymétrique/aplatie ou inconnue				

Non, P90 < 97,5 : dans les normes

D'après Willems et al. (2025)

2) Le score est-il hors ou dans les normes ?

Échelle de détresse psychologique (+ le score est élevé, + la détresse est élevée) + analyse unilatérale + N = 150 + normalité :

- Score z = 1,8


Test de fluence verbale (+ le score est élevé, + la performance est bonne) + analyse bilatérale (décrire forces et faiblesses) + N = 100 + normalité :

- P 90


Échelle de détresse psychologique (+ le score est élevé, + la détresse est élevée) + analyse unilatérale + N = 25 + normalité :

- Score brut = 14; Moyenne = 18, écart-type = 2.1

Si unilatérale + N = 25 + normalité :
Score brut = 14; Moyenne = 18, écart-type = 2.1



Après le calcul du score du patient…



Raisonnement dichotomique

- Mon patient appartient-il (hypothèse nulle) ou non (hypothèse alternative) à la même population que l'échantillon normatif ?
- Ce score est-il compatible avec ce que l'on observe dans l'échantillon normatif (H0) ou suffisamment rare pour conclure qu'il s'en écarte (H1) ? Le lien avec une difficulté se fait à l'étape clinique.

1) **Quel est le taux d'erreur que je tolère pour cette décision/le choix du seuil ?**
2) **Ce score est-il hors norme ou pas ?**

Raisonnement comparatif

- Où se situe mon patient en comparaison de la population représentée par cet échantillon normatif ?
- Quelle est la probabilité d'avoir ce score dans l'échantillon normatif ?

3) **Quelle est la fréquence de ce score ?**
4) **Comment décrire cette fréquence ?**

3) Quelle est la fréquence de ce score ?

Pour les **rangs percentiles** : information donnée par le percentile


Pour les **scores Z** : utiliser le tableau de distribution (**si normalité**)

Fournit la probabilité $P(X \leq x)$
pour $X \sim N(0,1)$



x	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

Fournit la probabilité $P(X \leq x)$
pour $X \sim N(0,1)$




x	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0,0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0,1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0,2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0,3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0,4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0,5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0,6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0,7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0,8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0,9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

Table de répartition de la distribution normale

Vous devez croiser la ligne (= unité + 1re décimale du score Z) et la colonne (= 2e décimale du score Z).

Par exemple, si le score z est de 2.48…

Fournit la probabilité $P(X \leq x)$
pour $X \sim N(0,1)$



x	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0,0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0,1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0,2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0,3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0,4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0,5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0,6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0,7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0,8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0,9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

Table de répartition de la distribution normale


Vous devez croiser la ligne (= unité + 1re décimale du score Z) et la colonne (= 2e décimale du score Z).

Par exemple, si le score z est de 2.48, vous devez croiser la ligne 2.4 avec la colonne .08.

= 0.9934

Proportion de la population ayant ce score ou moins = 0.9934 × 100 = 99.34 % (seuls 0.66 % ont un score plus élevé)

Fournit la probabilité $P(X \leq x)$
pour $X \sim N(0,1)$




x	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0,0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0,1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0,2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0,3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0,4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0,5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0,6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0,7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0,8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0,9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

Table de répartition de la distribution normale

Par exemple, si le score z est de -0.12…

Fournit la probabilité $P(X \leq x)$
pour $X \sim N(0,1)$



x	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0,0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0,1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0,2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0,3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0,4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0,5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0,6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0,7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0,8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0,9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

Table de répartition de la distribution normale

Par exemple, si le score z est de -0.12, vous devez croiser la ligne 0.1 avec la colonne .02.

= 0.5478

Proportion ayant ce score ou moins = (1 − 0.5478) × 100 = 45.22 %

Pourquoi 1-…. ? Car le score z dans cet exemple était négatif

4) Comment décrire cette fréquence ?

Option 1 (neuropsy)

Jury de consensus **en neuropsychologie** : 3 catégories seulement (Willems et al., 2025, Rec. 11)

Score bas peu fréquent · Score fréquent · Score élevé peu fréquent

On qualifie le score (« bas », « élevé ») et sa fréquence, pas la fonction : « déficitaire » est réservé à la conclusion clinique

4) Comment décrire cette fréquence ?

Option 1 (neuropsy)

Raisonnement comparatif et analyse unilatérale

Fréquence estimée (ce score ou moins)	Rang percentile	Score z	Note standard	Note composite	Note T	Description	Interprétation statistique
≥ 95 %	≥ 95	≥ +1,65	≥ 15	≥ 125	≥ 67	**Score élevé peu fréquent**	Hors norme si le côté élevé est testé
> 5 % et < 95 %	> 5 et < 95	> −1,65 et < +1,65	> 5 et < 15	> 75 et < 125	> 34 et < 67	**Score fréquent**	Dans les normes
≤ 5 %	≤ 5	≤ −1,65	≤ 5	≤ 75	≤ 34	**Score bas peu fréquent**	Hors norme si le côté bas est testé

Willems et al. (2025), tab. 3, encadré 1

4) Comment décrire cette fréquence ?

Option 1 (neuropsy)

Raisonnement comparatif et analyse bilatérale

Fréquence estimée (ce score ou moins)	Rang percentile	Score z	Note standard	Note composite	Note T	Description	Interprétation statistique
≥ 97,5 %	≥ 97,5	≥ +1,96	≥ 16	≥ 129	≥ 70	**Score élevé peu fréquent**	Hors norme
> 2,5 % et < 97,5 %	> 2,5 et < 97,5	> −1,96 et < +1,96	> 4 et < 16	> 71 et < 129	> 30 et < 70	**Score fréquent**	Dans les normes
≤ 2,5 %	≤ 2,5	≤ −1,96	≤ 4	≤ 71	≤ 30	**Score bas peu fréquent**	Hors norme

Willems et al. (2025), tab. 3, encadré 1

4) Comment décrire cette fréquence ?

Option 2 (pratiques courantes à la CPLU)

unilatéral

Fréquence estimée de la population ayant ce score ou moins	Rang percentile	Score z	Note standard	Note composite	Note T	Description 2
≥98%	≥98	≥+2.05	≥16	≥131	≥71	Score très supérieur à la moyenne
entre ≥95% et <98%	entre ≥95 et <98	entre ≥+1.65 et <+2.05	entre ≥15 et <16	entre ≥125 et <131	entre ≥67 et <71	Score supérieur à la moyenne
entre >5% et <95%	entre >5 et <95	entre >-1.65 et <+1.65	entre >5 et <15	entre >75 et <125	entre >34 et <67	Score dans la moyenne
entre >2% et ≤5%	entre >2 et ≤5	entre >-2.05 et ≤-1.65	entre >4 et ≤5	entre >69 et ≤75	entre >30 et ≤34	Score inférieur à la moyenne
≤2%	≤2	≤-2.05	≤4	≤69	≤30	Score très inférieur à la moyenne

bilatéral

≥98%	≥98	≥+2.33	≥17	≥135	≥73	Score très supérieur à la moyenne
entre ≥95% et <98%	entre ≥95 et <98	entre ≥+1.96 et <+2.33	entre ≥16 et <17	entre ≥129 et <135	entre ≥67 et <73	Score supérieur à la moyenne
entre >5% et <95%	entre >5 et <95	entre >-1.96 et <+1.96	entre >4 et <16	entre >71 et <129	entre >30 et <67	Score dans la moyenne
entre >2% et ≤5%	entre >2 et ≤5	entre >-2.33 et ≤-1.96	entre >3 et ≤4	entre >65 et ≤71	entre >27 et ≤30	Score inférieur à la moyenne
≤2%	≤2	≤-2.33	≤3	≤65	≤27	Score très inférieur à la moyenne



Aujourd'hui

Administrer les outils

Analyser les normes

Corriger et analyser le résultat

Interpréter le résultat

Ressources

Prochains rendez-vous

Interprétation clinique

Question = La performance est-elle le reflet d'une difficulté/d'un processus problématique ?

1. Considérer le niveau de performance présupposé
2. Intégrer **l'ensemble** des informations pour une interprétation cohérente
   - toutes les épreuves
   - l'histoire de vie et contexte du patient (ex. langue maternelle, influence de la culture, niveau socio-économique, niveau d'éducation, variables physiques/somatiques…)
   - les difficultés rapportées, antécédents, conséquences…
   - les observations
3. Garder en tête les caractéristiques de l'échantillon normatif (niveau SES, …) et les qualités psychométriques de l'outil en lien avec les objectifs de l'évaluation

Interprétation clinique

Illustrations

Un score peut être analysé comme dans les normes mais par la suite considéré par le clinicien comme

- un indicateur d'une situation à risque d’évolution vers un trouble (si, par exemple, il forme un profil à risque cohérent et valide avec d'autres résultats)
- un indicateur d'une difficulté/d’un processus problématique (par exemple, en comparaison avec un niveau attendu plus élevé)
- ou comme un indicateur d'une dégradation lors d'un suivi longitudinal (par exemple, s'il s’écarte significativement d'un score obtenu précédemment).

Interprétation clinique

Précautions

1. Retenir que les résultats à l'évaluation outillée sont des estimations **indirectes et ponctuelles** qui peuvent changer à travers le temps
2. Être alerte quand les résultats peuvent être biaisés par la **non-collaboration** (volontaire ou non) de la personne

Illustration dans un rapport

Remarque : Le schéma ci-dessous représente une image **hypothétique** de votre **situation actuelle** qui vise à donner une vue d'ensemble de vos difficultés et des liens qui pourraient exister entre celles-ci. Les difficultés que vous avez rapportées ont été reformulées en concepts psychologiques connus. **En bleu** figure les difficultés mises en évidence lors de l'évaluation. Sous forme de commentaire bleu, se trouve les acronymes des questionnaires et sous-échelles qui vont dans le sens des difficultés exprimées. Ce schéma se trouve en annexe sous forme agrandie.




Illustration dans un rapport

Résumé des résultats aux questionnaires

Difficultés évaluées	Questionnaires utilisés	Résumé des résultats
• Inventaire des symptômes psychologiques généraux • Détresse psychologique / impact des difficultés	• Symptoms Cheklist 90R (SCL90-R) • Mesure d'Impact 45 (MI45)	Mettent en évidence : • des symptômes de dépression : humeur déprimée, envie fréquente de pleurer, idées suicidaires et manque d'énergie • des sentiments anxieux : nervosité, agitation, besoin de vérification/de répéter des actions, stress au travail • des difficultés de sommeil, de concentration et irritabilité • des sentiments de solitude et d'être malheureux au niveau amoureux
Symptômes de dépression	Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CESD-S)	Va dans le sens d'un épisode de dépression majeur
Consommation de substances	Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST)	Va dans le sens d'un trouble d'usage de l'alcool
Impulsivité	Short UPPS Impulsive Behavior Scale (UPPS-P)	Aucun résultat significatif
Estime de soi	Rosenberg Self-Esteem Scale	Estime de soi dans la moyenne
Fonctionnement relationnel	Relationship Scales Questionnaire (RSQ)	Anxiété relationnelle très supérieure à la moyenne

Illustration dans un rapport

Les résultats au questionnaire évaluant la consommation d'alcool et autres substances (ASSIST) ont mis en avant une consommation quotidienne d'alcool au cours des trois derniers mois, un désir irrépressible de consommer, des conséquences financières, sociales et sur la santé, une interférence avec les activités quotidiennes, une préoccupation des proches et des tentatives infructueuses de contrôle de la consommation. Ces résultats sont cohérents avec vos propos. Vous décrivez plusieurs **fonctions de l'alcool**, notamment de passer du temps avec vos amis, de loisir, de faire face à l'ennui, à la déprime ou à la fatigue. Vous décrivez également **l'impact de votre consommation sur votre vie**

Concernant l'impact sur l'humeur, le score au questionnaire spécifique à la dépression (CESD-S) va dans le sens d'un épisode de dépression majeur. Vos réponses à l'échelle de dépression de la SCL90R et de détresse symptomatique de la MI45 mettent en évidence une **humeur triste ou déprimée, des pensées suicidaires, une envie fréquente de pleurer et un sentiment de fatigue et de manque d'énergie**. Ces résultats vont dans le sens de vos propos puisque vous exprimez avoir des coups de blues, que vous êtes souvent émotif, que vous ressentez une fatigue constante et que parfois pendant la nuit après avoir consommé, vous vous sentez déprimé et vous pensez au suicide.



Aujourd'hui

Administrer les outils

Analyser les normes

Corriger et analyser le résultat

Interpréter le résultat

Ressources

Prochains rendez-vous

Article de synthèse

Rev Neuropsychol

2025 ; 17 (3) : 141-151

doi: 10.1684/nrp.2025.0826
© 2025 JLE. Publié par JLE. Cet article est publié en open access sous licence CC-BY-NC-ND.

Recommandations du jury de la conférence de consensus sur l'interprétation et la communication des scores en neuropsychologie (Paris, 22 novembre 2024)

Recommendations of the jury of the consensus conference on the interpretation and communication of neuropsychology scores (Paris, November 22, 2024)

LIEGE le 10/11/2025.



Aujourd’hui

Administrer les outils

Analyser les normes

Corriger et analyser le résultat

Interpréter le résultat

Ressources

Prochains rendez-vous

Prochains cours

22 octobre : eCampus – Choisir et analyser un outil d'évaluation

4 novembre : Soutenir la compréhension partagée (avec Manon Goosse)