
caneta na mão

CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA DE BIRIGUI-SP



AMOSTRA GRÁTIS

Experimente antes de comprar

Um assunto completo da apostila + as questões reais desse assunto com gabarito comentado

Enfermeiro 30h e ESF | **Prefeitura de Birigui-SP**

AMOSTRA DO KIT ENFERMEIRO

1 assunto completo de Específicos	**6** questões reais da banca ACCESS	**100%** com gabarito comentado

Edital 220/2026 · Banca Instituto ACCESS
Material independente

DATA DA PROVA
14/02/2027

O que tem nesta amostra

1. **O sumário da apostila**, para você ver tudo o que o kit cobre: Português, Raciocínio Lógico, Conhecimentos Gerais e Específicos, na ordem do edital.

2. **Um assunto completo**: Imunização: calendário, rede de frio e cuidados, exatamente como está na apostila, com o quadro “O que cai e quanto cai”, as tabelas, “Como a ACCESS cobra” e as caixas “Meu resumo” e “Meus erros”.

3. **As 6 questões reais** desse assunto, tiradas de provas de Enfermeiro da banca Instituto ACCESS, e o **gabarito comentado** de cada uma.

Faça as questões depois de ler a teoria e corrija pelo gabarito. Se gostar do jeito de estudar, o kit completo tem 44 assuntos e 420 questões.

caneta na mão

SUMÁRIO

O que tem neste volume

Conteúdo do edital	O que vai cair, item por item, com o assunto da apostila onde ele está	4
Como usar	O ciclo de cada assunto, as revisões e a ordem de estudo	7
Parte 1 · Língua Portuguesa	10 assuntos · Interpretação, gramática, coesão, semântica e ortografia, do que mais cai para o que menos cai.	9
Parte 2 · Raciocínio Lógico e Matemático	11 assuntos · Lógica, sequências, porcentagem e toda a matemática do edital, com exemplos resolvidos.	45
Parte 3 · Conhecimentos Gerais	9 assuntos · Birigui, São Paulo, Brasil e mundo: atualidades até outubro de 2026 e história.	71
Parte 4 · Conhecimentos Específicos	14 assuntos · SUS, redes, Atenção Primária, SAE, procedimentos, saúde da criança e da mulher, crônicas, vigilância, imunização, urgência, segurança, gestão e ética.	91

44 assuntos
cobrindo o edital inteiro

17 provas de Enfermeiro
da banca ACCESS (2022–2026)

Questões resolvidas
passo a passo, uma por assunto

Meu resumo e Meus erros
em todos os assuntos

Use junto com o **Caderno de Questões** (420 questões reais da ACCESS, na mesma ordem desta apostila, com gabarito comentado). Os números do "Agora pratique" são as questões do Caderno.

Material independente, sem vínculo com a Prefeitura de Birigui ou com o Instituto ACCESS. Confira sempre o edital oficial e suas retificações. Atualidades até outubro de 2026.

10 Imunização: calendário, rede de frio e cuidados

OS DOIS CARGOS

O QUE CAI E QUANTO CAI

No edital: ENF. 30h item 4.4 — imunização e rede de frio · ESF item 4.2 — imunização.

Nas provas da ACCESS: [redacted] **caiu em 29% das provas** (5 de 17 provas de Enfermeiro analisadas) · 6 questões no Caderno

O que mais cai dentro do assunto: calendário da criança (vacinas aos 2 meses) · **dTpa na gestante** · **rede de frio** · reação local (compressa fria) · cuidados e falsas contraindicações · HPV.

★ DICA O calendário muda quase todo ano. Esta tabela segue a **Instrução Normativa do Calendário Nacional de Vacinação 2026** (Ministério da Saúde). Questões de provas antigas podem cobrar o calendário do ano em que foram aplicadas (ex.: VOP, pneumo 10). Na sua prova vale o calendário em vigor na data do edital.

1. Calendário da criança (2026)

Idade	Vacinas
Ao nascer	**BCG** (dose única, intradérmica) · **Hepatite B** (idealmente nas primeiras 12 horas, ainda na maternidade)
2 meses	**Pentavalente** (1ª) · **VIP** (1ª) · **Rotavírus** (1ª) · **Pneumocócica** (1ª; em transição da VPC10 para a **VPC20**)
3 meses	Meningocócica C (1ª)
4 meses	Pentavalente (2ª) · VIP (2ª) · Rotavírus (2ª) · Pneumocócica (2ª)
5 meses	Meningocócica C (2ª)
6 meses	Pentavalente (3ª) · VIP (3ª) · Influenza (anual, a partir de 6 meses) · Covid-19 (1ª)
7 meses	Covid-19 (2ª)
9 meses	**Febre amarela** (1ª) · Covid-19 (3ª, conforme a vacina)
12 meses	**Tríplice viral (SCR)** (1ª) · Pneumocócica (reforço) · **Meningocócica ACWY** (reforço)
15 meses	**DTP** (1º reforço) · **VIP** (reforço) · **Hepatite A** · **Tetraviral (SCRV)**
4 anos	DTP (2º reforço) · **Varicela** (2ª dose) · Febre amarela (reforço)
9 a 14 anos	**HPV quadrivalente: dose única**

Pentavalente = difteria, tétano, coqueluche, *Haemophilus influenzae* b e hepatite B. **VIP** = poliomielite inativada (injetável); a VOP (gotinha) saiu da rotina. **Rotavírus**: 1ª dose até 3 meses e 15 dias; 2ª até 7 meses e 29 dias. Febre amarela e tríplice viral em menores de 2 anos **não** devem ser aplicadas no mesmo dia (intervalo de 30 dias).

2. Adolescentes, adultos, idosos e gestantes

Grupo	Vacinas
Adolescente	HPV (9–14 anos, dose única) · **Meningocócica ACWY** (11–14 anos) · conforme situação vacinal: hepatite B (3 doses), dT, SCR (2 doses), febre amarela
Adulto (20–59)	Hepatite B (3 doses) · **dT a cada 10 anos** · febre amarela · SCR: 2 doses até 29 anos, 1 dose de 30 a 59 anos
Idoso (60+)	**Influenza anual** · **Covid-19 a cada 6 meses** · dT · hepatite B · pneumocócica 20 (acamados/institucionalizados de 60 a 84 anos; todos a partir de 85)
Gestante	**dTpa a partir da 20ª semana**, em cada gestação (antes: 27ª a 36ª, que ainda aparece em gabarito antigo) · **VSR (vírus sincicial respiratório) a partir da 28ª semana**, em cada gestação · hepatite B (conforme situação vacinal) · influenza · covid-19. Se não vacinou na gestação: dTpa e influenza até 45 dias após o parto

⚠ **PEGADINHA** Gestante **não** recebe vacinas de vírus vivo (tríplice viral, varicela, febre amarela salvo situação excepcional de alto risco). **HPV**: pessoas imunossuprimidas e vivendo com HIV têm esquema ampliado; a vacina não cobre todos os tipos de HPV, por isso o rastreamento do colo continua.

3. Rede de frio

- Conservação na sala de vacinas: **+2 °C a +8 °C**, ideal **+5 °C** (preferencialmente em câmara refrigerada).
- Leitura e registro da temperatura no **início e no fim do expediente**, com termômetro de máxima e mínima, no mapa diário.
- Nada na porta do refrigerador. Vacinas **não** podem ser congeladas na sala de vacinas.
- Caixa térmica de uso diário: também +2 °C a +8 °C, com bobinas reutilizáveis **ambientadas** (climatizadas).
- Queda de energia: manter o equipamento fechado, monitorar e seguir o plano de contingência (caixas térmicas). Vacina exposta a temperatura fora da faixa: **não descartar por conta própria**, isolar, manter em +2 a +8 °C e notificar a queixa técnica.

4. Cuidados, contraindicações e eventos adversos

Situação	Conduta
Contraindicação verdadeira	Anafilaxia a dose anterior ou a componente da vacina. Vacinas vivas: imunodeprimidos e gestantes (regra geral)
Adiar	Doença febril aguda moderada ou grave; uso recente de imunoglobulina/hemoderivados (vacinas vivas)
Falsas contraindicações (vacinar!)	Resfriado, diarreia leve, uso de antibiótico, desnutrição, prematuridade (exceto situações específicas), alergias não relacionadas, história familiar de convulsão
Antitérmico/analgésico	**Não** se recomenda uso profilático de rotina antes da vacina
Reação local (dor, vermelhidão, inchaço)	Esperada: **compressa fria** nas primeiras 24–48 h (exceto BCG: não colocar nada na lesão); analgésico se necessário
ESAVI	Evento supostamente atribuível à vacinação ou imunização (antigo EAPV): notificar; os graves, imediatamente

◎ **COMO A ACCESS COBRA**

- "Aos 2 meses o lactente recebe...".
- Período da dTpa na gestante.
- V ou F de rede de frio.
- Caso de reação local e "assinale a INCORRETA" sobre cuidados.

Questão 374 do Caderno · ACCESS · Estrela Dalva/MG · Enfermeiro · 2025

Conforme o Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde, a imunização de rotina de um lactente saudável na faixa dos 2 meses de idade inclui a administração de quais vacinas?

A. Pentavalente (2ª dose), VOP (1ª dose), Meningocócica C (1ª dose) e DTP (1ª dose).
B. Pentavalente (1ª dose), VIP (1ª dose), Pneumocócica 10 (1ª dose) e Rotavírus (1ª dose).
C. BCG (dose única ao nascer) e Hepatite B (dose ao nascer).
D. Febre Amarela (dose inicial), Tríplice Viral (1ª dose) e Hepatite A (1ª dose).

Resolvendo passo a passo

1. Aos **2 meses**: pentavalente, VIP, rotavírus e pneumocócica, todas na **1ª dose**.
2. A erra a dose da penta e mistura meningo C (que é aos 3 meses) e VOP. C são as vacinas do nascimento. D são vacinas de 9, 12 e 15 meses.
3. Resposta B (a prova é de 2025, quando a pneumocócica era a 10-valente; em 2026 está em transição para a VPC20, mas a resposta continua a mesma).

Resposta: B

✎ MEU RESUMO (com minhas palavras — só o que eu esqueceria)

× MEUS ERROS (anote toda questão que errar e a regra certa)

Questão nº	Por que errei	Regra certa

▶ AGORA PRATIQUE Caderno de Questões · faça da 374 à 379 (6 questões)

Provas de Enfermeiro da ACCESS · 374 a 379

☐ 374 ☐ 375 ☐ 376 ☐ 377 ☐ 378 ☐ 379

Marque ✓ se acertou e × se errou (acerto no chute = ×). Corrija pelo gabarito comentado no fim do Caderno.

Questões de outros assuntos: disponíveis no kit completo.

10 Imunização: calendário, rede de frio e cuidados

questões 374–379
caiu em 29% das provas

374 Estrela Dalva/MG · 2025 · Enfermeiro

Conforme o Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde, a imunização de rotina de um lactente saudável na faixa dos 2 meses de idade inclui a administração de quais vacinas?

A) Pentavalente (2ª dose), VOP (1ª dose), Meningocócica C (1ª dose) e DTP (1ª dose).
B) Pentavalente (1ª dose), VIP (1ª dose), Pneumocócica 10 (1ª dose) e Rotavírus (1ª dose).
C) BCG (dose única ao nascer) e Hepatite B (dose ao nascer).
D) Febre Amarela (dose inicial), Tríplice Viral (1ª dose) e Hepatite A (1ª dose).

375 Rodeiro/MG · 2025 · Enfermeiro 25h

A Rede de Frio é fundamental para garantir a imunogenicidade dos imunobiológicos ofertados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). Falhas na conservação podem inutilizar lotes inteiros de vacinas, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:
(__) A temperatura ideal para conservação de vacinas na instância local (sala de vacinas), em refrigeradores do tipo doméstico ou câmaras refrigeradas, deve ser mantida entre +2°C e +8°C, sendo +5°C o alvo ideal.
(__) As vacinas vivas atenuadas (como a Tríplice Viral e VOP) são estritamente proibidas de sofrerem congelamento, devendo ser armazenadas nas prateleiras inferiores ou na porta do refrigerador para evitar temperaturas negativas.
(__) A leitura e o registro da temperatura devem ser realizados, no mínimo, duas vezes ao dia (início e final do expediente), utilizando termômetro de momento, máxima e mínima, registrando-se os dados no mapa de controle diário.
(__) Em caso de queda de energia elétrica, o refrigerador deve permanecer fechado e a temperatura monitorada; caso a temperatura ultrapasse +8°C ou caia abaixo de +2°C, os imunobiológicos devem ser acondicionados em caixas térmicas com bobinas de gelo reciclável climatizadas, conforme plano de contingência. Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

A) V, V, V, F.
B) V, F, V, V.
C) F, V, F, V.
D) V, F, F, V.

376 Cataguases/MG · 2024 · Enfermeiro

Vacinar-se contra o HPV é a medida mais eficaz de se prevenir contra a infecção. Assinale a alternativa correta em relação à vacina contra o HPV.

A) É contraindicada para mulheres e homens que vivem com HIV.
B) É contraindicada para pacientes oncológicos.
C) A vacina não previne infecções por todos os tipos de HPV.
D) Não tem eficácia em pacientes renais crônicos.

377 Itaguara/MG (Ed. 03) · 2024 · Enfermeiro

Um enfermeiro que atua em campanhas de vacinação precisa estar ciente das contraindicações e dos cuidados durante a aplicação dos imunobiológicos. Considerando os cuidados na administração de vacinas, assinale a alternativa INCORRETA.

A) O uso de analgésicos profiláticos é recomendado em todas as vacinas para prevenir dor local.
B) A aplicação de vacinas em pacientes com febre deve ser adiada até a resolução do quadro.
C) A vacina tríplice viral é contraindicada em gestantes.
D) Pacientes com imunodeficiência severa não devem receber vacinas com vírus vivos atenuados.

378 São João do Ivaí/PR · 2024 · Enfermeiro

A vacina dTpa protege a gestante e o bebê contra o tétano, difteria e coqueluche. Assinale a alternativa quanto ao período em que a gestante deverá tomar a vacina dTpa:

A) Até a 3ª semana.
B) Entre a 12ª e a 20ª semana.
C) Após a 36ª semana.
D) Entre a 27ª e a 36ª semana.

379 São João do Ivaí/PR · 2024 · Enfermeiro

Maria, chega à Unidade Básica de Saúde (UBS) de seu bairro, levando em seu colo sua filha com 03 (três) meses de idade. Relata a queixa da criança, que apresenta vermelhidão e inchaço na coxa, 24 horas após receber a Vacina Meningocócica C. Mediante o exposto, assinale a orientação que Maria deverá receber.

A) Aplicar compressa fria no local da vacina, levemente, durante 10 a 20 minutos.
B) Orientar que a criança seja encaminhada imediatamente para a avaliação médica.
C) Prescrever pomada cicatrizante.
D) Aplicar compressa quente no local da vacina durante 30 minutos.

Questões de outros assuntos: disponíveis no kit completo.

Gabarito comentado

374. B Aos 2 meses o calendário prevê: Pentavalente (1ª), VIP (1ª), Pneumocócica 10 (1ª) e Rotavírus (1ª). BCG e Hepatite B são ao nascer; Febre Amarela aos 9 meses; Tríplice Viral aos 12 meses.

375. B V: conservar entre +2 °C e +8 °C, ideal +5 °C. F: a VOP pode ser congelada nas instâncias superiores, e nada se guarda na porta do refrigerador. V: ler a temperatura no início e no fim do expediente. V: em queda de energia, manter fechado e seguir o plano de contingência com caixas térmicas.

376. C A vacina HPV (quadrivalente) não cobre todos os tipos de HPV, por isso o preventivo continua necessário. Pessoas com HIV e pacientes oncológicos são grupos prioritários para ela.

377. A Pede a INCORRETA: não se recomenda analgésico profilático de rotina antes de vacinas. As outras afirmações estão certas: adiar em febre moderada ou alta, tríplice viral contraindicada na gestação e vírus vivo contraindicado na imunodeficiência grave.

378. D O gabarito usou a recomendação antiga (27ª a 36ª semana). ⚠ *Hoje o Ministério da Saúde recomenda a dTpa a partir da 20ª semana de cada gestação (até 45 dias após o parto, se não tomou). Na sua prova, procure a alternativa com a regra vigente.*

379. A Dor, vermelhidão e inchaço locais após vacina são reação local esperada. A conduta é compressa fria por 10 a 20 minutos, várias vezes ao dia, nas primeiras 24 a 48 h.

Gostou? Este é o kit completo

- **Apostila completa** (142 páginas): os 44 assuntos do edital, com o que mais cai na banca ACCESS e questões resolvidas passo a passo.
- **Caderno de Questões**: 420 questões reais, separadas por assunto, na mesma ordem da apostila, todas com gabarito comentado.
- **Bônus**: edital verticalizado em checklist + roteiro da última semana e do dia da prova.
- Feito para os cargos **Enfermeiro 30h** e **Enfermeiro ESF** da Prefeitura de Birigui (dá para fazer as duas provas), com SUS, PNAB, SAE, vacinação, urgência e Código de Ética. Acesse pelo celular, tablet ou imprima.

Prova em 14/02/2027. Garanta o seu material pelo link onde você baixou esta amostra.