ตารางการใช้ยาในเด็กแบ่งตามอายุ หรือน้ำหนัก(ยารับประทาน)

ยา	ขนาดที่แนะนำ	เทียบเท่า	ขนาดการใช้ยา (ml/dose)ตาม BW(kg)			
			5	10	15	20
Albendazole 200 mg/5ml.	1ปี- <2ปี = 200 mg, ครั้งเดียว	5ml./dose, ครั้งเดียว				
	≥2 ปี = 400 mg, ครั้งเดียว	10ml/dose, ครั้งเดียว				
Alummilk (antacid®) (Al/Mg/Simeth.)	0.5-1 ml/kg/dose(max30ml)		2.5-5	5-10	7.5-15	10-20
Amoxycillin Syr 125mg/5ml.	20-40 MKD, tid	0.27-0.54ml./kg/dosex3	1.35-2.70	2.7-5.4	4.05-8.10	5.4-10.8
Amoxi/Clav Syr 200+28.5mg/5ml.	40 MKD, tid	0.5ml./kg/dosex3	2.5	5	7.5	10
Chlopheniramine Syr 2mg/5ml.	0.35 MKD, tid	0.29m.l/kg/dosex3	1.45	2.9	4.35	5.80
Co-trimoxzole)(40mgT/200mgS(Bactrim®)	6-12mg of T/kg/day, bid	0.38-0.75ml./kg/dose,bid	1.9-3.75	3.8-7.5	5.7-11.25	7.6-15
Cephalexin syr. 125mg/5ml.	25-50 MKD, q 6-8 hr.	0.25-0.5 ml/kg/dosex4	1.25-2.5	2.5-5.0	3.75-7.5	5.0-10.0
Dopmeridone Syr 5 mg/5ml.	0.2-0.4 MKdose tid ac	0.2-0.4ml./kg/dosex3	1-2	2-4	3-6	4-8
Erythromycin syr. 125mg/5ml.	20-50 MKD, qid	0.2-0.5ml./kg/dosex4	1-2.5	2-5	3-7.5	4-10
Ferrous sulphate (Pediron®) 50mg/0.6ml. (eqivalaent iron 15 mg)	Prophylaxis : 6 mo- 12 yr: 1-2MKdose OD	0.04-0.08ml./kg/dose,OD	0.2-0.4	0.4-0.8	0.6-1.2	0.8-1.6
	Treatment : 6 mo-2yr : 3 MKdose, 2-12 yr : 3-6 MKdose, tid	0.08ml./kg/dosex3	0.4	0.8	1.2	1.6
Glyceryl Guaiacclate 100mg/5ml	**ขนาดยาตามอายุ** : [อายุต่ำกว่า 2 ปี = 0.125-0.25ml/kg/dose], [2-6 ปี = 2.5 ml./dosex4] [6-12 ปี = 5 ml./dosex4], [>12 ปี = 10 ml./dosex4]					
Hyoscine-N-butylBr. 5mg/ml(Buscopan®	ส่วนใหญ่แนะนำในเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป/กินต่อครั้งตามอายุดังนี้ 1-12เดือน =2.5ml., 1-3ปี= 5 ml., 3-6 ปี = 5-10 ml., >6 ปี = 10-20ml					
Ibuprofen Syr 100mg/5ml.	5-10 MKdose, tid(MAX:40MKD)	0.25-0.5ml./kg/dosex3	1.25-2.5	2.5-5	3.75-7.5	5-10
M.Carminative	[เด็ก 5-15ml/dose, tid, qid)][ผู้ใหญ่ 15-30ml/dose, tid หรือqid)]					
Milk of magnesia 1.2gm/15ml.	**ขนาดยาตามอายุ** : [อายุต่ำกว่า 2 ปี = 0.5ml/kg/dose, hs/ตื่นนอนตอนเช้า][2-5 ปี = 5-15 ml./dose, hs/ตื่นนอนตอนเช้า] [6-12 ปี = 15-30 ml./dose, hs/ตื่นนอนตอนเช้า], [>12 ปี = 30-60 ml./dose, hs/ตื่นนอนตอนเช้า]					
MTV Syr.	5-10 ml/day, OD หรือ bid					
Paracetamol Syr 120mg/5 ml.	10-15 MKdose, q6 hr	0.41-0.62 ml./kg/dosex3	2.1-3.1	4.1-6.2	6.1-9.3	8.2-12.4
Salbutamol Syr. 2mg/5ml.	0.1 MKdose,(MAX: 2 mg) q 6 hr	0.25 ml./kg/dosex4	1.25	2.5	3.75	5.0
Sodium Bicarbonate 50 mg/ml.	**ขนาดยา** : ใช้ป้อนทารกและเด็กหลังอาหาร หรือเมื่อมีอาการ ไม่ควรให้เกินวันละ 6 ครั้ง (ทารกแรกเกิดถึง 1 เดือน ไม่ควรใช้) [อายุน้อยกว่า 6 เดือน = 5 ml.][อายุ 6-12 เดือน = 10 ml.] [อายุ 2-3 ปี = 10-15-ml.]					
Tamiflu syr.	อายุ < 3 เดือน : 12 mg/dose bid, 3-5 เดือน : 20 mg/dose bid, 6-11 เดือน : 25 mg/dose bid					

ตารางการใช้ยาในเด็กแบ่งตามอายุ หรือน้ำหนัก(ยารับประทาน)

	อายุ > 1 ปี น้ำหนักแบ่งตามน้ำหนัก < 15 kg 30 mg/dose bid, >15-23 kg : 45 mg/dose bid, >23-40 kg : 60 mg/dose bid, >40 kg : 75 mg/dose bid