(2NRTIs + NNRTIs หรือ 2-3NRTIs+PIs หรือ INSTIs ให้ตามเงื่อนไขในตาราง)

		ชื่อสามัญ	Dose	แนะนำเพิ่มเติม
NRTIs ใช้ 2 ตัว หรือ 3 ตัวกรณีเดี่ยยา **ระวังยา combined	☐	ZIDOVUDINE (AZT 100MG)	☐ <50kg : 200mg q12hr ☐ ≥50kg : 300mg q12hr	CrCl<10 : ปรับขนาดยา : 100 mgq8h or 300 mgq24h
	☐	LAMIVUDINE (3TC 150MG)	☐ 150mg q12hr or ☐ 300mg q24hr	CrCl30-49 : 150mgq24h CrCl10-29 : 100mgq24h CrCl<10 : 25-50mgq24h
	☐	TENOFOVIR Disoproxil Fumarate (TDF 300MG)	300 mg q24hr	CrCl30-49 : 300mgq48h CrCl10-29 : 300mg สัปดาห์ละ2 ครั้ง CrCl<10 : ไม่แนะนำ HD : 300 mgq7วัน
	☐	TENOFOVIR Alafenamide (TAF 25MG)	25 mg q24hr	CrCl<15, HD : ห้ามใช้
	☐	ABACAVIR (ABC 300MG)	☐ 300mg q12hr ☐ 600mg q24hr	
	☐	TDF300/FTC200 --TENO-EM (ระวัง!!combined) 2NRTIs	1 tab q24hr	CrCl 30-49 : 1tab q48hr CrCl <30, HD : ห้ามใช้***
	☐	ABC600/3TC300 --ALACOVIR (ระวัง!!combined) 2NRTIs	1 tab q24hr	CrCl<50 : ห้ามใช้***
	☐	AZT300/3TC150 --ZILARVIR (ระวัง!!combined) 2NRTIs	1 tab q12hr	CrCl<50 : ห้ามใช้***
ใช้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตามสูตรที่ต้องใช้ร่วมกับ NRTIs		**NNRTIs**		
	☐	RILPIVARINE (RPV25MG)	25mg q24hr	
		PIs (ระวัง!! ยากลุ่มนี้ต้อง boosted ด้วย RTV ทุกครั้ง ยกเว้น ATV400mg)		
	☐	ATAZANAVIR (ATV 200MG) **สิทธิปกส	☐ATV 400mg q24hr (ไม่ต้อง+ RTV)	HD : กรณี Naïve: ATV/r 300/100mg q24hr (กรณีเคยได้ ARV มาก่อน : ไม่แนะนำทั้ง ATV, ATV/r
	☐	DARUNAVIR (DRV 600MG)	☐ 600mg q12hr (+RTV 100mg q12hr) ☐ 800mg q24hr (+RTV 100mg q24hr) ☐ 900mg q24hr (+RTV 100mg q24hr)	
	☐	RITONAVIR (RTV 100MG)	☐ 100mg q24hr ☐ 100mg q12hr ☐ 50mg q12hr	
ใช้ตามเงื่อนไขที่ระบุ		**INSTIs**		
	☐	DOLUTEGAVIR (DTG 50MG)	☐ 50mg q24hr ☐ Coadministered with Phenytoin, EFV, Rifam : 50mg q12hr ให้ต่อหลัง off ยา 2 week	กรณี ☐☐2NRTIs + DTG ☐☐High DR : 0-3 NRTIs + PIs + DTG ☐☐High risk ตั้งครรภ์ : 2NRTIs + PIs or NNRTIs + DTG หรือ 2NRTIs + DTG
เม็ดรวมยา 3 ตัว		**Fixed Dose Combination**		
	☐	KOCITAF (DTG50/FTC200/TAF25)	1 tab q24hr	
	☐	GPOvir-T UC, ปกส (FTC200/TDF300/EFV600)	1 tab q24hr	CrCl<50 : ห้ามใช้
	☐	TEEVIR (FTC200/TDF300/EFV600)	1 tab q24hr	CrCl<50 : ห้ามใช้
	☐	ACRIPTEGA (TDF300/3TC300/DTG50) --TLD	1 tab q24hr	CrCl<50 : ห้ามใช้