แนวทางการบริหารยาในผู้ป่วยทำ Hemodialysis

ยา และ ขนาดยา	แนวทางการบริหารยา
ยาต้านจุลชีพที่ปรับขนาดให้วันละครั้ง และไม่มี extra dose	
Amoxycillin: 250-500 mg po q24h	**ยารับประทาน :** ปรับเวลาบริหารยาเป็น hs
Cefixime: 200 mg po q24h	
Norfloxacin: 400 mg po q24h	
Ofloxacin: 200 mg po q24h	
Clarithromycin: 500 mg po q24h	
Ethambutol: 15-20 mg/kg/day - 3 times/wk	**ยา TB :** ให้บริหารยาก่อนนอน ในวันที่ฟอกไต
Pyrazinamide: 20-30 mg/kg/day - 3 times/wk	
Meropenem: 0.5-1 g IV q24h	**ยาฉีด :** ให้ยาตามวงรอบ วันฟอกไต เลื่อนเวลามาให้หลังฟอกไต และตั้งวงยารอบใหม่ตามเวลาหลังฟอกไต เช่น ปกติให้ยาเวลา 10.00 น. วันฟอกไต เลื่อนไปให้ยาหลังฟอกไต แล้วตั้งวงรอบใหม่ตามเวลาให้ยาหลังฟอก เช่น รอบ 1 = 12.00 น., รอบ 2 = 18.00 น., รอบ 3 = 22.00 น.
Ciprofloxacin: 200-400 mg IV q24h	
Ceftaz/Avi: 0.94 g IV q48h	
Fosfomysin: 2 g IV q48h	
Levofloxacin: 750 mg once, then 500 mg q48h	
ยาต้านจุลชีพที่ปรับขนาดให้บ่อยกว่าวันละครั้ง และไม่มี extra dose	
Ampicillin: 1-2 g IV q12h	ให้ยาตามวงรอบปกติ โดยให้มีอย่างน้อย 1 dose หลังฟอกไต ถ้าวงรอบปกติตรงกับเวลาฟอกไต ให้เลื่อน dose นั้นมาให้หลังฟอกไต
Penicillin G: 0.5-4 mU IV q12h	
Sulperazone: 500 mg IV q12h	
Cephalexin: 250 mg po q12h	
Metronidazole: 7.5 mg/kg q12h	
AZT (Zidovudine): 100 mg q8h	
ยาต้านจุลชีพที่ปรับขนาด และมี extra dose	
Tazocin: 2.25 g IV q8h (+ extra 0.75 g AD)	ให้ยาตามวงรอบปกติ และให้ยา extra dose หลัง HD ทันที ถ้าวงรอบปกติตรงกับเวลาฟอกไต ให้เลื่อน dose นั้นมาให้หลังฟอกไต โดยให้ยาในขนาดปกติ + extra dose ถ้าวงรอบปกติเป็นเวลาเดียวกับหลังฟอกไต หรือใกล้กันไม่เกิน 1 ชั่วโมง ให้ยาในขนาดปกติ + extra dose
Augmentin: 250-500 mg Amox po q24h (+ extra AD)	
Cefazoin: 1 g IV q24h (+extra 0.5-1 g AD)	
Cefotaxime: 2 g IV q24h (+ extra 1 g AD)	
Ceftazidime: 1-2 g IV q24-48h (+ extra 1 g AD)	
Amikacin: 7.5 mg/kg IV q48h (+ extra 3.75 mg/kg AD)	
Gentamycin: 1.7-2.0 mg/kg IV q48h (+ extra 0.85-1.0 mg/kg AD)	
Ertapenem: 0.5 g IV q24h **(+ extra 150 mg AD, if dose within 6 h prior to HD)**	ให้ยาตามวงรอบปกติ ถ้าให้ยาก่อนฟอกไตไม่ถึง 6 ชม. ให้เพิ่มยา extra dose หลัง HD 150 mg ถ้าวงรอบปกติตรงกับเวลาฟอกไต ให้เลื่อน dose นั้นมาให้หลังฟอกไตในขนาดปกติ
ต้านจุลชีพที่ปรับขนาดและมีวิธีการบริหารพิเศษอื่น ๆ	
Colistin: **Non-dialysis day:** 150 mg q24h **Dialysis day:** 200 mg AD	ให้ยาตามวงรอบปกติ ถ้าเวลาให้ยาปกติอยู่ก่อนฟอกไต วันฟอกไตให้เลื่อนเวลามาให้หลังฟอกไต
Fluconazole: **Non-dialysis day:** 50% reduction **Dialysis day:** full dose AD	
Imipenem: 500 mg IV q12h **(Administration AD and at intervals timed from the end of that HD session)**	ให้ยาหลังฟอกไต แล้วตั้งวงรอบใหม่ตาม interval เดิม
Oseltamivir: **Non-dialysis day:** no drug **Dialysis day:** 30 mg after each dialysis	ให้ยาเฉพาะวันที่ฟอกไต หลังฟอกไต
Vancomycin: LD: 15-20 mg/kg หรือ 25-30 mg/kg (max 2 g) then 500-1,000 mg or 5-10 mg/kg **only on HD day give after HD**	
ยาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ยาต้านจุลชีพ	
ยาลดความดัน Methydopa: 250-800 mg po q12-24h Captopril: 50% ของขนาดยาปกติ po q24h Atenolol: 25 mg po q24h **ยาโรค gout** Allopurinol: 100 mg po q48h เพิ่มยาได้ถึง 300 mg/day	**ยารับประทาน :** ปรับเวลาบริหารยาเป็น hs หรือ ถ้าให้ยามากกว่าวันละ 1 ครั้ง ให้ dose สุดท้ายของวันเป็น hs