1. สำหรับเด็ก

☐ **1. เด็กที่รับประทานยาน้ำ** BSA(m^2) = (4BW+7)/(BW+90) BSA : Body surface area (m^2) BW : Body weight (kg)

AZT syrup (10mg/ml) .....ซีซีq 12 hr (dose : 180 mg/m^2 q 12 hr) +

3TC syrup (10mg/ml) .....ซีซี q 12 hr (dose : 4 mg/kg q 12 hr) +

Dolutegravir dispersible 10mg/tab ใช้ในเด็ก ≥1เดือน, BW ≥3kg

น้ำหนัก	ขนาดยาDTGdispersible	วิธีผสม
3 – 5.9 kg	5 mg **q24hr**	ยา ½ เม็ด ผสมน้ำเปล่า 5 ซีซี กิน 5 ซีซีวันละ 1 ครั้ง
6 - 9.9 kg	15 mg **q24hr**	ยา 1½ เม็ด ผสมน้ำเปล่า 5 ซีซี กิน 5 ซีซีวันละ 1 ครั้ง
10 – 13.9 kg	20 mg **q24hr**	ยา 2 เม็ด ผสมน้ำเปล่า 10 ซีซี กิน 10 ซีซีวันละ 1 ครั้ง
14 – 19.9 kg	25 mg **q24hr**	ยา 2½ เม็ด ผสมน้ำเปล่า10 ซีซี กิน 10 ซีซีวันละ 1 ครั้ง
≥ 20 kg	* 30 mg **q24hr**	ยา 3 เม็ด ผสมน้ำเปล่า 15 ซีซี กิน 15 ซีซีวันละ 1 ครั้ง

* ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถกลืนยาเม็ด DTG(50) โดยDTGdispersible(10) 3 tab = DTGtablet(50) 1 tab

2. เด็กที่สามารถรับประทานยาเม็ดได้

☐ **2.1 เด็ก น้ำหนัก 14≤ BW< 20 kg :**

AZT(100) 1 เม็ด q12hr + 3TC(150) 1 เม็ด **q24hr**+ DTG dispersible(10) 2 ½ เม็ด **q24hr** (วิธีผสม DTG(10) 2 ½ เม็ด ผสมน้ำเปล่า 10 ซีซี กิน 10 ซีซี)

☐ **2.2 เด็ก น้ำหนัก 20≤ BW< 25 kg :**

AZT(100) 2 เม็ด q12hr+ 3TC(150) 1 ½ เม็ด **q24hr**+ **DTG (50) 1 เม็ด **q24hr**

☐ **2.3 เด็ก น้ำหนัก 25≤ BW< 35 kg :**

AZT(100) 2 เม็ด q12hr+ 3TC(150) 2เม็ด **q24hr**+**DTG (50) 1 เม็ด **q24hr**

หมายเหตุ - หลีกเลี่ยงยาที่มีประจุ 2+ เช่น antacid, Calcium, Zinc, Fe หรือยาที่มีส่วนผสมดังกล่าว ร่วมภายใน 6 ชั่วโมง

- **กรณีไม่สามารถกลืนเม็ด DTG(50) สามารถใช้ชนิดละลายน้ำ DTGdispersible(10) แทนได้ โดยDTGdispersible(10) 3 tab = DTGtablet(50) 1 tab

2. สำหรับผู้ใหญ่ และเด็กน้ำหนัก ≥35 กิโลกรัม

☐ **TLD** (TDF300/3TC300/DTG50) 1 เม็ด **q24hr**

☐ **(กรณีมีปัญหาไต CrCl<50มล/นาที)** AZT(100) **3tab** q12hr + DTG(50) 1tab **q24hr** + **3TC(150) ปรับขนาดตาม CrCl**

หมายเหตุ หลีกเลี่ยงยาที่มีประจุ2+ เช่น Antacid(Al), Calcium, Zince, Fe หรือยาที่มีส่วนผสมดังกล่าว ร่วมภายใน 6 ชั่วโมง