ขนาดยาที่ใช้บ่อยในเด็ก โรงพยาบาลมหาสารคาม

จัดทำโดย งานวิชาการเภสัชสนเทศ โรงพยาบาลมหาสารคาม ฉบับปรับปรุง ปี 2568

ชื่อยา	ความแรง	Normal dosage	แบ่งให้	น้ำหนัก(kg)/ช้อนชา/เม็ด							
Anti-microbial agent				5	8	10	13	15	18	20	25
Amoxicillin	250 mg/5 ml	Neonates & Infants ≤ 3 เดือน: 15 mg/kg	q 12 h	¼	½	½	¾	1	1	1	1 ½
		Infants >3 เดือน & Children: 20-40 mg/kg/day	q 8 h	¼	½	½	¾	1	1	1 ¼	1 ½
		Acute otitis media 80-90 mg/kg/day	q 12 h	1	1 ¼	1 ½	2	2 ½	2 ¾	3 ¼	4
Amoxicillin + Clavulonic acid	457 mg/5 ml (=400 AMX)	Neonate: 25 mg/kg (of Amoxicillin)	q 8 hr	¼	½	¾	¾	1	1	1 ¼	1 ½
		Sinusitis: 45 mg/kg/day (of Amoxicillin)	q 12 h	¼	½	½	¾	¾	1	1	1 ½
		Otitis Media: 90 mg/kg/day (of Amoxicillin)	q 12 h	½	1	1	1 ½	1 ¾	2	2 ¼	2 ¾
Dicloxacillin	62.5 mg/5 ml	<40 kg: 25-50 mg/kg/day	q 6 h	½	1	1	1 ½	1 ½	2	2	2 ½
		>40 kg: 125-500 mg/dose		125-500 mg (max: 2 g/day)							
Azithromycin	200 mg/5 ml	5*-12 mg/kg/day	q 24 h	¼	¼	½	½	½	1	1	1
Erythromycin	125 mg/5 ml	30-50 mg/kg/day [Max : 2 g/day]	q 6-12 h	½	1	1	1 ½	2	2	2	2
Cephalexin	125 mg/5ml	25-100 mg/kg/day [Max : 4 g/day]	q 6-8 h	¾	1	1	1	1	2	2	2
Cefixime	100 mg/5 ml	8 mg/kg/day	q 12 h	1 ml	2 ml	2 ml	3 ml	3 ml	4 ml	4 ml	5 ml
Co-trimoxazole	200 mg/ 5 ml	6-10 mg/kg/day TMP	q 12 h	¼	¼	½	½	½	1	1	1 ¼
		Severe**: 15-20 mg/kg/day TMP	q 6-8 h								
Metronidazole	40 mg/ml	10-30 mg/kg/day [Max : 4 g/day]	q 6 h	¾	1 ½	1 ½	2	2 ½	2 ½	3	3 ½
Clindamycin	20 mg/ml	8-40 mg/kg/day	q 6-8 h	½	½	½	½	½	½	1	1
	75 mg/ml			1 ml	1 ml	1 ml	1 ml	1 ml	1 ml	1 ml	1 ml
Ketoconazole	10 mg/ml	3.3-6.6 mg/kg/day	q 24 h	½	1	1	1½	1 ½	2	2 ½	3
Albendazole	400 mg/20 ml	Strongyloidiasis/tap worm									
		< 2 y:200 mg/day×3 day	q 24 h	2 ช้อนชา							
		> 2 y:400 mg/day×3 day		4 ช้อนชา							
		Hookworm/pinworm, roundworm									
		< 2 y: 200 mg x single dose	q 24 h	2 ช้อนชา							
		> 2 y: 400 mg x single dose		4 ช้อนชา							
Analgesics/antipyretics											
Paracetamol	120 mg/5 ml	10-15 mg/kg/dose	q 4-6 h	½	1	1	1 ½	1 ½	2	2	2 ¼
Ibuprofen	100 mg/5 ml	5-10 mg/kg/dose [max: 40 mg/kg/day]	q 6-8 h	½	½	1	1	1	1	2	2
Gastro-intestinal system											
Domperidone	5 mg/5ml	0.25 mg/kg/dose	q 8 h	¼	½	½	½	½	1	1	1 ½
Simethicone drop	40 mg/0.6 ml	ขนาดยาตามช่วงอายุ max 500 mg/day	q 6 h	< 2 y		2-12 y			> 12 y		
				20 mg/dose		40 mg/dose			40-125 mg/dose		
Hyoscine	5 mg/5 ml	> 1 y: 5-10 mg/dose	q 8 h	1-2 ช้อนชา							
Antihistamines	2 mg/5 ml	0.35 mg/kg/day	q 4-6 h	¼	½	½	¾	¾	1	1	1½
Chlorpheniramine		Urticaria 1 mg/kg/day; max 12 mg/day									
Loratadine	5 mg/5 ml	5-10 mg/day	q 24 h	2-5 y				> 6 y			
				5 mg/day				10 mg/day			
Hydroxyzine	10 mg	ขนาดยาตามช่วงอายุ	q 8 h	6 months-1 y				6-10 y			
				10-15 mg/day				20-50 mg/day			
Cough Preparations	100 mg/5ml	ขนาดยาตามช่วงอายุ	q 4 h	4-5 y			6-11 y		≥12 y		
Guaifenesin				½ - 1			1 - 2		2		
Acetylcysteine	200 mg	ขนาดยาตามช่วงอายุ	q 8-24 h	< 2 y			≥ 2-6 y		> 6 y		
				200 mg OD			200 mg BID		200 mgTID		
Bronchodilators	25 mcg/5ml	1.25 mcg/kg/dose	q 12-24 h	5kg	8kg	10kg	13kg	15kg	18kg	20kg	25kg
Procaterol [Meptin]				¼	½	½	¾	¾	1	1	1 ¼
Salbutamol	2 mg	ขนาดยาตามช่วงอายุ	q 6-8 h	< 6 y			6-12 y		> 12 y		
				0.3-0.6 mg/kg/day (max 12 mg/day)			2 mg (max 24 mg/day)		2-4 mg (max 32 mg/day)		
Lexatives	10 g/15 ml	Infants: 1.7-6.7 g/day Children: 26.7-60 g/day	q 24 h	Infants				Children			
Lactulose				1				5			

*Loading dose 10 mg/kg once daily on day 1

**Serious infection: Melioidosis, Pneumocystis pneumonia (PCP)

Ideal Body weight กรณีเด็กอ้วน : อายุ ≤ 6 ปี ใช้สูตร IBW = (อายุเป็นปี x 2) + 8
อายุ > 6 ปี ใช้สูตร IBW = [(อายุเป็นปี x 7) – 5] / 2

แหล่งอ้างอิง: Lacy C, Armstrong L, Goldman M, and Lance L. Drug information handbook with international trade name index.23rd edition. Ohio: Lexi-comp; 2014.