ตารางขนาดยาต้านวัณโรคในการบริหารยา สำหรับผู้ป่วยอายุ 15 ปี ขึ้นไปและผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง

ช่วงน้ำหนัก	Isoniazid ; INH		Rifampicin ; R		Ethambutol ; E		Pyrazinamide ; Z	
	4-6 mg/kg/day		8-12 mg/kg/day		15-20 mg/kg/day		20-30 mg/kg/day	
	Max: 300 mg/day		Max: 600 mg/day		Max: 1600 mg/day		Max: 2000 mg/day	
	ขนาดยา	**crcl≤30**	**ขนาดยา**	**crcl≤30**	**ขนาดยา**	**crcl≤30**	**ขนาดยา**	**crcl≤30**
< 35 *	ตามน้ำหนัก	ไม่ปรับ	300	ไม่ปรับ	600	ขนาดเดิม ปรับเป็น 3 times/wk	1000	ขนาดเดิม ปรับเป็น 3 times/wk
35 – 49	300		450		800		1000	
50 – 69	300		600		1000	**กรณี HD ให้ after HD only****	1500	**กรณี HD ให้ after HD only****
>70 *	300		600		1200		2000	

ช่วงน้ำหนัก	Levofloxacin		Amikacin	
	15 mg/kg/day		15-20 mg/kg/day	
	Max: 1000 mg/day		Max: 1000 mg/day	
	ขนาดยา	**Crcl< 30** ml/min	**Crcl**	**ขนาดยา**
≤ 37	500	ขนาดเดิม ปรับเป็น 3 ครั้ง /wk	Normal	15-20 mg/kg/day
38 – 49	750			
50 – 59	1000		≤ 30 ml/min	ขนาดเดิม ปรับเป็น 3 ครั้ง /wk
60 – 69	1000	ขนาดเดิมปรับเป็น 3 ครั้ง /wk **ให้ after HD only****		
70 – 79	1000		Hemodialysis	ขนาดเดิมปรับเป็น 3 ครั้ง /wk **ให้ after HD only****
≥ 80	1000			

* ในกรณีน้ำหนัก < 35 หรือ > 70 kg ให้คำนวณตามน้ำหนักตัว โดย INH สามารถปรับตามน้ำหนักตัวได้

** กรณี Hemodialysis (HD) ให้ยาหลังจากการฟอกไต (Administer after HD only) : ให้เภสัชกรปรับวันการให้ยาตามวัน HD พร้อมประสานตึก

แก้ไขล่าสุด 10/4/2566 อ้างอิงแนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรคพยาบาลมหาสารคาม