ตารางขนาดยาต้านวัณโรคในเด็กอายุ น้อยกว่า 15 ปีและผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง

ยา	ขนาด	ขนาดยาสูงสุด	ผู้ป่วยที่มี GFR ลดลง, HD, PD, CRRT
Isoniazid	10-15 mg/kg/day	Max: 300 mg/day	ไม่ต้องปรับ ใช้ได้ ในขนาดปกติ
Rifampicin	10-20 mg/kg/day	Max: 600 mg/day	ไม่ต้องปรับ ใช้ได้ ในขนาดปกติ
Ethambutol	15-20 mg/kg/day	Max: 1200 mg/day	Crcl 10-50 ทุก 24-36 ชม Crcl <10 ทุก 48 ชม HD ให้ยาขนาดปกติหลัง dialysis PD ให้ยาทุก 48 ชม CRRT ให้ยาทุก 24-36 ชม
Pyrazinamide	30-40 mg/kg/day	Max: 2000 mg/day	40 mg/kg/day 3 ครั้ง/wk (ไม่เกิน 2 g ในผู้ป่วยที่น้ำหนัก >50 kg และไม่เกิน 1.5 g ในผู้ป่วยที่น้ำหนัก <50kg) กรณีตรงกับวัน HD ให้หลังทำ dialysis
Streptomycin	20-40 mg/kg/day	Max: 1000 mg/day	Crcl 50-80 7.5mg/kg/dose q 24 hr Crcl 10-50 7.5mg/kg/dose q 24-72hr Crcl <10 7.5mg/kg/dose q 72-96hr HD ลดลงครึ่งหนึ่งหลัง dialysis PD 20-40 mg/L/day CRRT doseปกติ q 24-72 hr
Levofloxacin	15-20 mg/kg/day วันละครั้ง	Max: 1500 mg/day-	Crcl <50 ลดขนาดยาลง 50% Crcl <20 ลดขนาดยาลง 50% และให้ยาทุก 48 hr Crcl <10 ไม่แนะนำ
Amikacin	15-30 mg/kg/day	Max: 1000 mg/day	Crcl >50 ลดขนาดยาลง 60-90% Crcl 10-50 ลดขนาดยาคงเหลือ 30-70% Crcl <10 ลดขนาดยาคงเหลือ 20-30% HD ลดลงครึ่งหนึ่งหลัง dialysis PD 15-20 mg/L/day CRRT ลดขนาดลงเหลือ 30-70%
Kanamycin	15-30 mg/kg/day	Max: 1000 mg/day	ไม่มีข้อมูล
PAS	200-300 mg/kg/day แบ่งวันละ 2-4 ครั้ง	Max: 10 gm/day	ไม่มีข้อมูล
Cycloserine	15-20 mg/kg/day แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง	Max: 1000 mg/day	ลดลงเป็น 250 mg/dayหรือ 500 mg 3 ครั้ง/wk
Ethionamide	15-20 mg/kg/dayแบ่งให้วันละ 2-3 ครั้ง	Max: 1000 mg/day	ไม่มีข้อมูล
Moxifloxacin	15 mg/kg/day_วันละครั้ง	Max: 400 mg/day	ไม่ต้องปรับ ใช้ได้ ในขนาดปกติ

แก้ไขล่าสุด 21/3/2566 อ้างอิงแนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรคพยาบาลมหาสารคาม