

3.1.e Adipositasquote von Kindern und Jugendlichen

	2003 bis 2006			2014 bis 2017		
	insgesamt	davon:		insgesamt	davon:	
		weiblich	männlich		weiblich	männlich
Anteil der Befragten, in %						
Kinder (3 bis 10 Jahre)						
Untergewicht (< P10)	6,6	6,9	6,3	6,9	7,0	6,8
Normalgewicht	80,5	80,3	80,6	80,8	80,1	81,5
Übergewicht und Adipositas (> P90)	12,9	12,8	13,1	12,3	12,9	11,8
Übergewicht (> P90 – P97)	7,7	7,6	7,9	8,4	9,0	7,8
Adipositas (> P97)	5,2	5,2	5,2	3,9	3,9	3,9
Jugendliche (11 bis 17 Jahre)						
Untergewicht (< P10)	7,4	7,1	7,7	8,4	7,5	9,2
Normalgewicht	74,5	75,0	74,0	72,9	74,8	71,2
Übergewicht und Adipositas (> P90)	18,1	17,8	18,3	18,7	17,8	19,6
Übergewicht (> P90 – P97)	9,8	9,7	10,0	10,7	10,6	10,9
Adipositas (> P97)	8,3	8,2	8,4	8,0	7,2	8,7

Anmerkungen:

- Sonderauswertung basierend auf Daten folgender Datenquelle: Robert Koch-Institut.
- Altersstandardisierung: Bevölkerungsstand: 31. Dezember 2015.
- Bei Kindern und Jugendlichen basiert die Definition für Unter-, Normal-, Übergewicht und Adipositas nicht auf festgelegten Grenzwerten, sondern auf Perzentilen.