

目录

1 考点 1: Stationary Time Series 平稳的时间序列	2
题号 1 考察: 白噪声、高斯白噪声的性质 (关键在于构成高斯白噪声需要满足的额外条件)	2
题号 2 考察: 白噪声过程的性质 (白噪声的不相关性、独立性、分布特征以及协方差平稳性等概念)	3
题号 3 考察: 白噪声和 Box - Pierce 统计量 (独立白噪声的性质和 Box - Pierce 统计量的原理)	4
题号 4 考察: 协方差平稳时间序列的 3 个性质 (均值恒定、方差恒定且有限、自协方差有限且恒定, 大小只和阶数有关)	4
题号 5 考察: 移动平均 (MA) 模型和自回归 (AR) 模型的区别 (自相关截断、记忆长度和协方差平稳性等特性)	5
题号 6 考察: AR 模型和 ARMA 模型的特点 (理解模型中包含哪些滞后项)	6
题号 7 考察: AR(1) 和 MA(1) 模型 (关键在区分两种模型协方差平稳的条件以及与 ACF 和 PACF 的关系)	6
题号 8 考察: ARMA(1, 1) 模型长期均值的计算 ($E[Y_t] = \mu = \delta / (1 - \phi)$)	7
题号 9 考察: 根据偏自相关函数 (PACF) 图确定适用的模型及模型阶数 (PACF 图截尾应选用 AR 模型)	8
题号 10 考察: ARMA(2, 2) 模型长期均值的计算 (掌握自回归项和移动平均项的期望性质)	8
题号 11 考察: AR(1) 模型的性质 (理解 AR(1) 模型的形式、协方差平稳的条件和长期均值的计算公式)	9
题号 12 考察: 使用 Box - Pierce 和 Ljung - Box Q 统计量检验时间序列是否为白噪声 (比较 Q 统计量与临界值的大小)	10
题号 13 考察: 区分 Box - Pierce 检验和 Ljung - Box 检验 (掌握两个检验的原假设、小样本适用性及统计量分布特点)	10
题号 14 考察: Box-Pierce 和 Ljung-Box Q 统计量的应用和性质 (核心是检验目的、分布特性及滞后阶数选择)	11
题号 15 考察: 自相关函数 (ACF) 和偏自相关函数 (PACF) 的特性 (PACF 值可能在某些特定的滞后值上显著, 而在其他滞后值上迅速减小。)	12
题号 16 考察: 时间序列模型的平稳性条件和自相关特征 (ACF 和 PACF 的模式特征)	13
2 考点 2: Non-Stationary Time Series 非平稳的时间序列	13
题号 1 考察: 时间序列的季节性 (虚拟变量数量等于分类变量类别数减 1)	13
题号 2 考察: 虚拟变量在回归模型中的含义 (理解未设置虚拟变量的类别对应的是截距项所代表的情况)	14
题号 3 考察: 回归模型中完全多重共线性的判断 (虚拟变量数量设置不当会导致多重共线性)	15
题号 4 考察: 单位根检验 (掌握 ADF 检验的假设和结果判断标准)	15
题号 5 考察: 时间序列趋势模型的选择 (关键是理解不同模型隐含的增长方式及其经济学含义)	16
题号 6 考察: 回归模型中虚拟变量的设置 (含截距项时虚拟变量的数量应比类别数少 1)	17
题号 7 考察: 时间序列的单位根检验 (理解单位根对时间序列建模的影响)	17
题号 8 考察: 单位根过程的特征 (理解单位根过程与协方差平稳过程的区别)	18
题号 9 考察: 协方差平稳过程的特征 (关键是理解随机游走和单位根过程对非平稳性的影响)	19
题号 10 考察: ADF 检验的原理和判断 (关键是理解 ADF 检验的假设和拒绝域)	20
3 考点 3: Measuring Returns, Volatility and Correlation 测量回报、波动性和相关性	20
题号 1 考察: 收益率的计算 (掌握简单收益率和对数收益率的计算方法及其区别)	20
题号 2 考察: 使用 Jarque - Bera 检验判断数据集是否来自正态分布 (比较 JB 统计量与临界值)	21
题号 3 考察: 幂律分布的概率计算 (关键在于掌握幂律分布的概率计算公式)	22
题号 4 考察: Kendall τ 相关系数的计算 (关键在于准确计算一致对和不一致对的数量)	23
题号 5 考察: Spearman 秩相关系数 (关键是掌握 Spearman 秩相关系数的计算步骤及公式)	24
题号 6 考察: Jarque - Bera 检验的原理和性质 (Jarque - Bera 检验统计量服从卡方分布)	24
题号 7 考察: 不同统计量对有序分类变量关联性的衡量 (Spearman Correlation 的应用)	25
题号 8 考察: Jarque-Bera 检验统计量的计算及假设检验决策 (关键是掌握 Jarque-Bera 检验统计量计算公式)	26
题号 9 考察: 不同相关系数的适用范围和特点 (理解 Pearson correlation、Spearman correlation 和 Kendall's 分别适用于何种类型的变量关系)	27
题号 10 考察: 不同相关系数的特点及适用场景 (理解各相关系数的计算原理和对不同数据特征的适应性)	28
题号 11 考察: 不同相关系数的特点 (关键是理解各相关系数的计算原理和性质)	28
题号 12 考察: 幂律分布的特征 (关键是理解幂律分布的尾部特性)	29

1 考点 1: Stationary Time Series 平稳的时间序列

1. A junior analyst at a financial research firm is studying the concept of white noise in time - series analysis. Which of the following statements regarding white noise is false?

一位金融研究公司的初级分析师正在研究时间序列分析中的白噪声概念。以下关于白噪声的陈述中，哪一项是错误的？

- A. If a process is stationary, has zero mean, has constant variance and is serially uncorrelated, then the process is white noise.
如果一个过程是平稳的，具有零均值、常数方差且序列不相关，那么这个过程就是白噪声。
- B. If a process is Gaussian (aka, normal) white noise, then it must be independent white noise.
如果一个过程是高斯白噪声（即正态分布的白噪声），那么它必然是独立白噪声。
- C. If a process is Gaussian (aka, normal) white noise, then it must be (zero - mean) white noise.
如果一个过程是高斯白噪声（即正态分布的白噪声），那么它必然是零均值白噪声。
- D. If a process is zero - mean white noise, then it must be Gaussian white noise.
如果一个过程是零均值白噪声，那么它必然是高斯白噪声。

答案:D

解析:

A 选项正确。

- 根据白噪声的定义，一个平稳过程，具有零均值、常数方差且序列不相关，那么这个过程就是白噪声，故选项 A 正确。

B 选项正确。

- 高斯白噪声是序列不相关且服从正态分布的白噪声，如果一个过程是高斯白噪声，那么它必然是独立白噪声，故选项 B 正确。

C 选项正确。

- 高斯白噪声是白噪声的一种特殊情况，满足白噪声的基本特征，即零均值、常数方差和序列不相关，所以高斯白噪声一定是（零均值）白噪声，故选项 C 正确。

D 选项错误。

- 零均值白噪声只要满足均值为零、方差恒定且序列不相关即可，不一定服从高斯分布。白噪声可以有多种分布形式，不一定是高斯分布，故选项 D 错误。

考察: 白噪声、高斯白噪声的性质（关键在于构成高斯白噪声需要满足的额外条件）

2. A financial analyst at a hedge fund is studying time-series models. White noise is the fundamental building block of any time-series model. Which of the following statements about the properties of a white noise process is correct?

一位对冲基金的风险分析师正在研究时间序列模型。白噪声是任何时间序列模型的基本构建块。以下关于白噪声过程的性质的陈述中，哪一项是正确的？

- A. Independent white noise is a special case of Gaussian white noise.
独立白噪声是高斯白噪声的特例。
- B. In time-series modeling, the white noise process always follows a Poisson distribution.
在时间序列建模中，白噪声过程总是遵循泊松分布。
- C. White noise is correlated over time and is necessarily independent.
白噪声随时间相关，必然独立。
- D. Any white noise process is covariance-stationary because the first two moments are time-invariant, and the variance is finite.
任何白噪声过程都是协方差平稳的，因为前两个矩是时间不变的，且方差有限。

答案:D

解析:

A 选项错误。

- 独立白噪声（观测值独立且不相关）比高斯白噪声（观测值独立且服从正态分布）更广义。高斯白噪声属于独立白噪声的特例，而非相反。

B 选项错误。

- 白噪声过程不需要特定的分布假设，

C 选项错误。

- 白噪声定义要求不相关，对独立性未作要求，仅独立白噪声要求具有独立性。

D 选项正确。

- 白噪声满足协方差平稳三条件:均值恒定($E(\varepsilon_t) = 0$),方差恒定($Var(\varepsilon_t) = \sigma^2$),自协方差仅与滞后阶数相关($Cov(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-k}) = 0, \forall k \neq 0$)。

考察: 白噪声过程的性质（白噪声的不相关性、独立性、分布特征以及协方差平稳性等概念）

3. A risk analyst at a prominent quantitative investment firm is delving into time - series analysis for portfolio optimization. As part of the process, the analyst is focusing on the concept of white noise, which is fundamental in understanding the randomness and predictability of financial time - series data. After conducting a series of tests and analyses, the analyst makes the following statements about white noise. Which statement is correct?

一位著名的量化投资公司的风险分析师正在研究时间序列分析以优化投资组合。作为过程的一部分，分析师正在关注白噪声的概念，这是理解金融时间序列数据随机性和可预测性的基础。经过一系列测试和分析，分析师做出了以下关于白噪声的陈述。哪一项陈述是正确的？

A. If ϵ_t is serially uncorrelated, then we say ϵ_t is independent white noise.

如果 ϵ_t 是序列不相关的，那么我们说 ϵ_t 是独立白噪声。

B. Box - Pierce statistic could be used to test the null hypothesis that all its autocorrelations are jointly 0.

Box - Pierce 统计量可以用于检验所有自相关系数联合为 0 的原假设。

C. Using Box - Pierce statistic [$Q_{BP} = T \sum_{\tau=1}^h \hat{\rho}^2(\tau)$] to test ARMA series, h is the higher the better if computational capacity is allowed.

使用 Box - Pierce 统计量 [$Q_{BP} = T \sum_{\tau=1}^h \hat{\rho}^2(\tau)$] 检验 ARMA 序列，如果计算能力允许， h 越高越好。

D. If one - step - ahead forecast errors contain white noise, the model should not be a preferred model.

如果一步预测误差包含白噪声，模型不应该是首选模型。

答案:B

解析:

A 选项错误。

- 仅序列不相关不能得出 ϵ_t 是独立白噪声，独立白噪声除了序列不相关，还需满足均值为 0、方差为常数且服从独立同分布等条件，该选项说法错误。

B 选项正确。

- Box - Pierce 统计量能够用于检验所有自相关系数联合为 0 的原假设，这是其常见应用，该选项说法正确。

C 选项错误。

- 在使用 Box - Pierce 统计量检验 ARMA 序列时，虽然在计算能力允许下可以取较大的 h 以考虑更多滞后项，但并非 h 越高越好。过高的 h 可能会引入过多不必要的信息，导致检验结果不准确，该选项说法错误。

D 选项错误。

- 一期预测误差包含白噪声是较好的模型的特征，该选项说法错误。

考察: 白噪声和 Box - Pierce 统计量（独立白噪声的性质和 Box - Pierce 统计量的原理）

4. A risk analyst at an investment bank is performing a time - series analysis on bond yields. The analyst needs to determine if the time series is covariance stationary. Which of the following statements represents one of the requirements for a time series to be covariance stationary?

一位投资银行的风险分析师正在对债券收益率进行时间序列分析。分析师需要确定时间序列是否是协方差平稳的。以下哪一项陈述代表时间序列成为协方差平稳的一个要求？

- A. When the autocovariance function is asymmetric with respect to displacement, τ , forward - looking stationarity can be achieved.
当自协方差函数关于位移 τ 不对称时，可以实现前瞻性平稳性。
- B. The distribution of a time series should have a kurtosis value near 3.0, ensuring no fat tails will distort stationarity.
时间序列的分布应该具有接近 3.0 的峰度值，确保不会因为厚尾导致平稳性失真。
- C. The autocovariance of a covariance stationary time series depends only on displacement, τ , not on time.
协方差平稳时间序列的自协方差仅依赖于位移 τ ，而不依赖于时间。
- D. The distribution of a time series should have a skewness value near 0, so that its mean will fall in the center of the distribution.
时间序列的分布应该具有接近 0 的偏度值，使得均值落在分布的中心。

答案:C

解析:

A 选项错误。

- 协方差平稳性要求自协方差函数只与时间间隔 τ 有关，而与时间无关，并且自协方差函数是关于位移 τ 对称的。不对称的自协方差函数不符合协方差平稳的要求，也无法实现所谓的“前瞻性平稳性”，故选项 A 错误。

B 选项错误。

- 协方差平稳性主要关注时间序列的均值、方差和自协方差的性质，与分布的峰度值没有直接关系，故选项 B 错误。

C 选项正确。

- 对于一个协方差平稳的时间序列，其自协方差只依赖于时间间隔 τ ，而不依赖于具体的时间点。也就是说，无论在哪个时间点进行观察，相同时间间隔的自协方差是恒定的，故选项 C 正确。

D 选项错误。

- 协方差平稳性主要关注时间序列的均值、方差和自协方差的性质，与分布的偏度值没有直接关系，故选项 D 错误。

考察: 协方差平稳时间序列的 3 个性质（均值恒定、方差恒定且有限、自协方差有限且恒定，大小只和阶数有关）

5. A risk analyst at a financial institution is comparing the moving average (MA) representation and the autoregressive (AR) process. Which of the following statements is a key differentiator between them?

一位金融机构的风险分析师正在比较移动平均（MA）表示和自回归（AR）过程。以下哪一项陈述是它们之间的关键区别？

- A. An autoregressive process is always covariance stationary.
自回归过程总是协方差平稳的。
- B. The structure of the MA(1) process has a longer memory than AR(1).
MA(1) 过程的结构比 AR(1) 过程有更长的记忆。
- C. A moving average representation shows evidence of autocorrelation cutoff.
移动平均表示显示自相关截断的证据。
- D. An autoregressive process shows evidence of autocorrelation cutoff.
自回归过程显示自相关截断的证据。

答案:C

解析:

A 选项错误。

- 自回归（AR）过程并不总是协方差平稳的。例如，对于 AR(1) 过程 $Y_t = \phi Y_{t-1} + \varepsilon_t$ ，只有当 $|\phi| < 1$ 时，该过程才是协方差平稳的。如果 $|\phi| \geq 1$ ，过程就不满足协方差平稳的条件，其均值、方差和自协方差会随时间变化。

B 选项错误。

- 移动平均（MA）过程的记忆是有限的。以 MA(1) 过程 $Y_t = \mu + \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1}$ 为例，它只依赖于当前和前一期的白噪声项，自相关函数在滞后大于 1 时为 0。而 AR(1) 过程 $Y_t = \phi Y_{t-1} + \varepsilon_t$ 的影响会无限期地传递下去，因为当前值 Y_t 依赖于前一期的值 Y_{t-1} ，而 Y_{t-1} 又依赖于 Y_{t-2} ，以此类推。所以 AR(1) 过程的记忆更长。

C 选项正确。

- 移动平均（MA）表示的一个关键特征是自相关函数（ACF）会在某个滞后阶数之后截断。例如，对于 MA(q) 过程，其自相关函数在滞后 $k > q$ 时为 0。这意味着该过程的自相关性在一定滞后阶数后消失，体现了自相关截断的特性。

D 选项错误。

- 自回归（AR）过程的自相关函数不会截断，而是呈指数衰减。以 AR(1) 过程为例，其自相关函数 $\rho(k) = \phi^k$ ，随着滞后阶数 k 的增加，自相关系数逐渐减小，但不会突然截断为 0。

考察: 移动平均（MA）模型和自回归（AR）模型的区别（自相关截断、记忆长度和协方差平稳性等特性）

6. A financial analyst at a hedge fund is looking to model seasonal stock price data. She is considering the use of an autoregressive (AR) process and an autoregressive moving average (ARMA) process. Which of the following statements correctly describes the usefulness of these two processes for this task?

一位对冲基金的风险分析师正在考虑使用自回归（AR）过程和自回归移动平均（ARMA）过程来建模季节性股票价格数据。以下哪一项陈述正确描述了这两种过程在这个任务中的实用性？

- A. They both are mainly designed to handle the sudden shocks in time - series data.
它们都主要是为了处理时间序列数据中的突发冲击而设计的。
- B. They both include lagged terms and, therefore, can better capture a relationship in motion.
它们都包含滞后项，因此可以更好地捕捉运动中的关系。
- C. They both include the contemporaneous shock, and the previous shock.
它们都包含 contemporaneous shock，以及之前的冲击。
- D. They both specialize in capturing only the random movements in time series data.
它们都专门用于捕捉时间序列数据中的随机运动。

答案:B

解析:

A 选项错误。

- AR 和 ARMA 模型主要是通过包含滞后项来捕捉时间序列中的自相关关系，而不是专门用于处理时间序列数据中的突发冲击。突发冲击通常更适合用 ARCH、GARCH 等模型来处理，故选项 A 错误。

B 选项正确。

- AR 模型包含滞后的因变量项，ARMA 模型既包含滞后的因变量项又包含滞后的误差项。这些滞后项使得模型能够捕捉到时间序列中变量之间随时间变化的动态关系，也就是所谓的“动态中的关系”，故选项 B 正确。

C 选项错误。

- AR 模型不包含滞后的误差项，MA 模型和 ARMA 模型包含滞后的误差项，所以选项 C 错误。

D 选项错误。

- AR 和 ARMA 模型不仅仅是捕捉时间序列中的随机运动。它们通过对滞后项的建模，能够揭示时间序列中的自相关结构和潜在的规律，而不是只关注随机部分，故选项 D 错误。

考察: AR 模型和 ARMA 模型的特点（理解模型中包含哪些滞后项）

7. A risk analyst at a leading investment firm, Alex Thompson, is looking into modeling the cyclical stock returns of a tech company. Considering using AR(1) and MA(1) models, he makes the following statements about the characteristics of these models before building them. Which statement is most likely incorrect?

一位领先投资公司的风险分析师, Alex Thompson, 正在研究科技公司的周期性股票回报的建模。考虑使用 AR(1) 和 MA(1) 模型, 他在构建这些模型之前做出了以下关于这些模型特征的陈述。哪一项陈述最有可能不正确?

- A. The AR(1) model is $y_t = \delta + \varphi \times y_{t-1} + \epsilon_t$ and if the absolute value of φ is less than 1, the AR(1) model is covariance stationary.
AR(1) 模型是 $y_t = \delta + \varphi \times y_{t-1} + \epsilon_t$, 如果 φ 的绝对值小于 1, AR(1) 模型是协方差平稳的。
- B. The MA(1) model is $y_t = \mu + \epsilon_t + \theta \times \epsilon_{t-1}$ and no matter what value θ takes, the MA(1) process is always covariance stationary.
MA(1) 模型是 $y_t = \mu + \epsilon_t + \theta \times \epsilon_{t-1}$, 无论 θ 取何值, MA(1) 过程总是协方差平稳的。
- C. The ACF (autocorrelation function) of AR(1) process decays as the time lag length increases and the PACF (partial autocorrelation function) decays as the time lag length increases.
AR(1) 过程的自相关函数随着滞后长度增加而衰减, 偏自相关函数随着滞后长度增加而衰减。
- D. The ACF (autocorrelation function) of MA(1) process cuts off as the time lag length increases and the PACF (partial autocorrelation function) decays as the time lag length increases.
MA(1) 过程的自相关函数随着滞后长度增加而截断, 偏自相关函数随着滞后长度增加而衰减。

答案:C

解析:

A 选项正确。

- AR(1) 模型 $y_t = \delta + \varphi \times y_{t-1} + \epsilon_t$, 当 $|\varphi| < 1$ 时, 满足自回归过程平稳的条件, 此时该模型是协方差平稳的, 该选项说法正确。

B 选项正确。

- MA(1) 模型 $y_t = \mu + \epsilon_t + \theta \times \epsilon_{t-1}$, 其均值、方差和自协方差不依赖于时间 t , 无论 θ 取何值, MA(1) 过程总是协方差平稳的, 该选项说法正确。

C 选项错误。

- AR(1) 模型的自相关函数 (ACF) 随着滞后阶数的增大而逐渐衰减 (decay) 到 0, 偏自相关系数 (PACF) 随着滞后阶数的增大而直接降低到 0, 有截尾特征, 并非随着滞后长度增加而截断, 该选项说法错误。

D 选项正确。

- MA(1) 模型的自相关函数 (ACF) 随着滞后阶数的增大直接降低到 0, 有截尾特征, 偏自相关系数 (PACF) 随着滞后阶数的增大而逐渐衰减到 0, 该选项说法正确。

考察: AR(1) 和 MA(1) 模型（关键在区分两种模型协方差平稳的条件以及与 ACF 和 PACF 的关系）

8. A risk analyst at a fixed - income investment firm is analyzing a covariance - stationary ARMA(1, 1) model. The model is given by $Y_t = 0.5 + 0.4Y_{t-1} - 0.7\epsilon_{t-1} + \epsilon_t$, where $\epsilon_t \sim WN(0, \sigma^2)$. What is the long - run mean $E[Y_t]$?

一位固定收益投资公司的风险分析师正在分析一个协方差平稳的 ARMA(1, 1) 模型。模型为 $Y_t = 0.5 + 0.4Y_{t-1} - 0.7\epsilon_{t-1} + \epsilon_t$, 其中 $\epsilon_t \sim WN(0, \sigma^2)$ 。长期均值 $E[Y_t]$ 是多少?

A. $E[Y_t] = -1.67$

B. $E[Y_t] = 0.71$

C. $E[Y_t] = 0.83$

D. $E[Y_t] = -0.45$

答案:C

解析:

步骤 1：明确长期均值的性质。

- 在协方差平稳的时间序列中，长期均值 $E[Y_t]$ 是一个常数，即 $E[Y_t] = E[Y_{t-1}]$ ，并且 $E[\epsilon_t] = 0$ ， $E[\epsilon_{t-1}] = 0$ 。

步骤 2：对给定的 ARMA(1, 1) 模型取期望。


- 对 $Y_t = 0.5 + 0.4Y_{t-1} - 0.7\epsilon_{t-1} + \epsilon_t$ 两边同时取期望，得到 $E[Y_t] = 0.5 + 0.4E[Y_{t-1}] - 0.7E[\epsilon_{t-1}] + E[\epsilon_t]$ 。
- 由于 $E[\epsilon_t] = 0$ ， $E[\epsilon_{t-1}] = 0$ ，且 $E[Y_t] = E[Y_{t-1}]$ ，设 $E[Y_t] = \mu$ ，则方程变为 $\mu = 0.5 + 0.4\mu$ 。

步骤 3：求解长期均值 μ 。


- 对 $\mu = 0.5 + 0.4\mu$ 进行移项可得： $\mu - 0.4\mu = 0.5$ ，即 $0.6\mu = 0.5$ 。
- 解得 $\mu = \frac{0.5}{0.6} = 0.83$ 。

考察：ARMA(1, 1) 模型长期均值的计算（ $E[Y_t] = \mu = \delta/(1 - \phi)$ ）

9. A risk analyst at an asset management firm is trying to analyze and forecast the performance of a particular stock. The analyst has gathered the historical time - series data of the stock. Based on the Partial Autocorrelation Function (PACF) plot shown below, which of the following is the most appropriate regression approach for this stock?



一位资产管理公司的风险分析师正在尝试分析和预测特定股票的绩效。分析师收集了该股票的历史时间序列数据。根据下面显示的偏自相关函数（PACF）图，哪一种回归方法最适合这种股票？



- A. MA(2)
- B. AR(1)
- C. MA(1)
- D. AR(2)

答案:D

解析:

PACF 图主要用于判断 AR 模型的阶数，该题中的 PACF 图在二阶后截尾，故应选择 AR(2) 模型，选项 D 正确。MA（移动平均）模型的阶数通常根据自相关函数（ACF）来确定，而不是偏自相关函数（PACF）。

ACF & PACF Summary:

Model	ACF	PACF
AR	拖尾 decay	截尾 cutoff
MA	截尾 cutoff	拖尾 decay
ARMA	拖尾 decay	拖尾 decay

考察: 根据偏自相关函数（PACF）图确定适用的模型及模型阶数（PACF 图截尾应选用 AR 模型）

10. A risk analyst at a financial institution is working on a covariance - stationary ARMA(2, 2) model. The model is defined as $Y_t = 0.3 + 0.5Y_{t-1} - 0.2Y_{t-2} + 0.7\epsilon_{t-1} + 0.2\epsilon_{t-2} + \epsilon_t$, where $\epsilon_t \sim WN(0, \sigma^2)$. What is the long - run unconditional mean of Y_t ?

一位金融机构的风险分析师正在研究一个协方差平稳的 ARMA(2, 2) 模型。模型定义为 $Y_t = 0.3 + 0.5Y_{t-1} - 0.2Y_{t-2} + 0.7\epsilon_{t-1} + 0.2\epsilon_{t-2} + \epsilon_t$ ，其中 $\epsilon_t \sim WN(0, \sigma^2)$ 。长期无条件均值 $E[Y_t]$ 是多少？

- A. 1.5
- B. 0.3333
- C. 0.4286
- D. 2

答案:C

解析:

步骤 1：明确长期均值的性质。

- 在协方差平稳的时间序列中，长期均值 $E[Y_t]$ 是一个常数，即 $E[Y_t] = E[Y_{t-1}] = E[Y_{t-2}]$ ，并且 $E[\epsilon_t] = 0$ ， $E[\epsilon_{t-1}] = 0$ ， $E[\epsilon_{t-2}] = 0$ 。

步骤 2：对给定的 ARMA(2, 2) 模型取期望。

- 对 $Y_t = 0.3 + 0.5Y_{t-1} - 0.2Y_{t-2} + 0.7\epsilon_{t-1} + 0.2\epsilon_{t-2} + \epsilon_t$ 两边同时取期望，得到 $E[Y_t] = 0.3 + 0.5E[Y_{t-1}] - 0.2E[Y_{t-2}] + 0.7E[\epsilon_{t-1}] + 0.2E[\epsilon_{t-2}] + E[\epsilon_t]$ 。
- 由于 $E[\epsilon_t] = 0$ ， $E[\epsilon_{t-1}] = 0$ ， $E[\epsilon_{t-2}] = 0$ ，且 $E[Y_t] = E[Y_{t-1}] = E[Y_{t-2}]$ ，设 $E[Y_t] = \mu$ ，则方程变为 $\mu = 0.3 + 0.5\mu - 0.2\mu$ 。

步骤 3：求解长期均值 μ 。

- 对 $\mu = 0.3 + 0.5\mu - 0.2\mu$ 进行移项可得： $\mu - 0.5\mu + 0.2\mu = 0.3$ ，即 $0.7\mu = 0.3$ 。
- 解得 $\mu = \frac{0.3}{0.7} = \frac{3}{7} \approx 0.4286$ 。

考察: ARMA(2, 2) 模型长期均值的计算（掌握自回归项和移动平均项的期望性质）

11. A junior risk analyst at a hedge fund is attempting to forecast the expected return of a stock using the following AR(1) model: $y_t = 1.67 + 0.65y_{t-1} + \epsilon_t$. The analyst is puzzled about the significant impacts of covariance stationarity on the forecasting model and the implications of the model. Which of the following statements regarding the analyst’s concern is most likely incorrect?

一位对冲基金的初级风险分析师正在使用以下 AR(1) 模型预测股票的预期回报： $y_t = 1.67 + 0.65y_{t-1} + \epsilon_t$ 。分析师对协方差平稳对预测模型和模型含义的显著影响感到困惑。以下关于分析师关切的陈述中，哪一项最有可能不正确？

- A. The long - run forecast from the time series is 4.77, which is equal to the mean reversion level of the AR(1) model.
时间序列的长期预测为 4.77，等于 AR(1) 模型的均值回归水平。
- B. The model constructed by the analyst is covariance - stationary, because $|\phi_1| = |0.65| < 1$.
分析师构建的模型是协方差平稳的，因为 $|\phi_1| = |0.65| < 1$ 。
- C. The AR(1) model relates the current value of a stochastic process (i.e., y_t) to its value two periods ago (i.e., y_{t-2}).
AR(1) 模型将随机过程的当前值（即 y_t ）与其两期前的值（即 y_{t-2} ）相关联。
- D. A covariance - stationary time series implies a constant relationship across time, allowing historical data to be used to estimate models that are applicable to future out - of - sample observations.
协方差平稳的时间序列意味着在时间上存在恒定的关系，允许使用历史数据来估计适用于未来样本外观测的模型。

答案:C

解析:

A 选项正确。

- 对于 AR(1) 模型 $y_t = \phi_0 + \phi_1 y_{t-1} + \epsilon_t$ ，其长期均值（即均值回归水平）的计算公式为 $\mu = \frac{\phi_0}{1-\phi_1}$ 。
- 已知 $\phi_0 = 1.67$ ， $\phi_1 = 0.65$ ，代入可得 $\mu = \frac{1.67}{1-0.65} = 4.77$ ，长期预测值等于均值回归水平。所以该选项描述正确。

B 选项正确。

- AR(1) 模型 $y_t = \phi_0 + \phi_1 y_{t-1} + \epsilon_t$ 具有协方差平稳性的条件是自回归系数 ϕ_1 的绝对值小于 1。
- 在本题中 $|\phi_1| = |0.65| < 1$ ，所以该模型是协方差平稳的。该选项描述正确。

C 选项错误。

- 自回归一阶模型（AR(1)）的形式为 $y_t = \phi_0 + \phi_1 y_{t-1} + \epsilon_t$ ，它是将当前时刻的随机过程值 y_t 与前一时刻的值 y_{t-1} 相关联，而不是与前两期的值 y_{t-2} 相关联。所以该选项描述错误。

D 选项正确。

- 协方差平稳的时间序列意味着其均值、方差和自协方差不随时间变化，具有恒定的关系。
- 基于这种特性，我们可以利用历史数据来估计模型参数，并且这些模型对于未来的样本外观测值也是适用的。所以该选项描述正确。

考察: AR(1) 模型的性质（理解 AR(1) 模型的形式、协方差平稳的条件和长期均值的计算公式）

12. A risk analyst at an investment firm is analyzing a time series that consists of thirty - six quarterly observations ($m = \text{degrees of freedom} = 36$). The analyst has calculated the Box - Pierce Q - statistic to be 28.80 and the Ljung - Box Q - statistic to be 38.20. The analyst wants to determine if the series is white noise. Given that $\text{CHISQ.INV}(0.95, 36) = 50.99$, which of the following is the best conclusion?

一位投资公司的风险分析师正在分析一个由三十六季度观测值组成的时间序列（ $m = \text{自由度} = 36$ ）。分析师计算得到的 Box - Pierce Q 统计量为 28.80，Ljung - Box Q 统计量为 38.20。分析师想要确定该序列是否为白噪声。已知 $\text{CHISQ.INV}(0.95, 36) = 50.99$ ，哪一项是最合适的结论？

- A. With 95% confidence, you accept the series as white noise (more accurately, you fail to reject the null).
在 95% 的置信水平下，你接受该序列作为白噪声（更准确地说，你未能拒绝原假设）。
- B. With 95% confidence, you accept the series as partial white noise (due to Box - Pierce) but reject the null (due to Ljung - Box).
在 95% 的置信水平下，你接受该序列作为部分白噪声（由于 Box - Pierce）但拒绝原假设（由于 Ljung - Box）。
- C. With 95% confidence, you reject both null hypotheses and conclude the series is not white noise.
在 95% 的置信水平下，你拒绝两个原假设并得出该序列不是白噪声。
- D. With 95% confidence, you reject both null hypotheses but conclude the series is white noise because the sum of the statistics is greater than the critical value.
在 95% 的置信水平下，你拒绝两个原假设但得出该序列是白噪声，因为统计量的和大于临界值。

答案:A

解析:

Joint Tests of Autocorrelations:

- 在检验时间序列是否为白噪声时，原假设 H_0 是该时间序列是白噪声。使用 Box - Pierce 和 Ljung - Box Q 统计量进行检验，当计算得到的 Q 统计量小于临界值时，我们不能拒绝原假设。
- 已知自由度 $m = 36$ ， $\text{CHISQ.INV}(0.95, 36) = 50.99$ 为临界值，计算得到的 Box - Pierce Q 统计量为 28.80，Ljung - Box Q 统计量为 38.20，两者均小于临界值 50.99。
- 所以，在 95% 的置信水平下，我们不能拒绝原假设，即接受该序列为白噪声，故选项 A 正确。

考察: 使用 Box - Pierce 和 Ljung - Box Q 统计量检验时间序列是否为白噪声（比较 Q 统计量与临界值的大小）

13. A risk analyst at a financial research firm is conducting a specification analysis on an ARMA model by testing autocorrelation in the residuals. The analyst is considering the two closely - related tests: the Box - Pierce test and the Ljung - Box test. Which of the following statements accurately differentiates these two tests?

一位金融研究公司的风险分析师正在对 ARMA 模型进行规格分析，通过检验残差中的自相关性。分析师考虑了两个密切相关的检验：Box - Pierce 检验和 Ljung - Box 检验。哪一项陈述准确区分了这两种检验？

- A. Under both tests, a rejection of the null hypothesis indicates that the model fails to account for certain dynamics in a time series.
在两种检验中，拒绝原假设意味着模型未能解释时间序列中的某些动态特征。
- B. They have the same null hypothesis, which posits that all autocorrelations are non-zero.
它们具有相同的原假设，即所有自相关系数都不为零。
- C. The Box - Pierce test performs better in smaller samples compared to the Ljung - Box test.
Box - Pierce 检验在小样本下比 Ljung - Box 检验更有效。
- D. Asymptotically, the Ljung - Box test - statistic follows a normal distribution, while the Box - Pierce test - statistic follows a chi - squared distribution.
渐近情况下，Ljung - Box 检验统计量服从正态分布，而 Box - Pierce 检验统计量服从卡方分布。

答案:A

解析:

A 选项正确。

- 对于 Box - Pierce 检验和 Ljung - Box 检验，原假设 H_0 是残差序列的自相关系数都为零，即模型已经捕捉了时间序列的所有动态特征。
- 当拒绝原假设时，意味着至少存在一个自相关系数不为零，即原模型不能解释时间序列中的自相关结构，说明模型未能捕捉到时间序列中的某些动态特征，故选项 A 正确。

B 选项错误。

- 两个检验的原假设是所有自相关系数都为零，而不是“所有自相关系数不为零”，故选项 B 错误。

C 选项错误。

- 通常 Ljung - Box 检验在小样本下比 Box - Pierce 检验更有效，故选项 C 错误。

D 选项错误。

- 渐近情况下，Box - Pierce 检验统计量和 Ljung - Box 检验统计量都服从卡方分布，故选项 D 错误。

考察: 区分 Box - Pierce 检验和 Ljung - Box 检验（掌握两个检验的原假设、小样本适用性及统计量分布特点）

14. A data analyst at a financial firm is using the Box-Pierce and Ljung-Box Q-statistics to analyze time-series data. Which of the following statements about these statistics is false?

一位金融公司的数据分析师正在使用 Box-Pierce 和 Ljung-Box Q 统计量分析时间序列数据。哪一项关于这些统计量的陈述是错误的？

- A. The Box-Pierce Q-statistic is used to test whether the residuals in a time series are white noise.
Box-Pierce Q 统计量用于检验时间序列残差是否为白噪声。
- B. The Ljung-Box Q-statistic is used to test for a linear trend in a time series under the null hypothesis of a unit root.
Ljung-Box Q 统计量用于检验时间序列是否存在线性趋势，在单位根原假设下进行检验。
- C. Under the null hypothesis that autocorrelations are jointly zero in a time series, the Box-Pierce Q-statistic is approximately distributed as a chi-squared random variable.
在时间序列的自相关系数联合为零的原假设下，Box-Pierce Q 统计量近似服从卡方分布。
- D. In the Ljung-Box test, the selection of the number of lags being tested is a balance between conducting a joint test and the quality of the distribution approximations.
Ljung-Box 检验中，滞后阶数的选择是在联合检验和分布近似质量之间进行平衡。

答案:B

解析:

A 选项正确。

- Box-Pierce Q 统计量的核心用途是检验时间序列残差是否为白噪声，通过检验自相关系数的联合显著性来判断模型是否充分。

B 选项错误。

- Ljung-Box 检验的原假设是前 m 阶自相关系数均为零，与单位根无关。单位根检验需使用 ADF 或 PP 检验，线性趋势检测则通过回归分析实现。

C 选项正确。

- Box-Pierce 统计量在零假设下渐近服从 $\chi^2(m)$ 分布，其中 m 为滞后阶数。

D 选项正确。

- 滞后阶数 m 的选择需权衡：m 过小可能遗漏高阶自相关，m 过大会降低卡方近似的准确性，通常取 $m \approx \ln(T)$ （T 为样本量）。

考察: Box-Pierce 和 Ljung-Box Q 统计量的应用和性质（核心是检验目的、分布特性及滞后阶数选择）

15. In financial risk management (FRM), autocorrelation function (ACF) and partial autocorrelation function (PACF) are important tools for analyzing time series data. Based on the provided material, which of the following statements is incorrect?
在金融风险管理（FRM）中，自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）是分析时间序列数据的重要工具。基于提供的材料，哪一项陈述是错误的？

- A. The autocorrelation function (ACF) is calculated by dividing the autocovariance by the variance of the time series, resulting in values between -1 and +1.
自相关函数（ACF）是通过将自协方差除以时间序列的方差来计算的，结果值在-1 和 +1 之间。
- B. For a covariance-stationary time series, ACF values tend to approach zero as the time lag increases.
对于协方差平稳的时间序列，ACF 值随着滞后阶数 的增加趋近于零。
- C. The partial autocorrelation function (PACF) measures the predictive ability of a single lag on the time series after controlling for the effects of all other lags.
偏自相关函数（PACF）测量的是单个滞后项对时间序列的预测能力，在控制了所有其他滞后项的影响后。
- D. In partial autocorrelation analysis, all PACF values gradually decrease as the time lag increases.
在偏自相关分析中，所有 PACF 值随着滞后阶数 的增加逐渐

答案:D

解析:

A 选项正确。

- 自相关函数（ACF）是通过将自协方差除以时间序列的方差来标准化的：

$$\rho(k) = \frac{\gamma(k)}{\gamma(0)}$$

其中 $\gamma(k)$ 是 k 阶自协方差， $\gamma(0)$ 是方差

- 这种标准化使得 ACF 值必然落在 [-1, 1] 区间内。

B 选项正确。

- 对于协方差平稳的时间序列，随着滞后阶数 k 的增加，序列之间的相关性会逐渐减弱。
- 这种特性反映在 ACF 上就是： $\lim_{k \rightarrow \infty} \rho(k) = 0$

C 选项正确。

- PACF 衡量的是在控制了中间所有滞后项（ $Y_{t-1}, Y_{t-2}, \dots, Y_{t-k+1}$ ）的影响后， Y_t 与 Y_{t-k} 之间的相关性，反映了纯粹的 k 阶滞后效应。

D 选项错误。

- PACF 值不一定随着滞后阶数增加而缓慢减小，对于 AR(p) 过程，PACF 在 p 阶后会突然截断为 0，对于 MA(q) 过程，PACF 会呈指数衰减。
- PACF 值可能在某些特定的滞后值上显著，而在其他滞后值上迅速减小。

考察：自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）的特性（PACF 值可能在某些特定的滞后值上显著，而在其他滞后值上迅速减小。）

16. A quantitative analyst at a hedge fund is developing time series models to forecast asset returns. While examining both AR(1) and MA(1) models for different financial instruments, she needs to understand the properties of autocorrelation function (ACF) and partial autocorrelation function (PACF) to select the most appropriate model. Based on her analysis of these models, which of the following statements is CORRECT?

一位对冲基金的量化分析师正在开发时间序列模型来预测资产回报。在检查不同的金融工具的 AR(1) 和 MA(1) 模型时，她需要理解自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）的特性来选择最合适的模型。基于她对这些模型的分析，哪一项陈述是正确的？

- A. The AR(1) model $Y_t = \delta + \varphi Y_{t-1} + \epsilon_t$ she has tested is covariance-stationary when $|\varphi| < 1$.
AR(1) 模型 $Y_t = \delta + \varphi Y_{t-1} + \epsilon_t$ 她测试的是协方差平稳的，当 $|\varphi| < 1$ 时。
- B. The MA(1) model requires the condition $|\theta| < 1$ to ensure its covariance stationarity.
MA(1) 模型需要条件 $|\theta| < 1$ 来确保其协方差平稳。
- C. The PACF plots she generated for the MA(1) model exhibit a sharp cut-off pattern after lag 1.
MA(1) 模型生成的 PACF 图在滞后 1 阶后显示一个明显的截断模式。
- D. The ACF plots she generated for the AR(1) model show a cut-off pattern after lag 1.
AR(1) 模型生成的 ACF 图在滞后 1 阶后显示一个明显的截断模式。

答案:A

解析：

A 选项正确。

- 这个陈述准确描述了 AR(1) 模型的平稳性条件。
- AR(1) 模型必须在 $|\varphi| < 1$ 时才平稳，这是保证过去的冲击不会无限累积的必要条件。
- 当 $|\varphi| \geq 1$ 时，序列的方差会无限增大，违反平稳性要求。

B 选项错误。

- MA(1) 模型对任意参数值 θ 都是协方差平稳的，不需要 $|\theta| < 1$ 的条件。

- 这是因为 MA 过程是有限个白噪声的线性组合，而白噪声过程具有固定的均值和方差。

C 选项错误。

- MA(1) 模型的 PACF 实际上呈现衰减模式，而不是截尾模式。
- 这是 MA(1) 模型的一个重要特征，可以用来识别时间序列的类型。

D 选项错误。

- AR(1) 模型的 ACF 实际上呈现衰减模式，而不是截尾模式。
- 这种衰减模式反映了 AR(1) 过程中，过去观测值的影响会随时间逐渐减弱。

模型	ACF	PACF
MA(1) 模型	截尾 (cut off)	衰减 (decay)
AR(1) 模型	衰减 (decay)	截尾 (cut off)

考察: 时间序列模型的平稳性条件和自相关特征（ACF 和 PACF 的模式特征）

2 考点 2: Non-Stationary Time Series 非平稳的时间序列

1. An analyst at a retail consulting firm, Lily, is building a model to predict a client’s sales over time. She has identified a quarterly seasonal pattern in the sales data. If Lily includes an intercept term in her model, how many dummy variables should she use to model the seasonality component?

一位零售咨询公司的分析师 Lily 正在建立一个模型来预测客户销售随时间的变化。她已经识别出销售数据中的季度季节性模式。如果 Lily 在她的模型中包含截距项，她应该使用多少个虚拟变量来建模季节性成分？

- A. 5
- B. 4
- C. 2
- D. 3

答案:D

解析:

在回归模型中，当存在截距项时，对于具有 n 个类别的分类变量，需要使用 $n - 1$ 个虚拟变量来避免多重共线性。这里季节有 4 个类别，所以应该使用 $4 - 1 = 3$ 个虚拟变量来建模季节成分，选项 D 正确。

考察: 时间序列的季节性（虚拟变量数量等于分类变量类别数减 1）

2. A financial analyst at a consumer goods company is using a regression model with dummy variables to analyze quarterly sales. The regression equation is $SALES_t = \beta_0 + \beta_2 D_{2,t} + \beta_3 D_{3,t} + \beta_4 D_{4,t} + \epsilon_t$, where $SALES_t$ is a quarterly observation of sales, $D_{2,t} = 1$ if period t is the second quarter and 0 otherwise, $D_{3,t} = 1$ if period t is the third quarter and 0 otherwise, and $D_{4,t} = 1$ if period t is the fourth quarter and 0 otherwise. The intercept term β_0 represents the average value of sales for the:

一位消费品公司的金融分析师正在使用包含虚拟变量的回归模型来分析季度销售额。回归方程为 $SALES_t = \beta_0 + \beta_2 D_{2,t} + \beta_3 D_{3,t} + \beta_4 D_{4,t} + \epsilon_t$ ，其中 $SALES_t$ 是季度销售额的观测值，当 t 为第二季度时 $D_{2,t} = 1$ ，否则 $D_{2,t} = 0$ ，当 t 为第三季度时 $D_{3,t} = 1$ ，否则 $D_{3,t} = 0$ ，当 t 为第四季度时 $D_{4,t} = 1$ ，否则 $D_{4,t} = 0$ 。截距项 β_0 代表第：

- A. Fourth quarter
第四季度
- B. Second quarter
第二季度

C. First quarter
第一季度

D. Third quarter
第三季度

答案:C

解析:

A 选项错误。

- 当处于第四季度时, $D_{4,t} = 1$, 此时销售的平均值为 $\beta_0 + \beta_4$, 并非 β_0 , 所以该选项错误。

B 选项错误。

- 当处于第二季度时, $D_{2,t} = 1$, 销售的平均值为 $\beta_0 + \beta_2$, 不是 β_0 , 所以该选项错误。

C 选项正确。

- 在这个回归模型中, 没有为第一季度设置虚拟变量。当所有虚拟变量 $D_{2,t} = D_{3,t} = D_{4,t} = 0$ 时, 即代表第一季度, 此时回归方程变为 $SALES_t = \beta_0 + \epsilon_t$, 所以截距项 β_0 代表第一季度销售的平均值。

D 选项错误。

- 当处于第三季度时, $D_{3,t} = 1$, 销售的平均值为 $\beta_0 + \beta_3$, 不是 β_0 , 所以该选项错误。

考察: 虚拟变量在回归模型中的含义 (理解未设置虚拟变量的类别对应的是截距项所代表的情况)

3. A risk analyst at a financial forecasting firm is evaluating different scenarios for building a forecasting model. Which of the following scenarios would lead to a forecasting model that exhibits perfect multicollinearity?

一位金融预测公司的风险分析师正在评估不同的场景来构建预测模型。哪一种场景会导致一个显示完全多重共线性的预测模型?

A. A model that includes a trading - day variation variable for modeling trading volume throughout the year.
一个包含交易天数变化变量的模型, 用于模拟全年的交易量。

B. A model that includes a holiday variation variable that accounts for an “Easter dummy variable.”
一个包含假日变化变量的模型, 用于捕捉复活节虚拟变量的影响。

C. A model that includes only one seasonal dummy that is equal to 1.
一个只包含一个季节性虚拟变量等于 1 的模型。

D. A model that includes a dummy variable for each season, plus an intercept.
一个包含每个季节的虚拟变量加上截距项的模型。

答案:D

解析:

A 选项错误。

- 交易天数变化变量用于模拟全年的交易量, 它本身不会导致模型出现完全多重共线性。该变量可以合理地解释交易量随交易天数的变化, 不存在与其他变量之间的线性依赖关系, 所以该选项错误。

B 选项错误。

- 包含复活节虚拟变量的假日变化变量, 它只是用来捕捉假日对模型的影响, 一般不会与其他变量产生完全的线性关系, 不会导致完全多重共线性, 所以该选项错误。

C 选项错误。

- 仅包含一个始终等于 1 的季节性虚拟变量, 它不会与其他变量产生完全的线性组合关系, 不会造成完全多重共线性, 所以该选项错误。

D 选项正确。

- 在回归模型中，如果为每个季节都设置一个虚拟变量，再加上截距项，就会出现完全多重共线性。因为季节虚拟变量的和是一个常数（如果有 4 个季节，4 个虚拟变量之和始终为 1），再加上截距项，就会导致变量之间存在精确的线性关系，使得模型无法准确估计参数。

考察：回归模型中完全多重共线性的判断（虚拟变量数量设置不当会导致多重共线性）

4. A financial analyst at an investment firm is examining the Augmented Dickey - Fuller (ADF) test results for the growth rate of real GDP to determine whether a unit root exists. The figure below shows the ADF test results. Column γ reports the parameter estimate from the ADF test regression and the ADF statistic (in parentheses). The columns δ_0 and δ_1 report estimates of the constant and linear trend along with t - Statistics. The final column reports the 5% critical values. Which of the following statements is correct?

Deterministic	γ	δ_0	δ_1	5% CV
Trend	-0.856 (-9.234)	9.12e-03 (6.321)	-1.65e-05 (-2.567)	-3.512

一位投资公司的金融分析师正在检查实际 GDP 增长率单位根存在的 ADF 检验结果。下图显示了 ADF 检验结果。列 γ 报告了 ADF 检验回归的参数估计和 ADF 统计量（括号内）。列 δ_0 和 δ_1 报告了常数和线性趋势的估计以及 t 统计量。最后一列报告了 5% 的临界值。哪一项陈述是正确的？

确定性项	γ	δ_0	δ_1	5% 临界值
趋势	-0.856 (-9.234)	9.12e-03 (6.321)	-1.65e-05 (-2.567)	-3.512

- A. An ADF test will reject the hypothesis that a process is a unit root if the coefficient on the lagged value is statistically significantly equal to zero.
如果滞后值的系数统计显著地等于零，ADF 检验将拒绝单位根过程的原假设。
- B. The real GDP growth rate does not contain a unit root.
实际 GDP 增长率不包含单位根。
- C. The real GDP growth rate does contain a unit root.
实际 GDP 增长率包含单位根。
- D. The real GDP growth rate is covariance stationary as γ is significantly equal to zero.
实际 GDP 增长率是协方差平稳的，因为 γ 统计显著地等于零。

答案:B

解析：

A 选项错误。

- 在 ADF 检验中，原假设是存在单位根，备择假设是不存在单位根。如果滞后值的系数统计显著地小于零，才会拒绝存在单位根的原假设，而不是等于零，所以 A 选项错误。

B 选项正确。

- ADF 统计量为 -9.234，5% 的临界值为 -3.512，ADF 统计量的绝对值大于临界值的绝对值，故应拒绝原假设（存在单位根），实际 GDP 增长率不包含单位根，B 选项正确。

C 选项错误。

- 由上述 ADF 检验结果可知，拒绝了存在单位根的原假设，即实际 GDP 增长率不包含单位根，C 选项错误。

D 选项错误。

- 若时间序列是协方差平稳的，ADF 检验中 γ 应显著不为零，D 选项错误。

考察：单位根检验（掌握 ADF 检验的假设和结果判断标准）

5. A research analyst at the World Bank is studying global economic growth patterns. The analyst observes that the world economy’s growth rate can be approximated as a constant percentage increase year over year. Which of the following time series trend models would be most appropriate for estimating GDP?

一位世界银行的研究分析师正在研究全球经济增长模式。分析师观察到世界经济的增长率可以近似为每年固定的百分比增长。哪一种时间序列趋势模型最适合估计 GDP？

A. A quadratic trend model: $GDP_t = \delta_0 + \delta_1 t + \delta_2 t^2$
二次趋势模型： $GDP_t = \delta_0 + \delta_1 t + \delta_2 t^2$

B. A log-log model: $\ln GDP_t = \ln(\delta_0) + \delta_1 \ln t$
对数-对数模型： $\ln GDP_t = \ln(\delta_0) + \delta_1 \ln t$

C. A linear trend model: $GDP_t = \delta_0 + \delta_1 t$
线性趋势模型： $GDP_t = \delta_0 + \delta_1 t$

D. A log-linear model: $\ln GDP_t = \delta_0 + \delta_1 t$
对数线性模型： $\ln GDP_t = \delta_0 + \delta_1 t$

答案:D

解析:

A 选项错误。

- 二次趋势模型意味着 GDP 增长率会随时间变化，与题设的固定增长率假设不符。

B 选项错误。

- 对数-对数模型表示 GDP 的增长率与时间的对数成正比，这与固定增长率假设不符。

C 选项错误。

- 线性趋势模型表示 GDP 每期增加固定值，而不是固定比例，与固定增长率假设不符。

D 选项正确。

- 当经济以固定增长率 g 增长时，有：

$$GDP_t = GDP_0(1 + g)^t$$

- 对上式两边取对数：

$$\ln GDP_t = \ln GDP_0 + t \ln(1 + g)$$

- 令 $\delta_0 = \ln GDP_0$ ， $\delta_1 = \ln(1 + g)$ ，得到：

$$\ln GDP_t = \delta_0 + \delta_1 t$$

- 这种对数线性模型能够准确反映固定增长率的特征，且参数 δ_1 直接反映了经济的增长率。

考察: 时间序列趋势模型的选择（关键是理解不同模型隐含的增长方式及其经济学含义）

6. A data analyst at a paper manufacturing company is building a regression model to analyze the monthly effects on sales. The model needs to account for all 12 months of the year. Which of the following model specifications would result in perfect multicollinearity?

一位造纸公司的数据分析师正在建立一个回归模型来分析每月销售的影响。模型需要考虑全年 12 个月的所有因素。哪一种模型规格会导致完全多重共线性？

A. A model without an intercept term that includes 12 dummy variables
一个不含截距项的模型，包含 12 个哑变量

B. A model with an intercept term that includes 11 dummy variables
一个含截距项的模型，包含 11 个哑变量

C. A model with an intercept term that includes 12 dummy variables
一个含截距项的模型，包含 12 个哑变量

D. None of the above models would result in perfect multicollinearity
以上模型都不会导致完全多重共线性

答案:C

解析:

A 选项错误。

• 在不含截距项的模型中加入 12 个哑变量，由于没有截距项，这些哑变量之间不会产生完全线性关系，不会导致多重共线性。

B 选项错误。

• 在含截距项的模型中加入 11 个哑变量是正确的做法。这种情况下，第 12 个月的效应将被包含在截距项中，避免了多重共线性问题。

C 选项正确。

• 考生应注意，假设季节性因素的重复周期为 s 期。如果线性回归模型中含截距项，那么模型中只能包含 $s-1$ 个哑变量，加入 s 个哑变量会导致多重共线性。而如果模型中不包含截距项，则加入 s 个哑变量不会导致多重共线性。

D 选项错误。

• 选项 C 的情况明显会导致多重共线性，所以不能说所有模型都不会导致多重共线性。

考察：回归模型中虚拟变量的设置（含截距项时虚拟变量的数量应比类别数少 1）

7. A quantitative analyst at a global investment bank is developing time series models for forecasting market movements. While examining various financial time series, the analyst needs to properly identify and handle unit roots to ensure model accuracy. Based on the analyst's research materials, which of the following statements about time series analysis is incorrect?

一位全球投资银行的量化分析师正在开发时间序列模型来预测市场走势。在检查各种金融时间序列时，分析师需要正确识别和处理单位根，以确保模型准确性。基于分析师的研究材料，哪一项关于时间序列分析的陈述是不正确的？

A. A time series containing a unit root may exhibit spurious regression results, where seemingly meaningful relationships could actually be economically meaningless.

包含单位根的时间序列可能出现伪回归现象，即看似有意义的回归关系实际上可能无法解释经济现象。

B. For an AR(1) model, when the random walk time series is below its mean value, its mean value must be negative.

C. The PACF of an MA(1) model shows a decay pattern, while its ACF shows a cut-off pattern.

MA(1) 模型的 PACF 显示衰减模式，而 ACF 显示截断模式。

D. In ARMA models, the stationarity of time series can be tested using the Dickey-Fuller distribution, and the asymmetry of this distribution complicates model selection.

ARMA 模型中，时间序列的平稳性可以通过 Dickey-Fuller 分布进行检验，该分布的非对称性确实给模型选择带来了困难。

答案:B

解析：

A 选项正确。

• 包含单位根的时间序列可能出现伪回归现象，即非平稳时间序列的回归结果看似有意义但实际上可能无法解释经济现象。

B 选项错误。

• 对于 AR(1) 模型，当随机游走的时间序列处于均值水平以下时，其均值并不一定是负的，而是存在一个确定的均值，只是这个均值可能随时间变化。

C 选项正确。

• MA(1) 模型的 PACF 呈现衰减现象，而 ACF 呈现截尾现象，这是 MA(1) 模型的典型特征。

D 选项正确。

• 在 ARMA 模型中，时间序列的平稳性可以通过 Dickey-Fuller 分布进行检验，该分布的非对称性确实给模型选择带来了困难。

考察：时间序列的单位根检验（理解单位根对时间序列建模的影响）

8. A derivatives trader at Morgan Stanley is developing a mean-reversion trading strategy for interest rate products. While reviewing the statistical properties of various interest rate series, she needs to understand the implications of unit roots for her

trading strategy. Based on her research materials, which of the following statements about unit root processes is incorrect?
一位摩根士丹利的衍生品交易员正在开发一个均值回归交易策略用于利率产品。在审查各种利率序列的统计特性时，她需要理解单位根对她交易策略的影响。基于她的研究材料，哪一项关于单位根过程的陈述是不正确的？

- A. Unit roots has no different with covariance-stationary processes in terms of mean-reversion properties
单位根与协方差平稳过程在均值回归特性方面没有区别
- B. Parameter estimators in interest rate models containing a unit root follow what is called a Dickey-Fuller (DF) distribution
利率模型中包含单位根的参数估计服从被称为 Dickey-Fuller（DF）分布
- C. When an interest rate series contains a unit root, it may show spurious relationships with other rates that have a time trend or a unit root
当利率序列包含单位根时，它可能与具有时间趋势或单位根的其他利率显示虚假关系
- D. A unit root process in interest rates does not exhibit mean-reversion behavior
利率中的单位根过程不表现出均值回归行为

答案:A

解析:

A 选项错误。

- 具有单位根的过程与协方差平稳过程有本质区别：
 - 1. 单位根过程是非平稳的，其方差会随时间增加而增加
 - 2. 协方差平稳过程的均值和方差都是常数，且自相关函数只依赖于时间间隔
 - 3. 单位根过程的冲击具有持久性影响，而平稳过程的冲击影响会逐渐消失

B 选项正确。

- 当时间序列包含单位根时，ARMA 模型的参数估计确实服从 Dickey-Fuller 分布，这是一个非对称的分布，与标准的 t 分布不同。

C 选项正确。

- 当时间序列包含单位根时，容易与其他具有时间趋势或单位根的序列产生虚假回归关系，这种现象在金融时间序列分析中很常见。

D 选项正确。

- 单位根过程不具有均值回复特性，这意味着序列的偏离不会自动回到某个长期均衡水平。

考察：单位根过程的特征（理解单位根过程与协方差平稳过程的区别）

9. A quantitative researcher at BlackRock is analyzing various time series models for asset price forecasting. While studying the properties of covariance-stationary processes and their implications for financial modeling, which of the following statements is correct?

一位黑石公司的量化研究员正在分析各种时间序列模型用于资产价格预测。在研究协方差平稳过程的特性以及对金融建模的影响时，哪一项陈述是正确的？

- A. The Augmented Dickey-Fuller (ADF) specification is the most widely used white noise test
Augmented Dickey-Fuller（ADF）规范是最广泛使用的白噪声检验
- B. If the ADF rejects the null that the series contains a unit root, then the series should be differenced
如果 ADF 拒绝了序列包含单位根的原假设，则序列应该被差分
- C. Random walks and unit root processes are most important source of non-stationarity in economic time series
随机游走和单位根过程是经济时间序列非平稳性的最主要来源
- D. To test the hypothesis that the autocorrelations of a time series are jointly equal to zero based on a small sample, an analyst should most appropriately calculate a Box-Pierce (BP) Q-statistic
基于小样本，检验时间序列的自相关系数联合等于零的假设，分析师应该最适当地计算 Box-Pierce（BP）Q 统计量

答案:C

解析:

A 选项错误。

- ADF 检验是用于检验单位根的，而不是白噪声检验。白噪声检验通常使用 Ljung-Box 检验或 Box-Pierce 检验。

B 选项错误。

- 如果 ADF 检验拒绝了存在单位根的原假设，说明序列是平稳的，此时不需要对序列进行差分处理。只有当序列存在单位根时，才需要通过差分来使序列平稳化。

C 选项正确。

- 随机游走和单位根过程确实是经济时间序列中非平稳性的最主要来源：
 1. 许多经济和金融变量，如股票价格、汇率等，往往表现出随机游走特征
 2. 这些序列的均值和方差会随时间变化，不满足协方差平稳的要求
 3. 单位根过程的冲击具有持久性影响，不会随时间消失

D 选项错误。

- 对于小样本，应该使用 Ljung-Box Q 统计量而不是 Box-Pierce Q 统计量，因为 Ljung-Box Q 统计量在小样本情况下表现更好。

考察: 协方差平稳过程的特征（关键是理解随机游走和单位根过程对非平稳性的影响）

10. A senior econometrician at the Federal Reserve Bank of New York is analyzing the stationarity of various interest rate series. The econometrician applies the Augmented Dickey-Fuller (ADF) test to determine if a particular interest rate series is a random walk. If the time series is covariance-stationary, how would this be reflected in the ADF test result?

一位纽约联邦储备银行的高级计量经济学家正在分析各种利率序列的平稳性。计量经济学家应用 Augmented Dickey-Fuller (ADF) 检验来确定特定的利率序列是否为随机游走。如果时间序列是协方差平稳的，这个结果在 ADF 检验中如何体现？

- A. Fail to reject the null hypothesis, and the t-statistic is large and positive
未能拒绝原假设，且 t 统计量较大且为正
- B. Fail to reject the null hypothesis, and the t-statistic is large and negative
未能拒绝原假设，且 t 统计量较大且为负
- C. Reject the null hypothesis, and the t-statistic is large and negative
拒绝原假设，且 t 统计量较大且为负
- D. Reject the null hypothesis, and the t-statistic is large and positive
拒绝原假设，且 t 统计量较大且为正

答案:C

解析:

ADF 检验的基本原理:

- ADF 检验的原假设 $H_0 : \gamma = 0$ （序列是随机游走）
- 备择假设 $H_1 : \gamma < 0$ （序列是协方差平稳的）
- 若要证明序列是协方差平稳的，需要拒绝原假设

ADF 检验的特点:

- ADF 检验关注分布的左尾，拒绝域在左侧
- 当检验统计量显著为负（即大的负值）时，落入拒绝域
- 此时可以拒绝原假设，说明序列是协方差平稳的

选项分析：

- 选项 C 正确：拒绝原假设且 t 统计量为大的负值，说明序列是协方差平稳的
- 其他选项错误：要么未能拒绝原假设，要么 t 统计量方向错误

考察：ADF 检验的原理和判断（关键是理解 ADF 检验的假设和拒绝域）

3 考点 3: Measuring Returns, Volatility and Correlation 测量回报、波动性和相关性

1. A risk analyst at a global investment bank is analyzing market data from May 16th during the COVID-19 pandemic. On that day, the S&P 500 index experienced a steep decline that triggered automatic trading halts designed to curb panic selling. The index fell from the previous close of 2,711.02 to 2,386.13. Calculate both the simple daily return and the daily log return for this market movement.

一位全球投资银行的风险分析师正在分析 2020 年 5 月 16 日 COVID-19 疫情期间的市场数据。在那一天，S&P 500 指数经历了一次陡峭的下跌，触发了一系列自动交易暂停，旨在遏制恐慌性抛售。指数从前一收盘价 2,711.02 下跌到 2,386.13。计算这个市场运动的简单日收益率和日对数收益率。

- A. Simple return: -13.62%, Log return: -12.77%
简单收益率：-13.62%，对数收益率：-12.77%
- B. Simple return: 13.62%, Log return: 11.65%
简单收益率：13.62%，对数收益率：11.65%
- C. Simple return: 11.98%, Log return: 12.77%
简单收益率：11.98%，对数收益率：12.77%
- D. Simple return: -11.98%, Log return: -12.77%
简单收益率：-11.98%，对数收益率：-12.77%

答案:D

解析：

步骤 1：计算简单收益率

- 简单收益率计算公式：Simple return = $\frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$
- 代入数据： $\frac{2386.13 - 2711.02}{2711.02} = -11.98\%$

步骤 2：计算对数收益率

- 对数收益率计算公式：Log return = $\ln(\frac{P_t}{P_{t-1}}) = \ln(P_t) - \ln(P_{t-1})$
- 代入数据： $\ln(2386.13) - \ln(2711.02) = -12.77\%$

考察：收益率的计算（掌握简单收益率和对数收益率的计算方法及其区别）

2. A risk analyst at a quantitative investment firm has collected the following data for four different distributions. The analyst wants to determine which datasets are likely to be drawn from a normal distribution at the 95% confidence level, where the chi - squared critical value is 5.99.

Dataset	Skew	Kurtosis	T	JB
A	0.92	3.05	60	5.85
B	0.92	3.05	61	6.10
C	0.42	3.42	150	3.20
D	0.42	3.42	300	6.40

一位量化投资公司的风险分析师收集了四个不同分布的数据。分析师希望确定在 95% 置信水平下，哪些数据集可能来自正态分布，其中卡方临界值为 5.99。

数据集	偏度	峰度	T	JB
A	0.92	3.05	60	5.85
B	0.92	3.05	61	6.10
C	0.42	3.42	150	3.20
D	0.42	3.42	300	6.40

- A. Dataset A and C
数据集 A 和 C
- B. Dataset B and C
数据集 B 和 C
- C. Dataset A and D
数据集 A 和 D
- D. Dataset B and D
数据集 B 和 D

答案:A

解析:

在判断数据集是否来自正态分布时，使用 Jarque - Bera（JB）检验，原假设 H_0 是数据集服从正态分布。当 JB 统计量小于临界值时，不能拒绝原假设，即认为数据集可能来自正态分布。已知临界值为 5.99，数据集 A 的 JB 统计量为 5.85，小于临界值；数据集 C 的 JB 统计量为 3.20，也小于临界值，不能拒绝原假设，故数据集 A 和 C 可能来自正态分布，故选项 A 正确。

考察: 使用 Jarque - Bera 检验判断数据集是否来自正态分布（比较 JB 统计量与临界值）

3. A risk analyst at a retail bank is analyzing the number of visitors to its branches. The number of visitors follows the power-law distribution where $Prob(v > X) = k \times X^{-\alpha}$ with $\alpha = 2.0$. Suppose that 4.0% of branches get 400 or more visitors per day. What percentage of branches get 1600 or more visitors per day?

一位零售银行的风险分析师正在分析其分支机构的访客数量。访客数量遵循幂律分布，其中 $Prob(v > X) = k \times X^{-\alpha}$ ， $\alpha = 2.0$ 。假设 4.0% 的分支机构每天有 400 或更多访客。每天有多少百分比的分支机构有 1600 或更多访客？

- A. 0.25%
- B. 0.5%
- C. 1.0%
- D. 2.0%

答案:A

解析:

步骤 1：确定常数 k 。

- 已知当 $X = 400$ 时， $Prob(v > 400) = 0.04$ ，代入公式： $0.04 = k \times 400^{-2.0}$ 。
- 解得： $k = 0.04 \times 400^{2.0} = 0.04 \times 160,000 = 6,400$ 。

步骤 2：计算 $X = 1600$ 时的概率。

- $Prob(v > 1600) = 6,400 \times 1600^{-2.0} = 6,400 \times \frac{1}{1600^2}$ 。
- 计算得： $6,400 \times \frac{1}{2,560,000} = 0.25\%$ 。
- 简便计算： $\left(\frac{400}{1600}\right)^{2.0} = \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}$ ，因此概率衰减为原来的 1/16（ $4\% \times \frac{1}{16} = 0.25\%$ ）。

考察：幂律分布的概率计算（关键在于掌握幂律分布的概率计算公式）

4. A risk analyst at a financial firm is analyzing the relationship between the returns of two stocks, Stock X and Stock Y. The analyst has collected the historical returns of these two stocks over a six - year period from 2015 to 2020, as presented in the table below:

Year	X	Y
2015	4.0%	-11.0%
2016	55.0%	-6.0%
2017	-13.0%	22.0%
2018	-22.0%	44.0%
2019	33.0%	13.0%
2020	45.0%	18.0%

What is the Kendall τ correlation coefficient for the stock returns of X and Y?

一位金融公司的风险分析师正在分析两只股票（股票 X 和股票 Y）收益率之间的关系。该分析师收集了这两只股票在 2015 年至 2020 年六年期间的历史收益率，如下表所示：

年份	X	Y
2015	4.0%	-11.0%
2016	55.0%	-6.0%
2017	-13.0%	22.0%
2018	-22.0%	44.0%
2019	33.0%	13.0%
2020	45.0%	18.0%

股票 X 和 Y 收益率的 Kendall τ 相关系数是多少？

- A. -0.5
- B. -0.2
- C. -0.6
- D. 0.3

答案:A

解析:

步骤 1：对数据进行排序并确定排名

- 首先，根据股票 X 的收益率对数据进行从小到大排序，并确定每一年数据在 X 和 Y 上的排名。排序后的数据如下：

Year	X	Y	X Rank	Y Rank
2015	4.0%	-11.0%	3	1
2016	55.0%	-6.0%	6	2
2017	-13.0%	22.0%	2	5
2018	-22.0%	44.0%	1	6
2019	33.0%	13.0%	4	3
2020	45.0%	18.0%	5	4

步骤 2：计算一致对和不一致对的数量

- 一致对（Concordant Pairs）是指对于两对数据 (i, j) 和 (k, l) ，如果 $(X_i - X_k)(Y_j - Y_l) > 0$ ；不一致对（Discordant Pairs）是指 $(X_i - X_k)(Y_j - Y_l) < 0$ 。
- 经过计算，一致对的数量 $n_c = 4$ ，不一致对的数量 $n_d = 11$ 。

步骤 3：计算 Kendall τ 相关系数

- Kendall τ 相关系数的计算公式为 $\tau = \frac{n_c - n_d}{\frac{n(n-1)}{2}}$ ，其中 n 是样本数量，这里 $n = 6$ 。
- $\tau = \frac{n_c - n_d}{\frac{n(n-1)}{2}} = \frac{4 - 11}{\frac{6 \times (6-1)}{2}} = -0.47 \approx -0.5$ 。

考察：Kendall τ 相关系数的计算（关键在于准确计算一致对和不一致对的数量）

5. A risk analyst at an investment firm is trying to assess the relationship between the returns of two stocks, Stock X and Stock Y. The analyst has collected the historical returns of these stocks over a six - year period from 2015 to 2020, as shown in the table below:

Year	X	Y
2015	6.0%	-13.0%
2016	65.0%	-7.0%
2017	-14.0%	26.0%
2018	-26.0%	52.0%
2019	39.0%	17.0%
2020	48.0%	22.0%

What is the Spearman rank correlation coefficient for the stock returns of X and Y?

一位投资公司的风险分析师正在尝试评估两只股票（股票 X 和股票 Y）收益率之间的关系。该分析师收集了这两只股票在 2015 年至 2020 年六年期间的历史收益率，如下表所示：

年份	X	Y
2015	6.0%	-13.0%
2016	65.0%	-7.0%
2017	-14.0%	26.0%
2018	-26.0%	52.0%
2019	39.0%	17.0%
2020	48.0%	22.0%

股票 X 和 Y 收益率的 Spearman 秩相关系数是多少？

- A. -0.6
- B. -0.4
- C. 0.4
- D. 0.6

答案:A

解析:

步骤 1：对数据进行排名

- 分别对股票 X 和股票 Y 的收益率进行从小到大排序，并确定每个年份对应的排名。排序后的数据及排名如下：

Year	X	Y	X Rank	Y Rank	d_i	d_i^2
2018	-26.0%	52.0%	1	6	-5	25
2017	-14.0%	26.0%	2	5	-3	9
2015	6.0%	-13.0%	3	1	2	4
2019	39.0%	17.0%	4	3	1	1
2020	48.0%	22.0%	5	4	1	1
2016	65.0%	-7.0%	6	2	4	16
sum						56

- 其中 d_i 是 X 排名与 Y 排名的差值， d_i^2 是 d_i 的平方。

步骤 2：计算 Spearman 秩相关系数 ρ_S

- Spearman 秩相关系数的计算公式为 $\rho_S = 1 - \frac{6 \times \sum_{i=1}^n d_i^2}{n(n^2-1)} = 1 - \frac{6 \times 56}{6 \times (36-1)} = 1 - \frac{56}{35} = 0.6$ 。

考察: Spearman 秩相关系数（关键是掌握 Spearman 秩相关系数的计算步骤及公式）

6. A risk analyst at a hedge fund is examining a dataset of quarterly returns for a particular financial instrument. To assess whether the returns of this instrument follow a normal distribution, the analyst intends to use the Jarque - Bera test. Which of the following statements about the Jarque - Bera test is accurate?

一位对冲基金的风险分析师正在检查某个金融工具的季度收益率数据。为了评估该工具的收益率是否服从正态分布，分析师打算使用 Jarque - Bera 检验。哪一项关于 Jarque - Bera 检验的陈述是正确的？

- A. The Jarque - Bera test statistic relies solely on the mean and variance of the return distribution.
Jarque - Bera 检验统计量仅依赖于收益率分布的均值和方差。
- B. The Jarque - Bera test statistic follows a chi - square distribution.
Jarque - Bera 检验统计量服从卡方分布。
- C. The Jarque - Bera test necessitates the application of a Clayton copula to the return data prior to testing.
Jarque - Bera 检验需要在对收益率数据应用 Clayton copula 之前进行测试。
- D. The Jarque - Bera test is unaffected by the sample size of the return dataset.
Jarque - Bera 检验不受收益率数据集样本大小的影响。

答案:B

解析:

A 选项错误。

- Jarque - Bera 检验统计量主要考虑的是分布的偏度（skewness）和峰度（kurtosis），并非仅仅依赖于均值和方差。其公式为 $JB = (T - 1) \left[\frac{S^2}{6} + \frac{(K-3)^2}{24} \right]$ ，其中 S 是偏度， K 是峰度， n 是样本数量。

B 选项正确。

- 在原假设（数据服从正态分布）成立的情况下，Jarque - Bera 检验统计量服从自由度为 2 的卡方（ χ^2 ）分布。这是该检验的一个重要性质，用于判断样本数据是否来自正态分布。

C 选项错误。

- Jarque - Bera 检验是直接基于样本数据的偏度和峰度来判断分布是否为正态分布，不需要应用 Clayton copula 或其他类型的 copula。Copula 主要用于描述变量之间的相关性结构，与 Jarque - Bera 检验的原理无关。

D 选项错误。

- 从 Jarque - Bera 检验统计量的公式 $JB = (T - 1) \left[\frac{S^2}{6} + \frac{(K-3)^2}{24} \right]$ 可以看出，样本数量 n 是该统计量的一个重要组成部分，样本大小会影响检验统计量的值，进而影响检验结果。

考察: Jarque - Bera 检验的原理和性质（Jarque - Bera 检验统计量服从卡方分布）

7. A risk analyst at a credit risk assessment firm has credit ratings for 40 companies from two different rating agencies, Agency A and Agency B. The ratings fall into five categories:

- Rating 1: Super - high investment grade
- Rating 2: High investment grade
- Rating 3: Mid investment grade
- Rating 4: Low investment grade
- Rating 5: Non - investment grade

The analyst wants to understand the relationship between the rating categories given by the two agencies. Which of the following statistical measures would be the most appropriate to approximate the link between the rating categories from the two agencies?

一位信用评级公司的风险分析师有两家不同的评级机构，Agency A 和 Agency B，对 40 家公司进行了信用评级。评级分为五个类别：

- 评级 1：超级高投资级
- 评级 2：高投资级
- 评级 3：中投资级
- 评级 4：低投资级
- 评级 5：非投资级

分析师想要理解两家评级机构给出的评级类别之间的关系。哪一种统计量最合适来近似两家评级机构评级类别之间的联系？

- A. Pearson correlation
Pearson 相关系数
- B. Structured covariance matrix
结构化协方差矩阵
- C. Spearman correlation
Spearman 秩相关系数
- D. Multivariate regression coefficient
多元回归系数

答案:C

解析:

A 选项错误。

- Pearson 相关系数主要用于衡量两个连续变量之间的线性关系。而这里的信用评级是有序分类变量，并非连续变量，Pearson 相关系数不能很好地反映有序分类变量之间的关系。

B 选项错误。

- 结构化协方差矩阵通常用于描述多个变量之间的协方差关系，它更侧重于变量之间的线性关联程度，对于有序分类变量的关联性衡量并不合适。协方差主要适用于连续变量，不能很好地处理有序分类数据。

C 选项正确。

- Spearman 秩相关系数是基于数据的排名来计算的，它不依赖于变量的具体数值，而是关注变量的相对顺序。对于有序分类变量，如这里的信用评级，Spearman 秩相关系数能够很好地衡量两个变量之间的单调关系，即随着一个变量的等级增加，另一个变量的等级是增加还是减少，因此可以用来近似两个评级机构评级类别之间的联系。

D 选项错误。

- 多元回归系数主要用于建立自变量与因变量之间的线性回归模型，以预测因变量的值。在本题中，我们的目的是衡量两个评级机构评级类别之间的关联性，而不是进行预测，所以多元回归系数不适用。

考察: 不同统计量对有序分类变量关联性的衡量（Spearman Correlation 的应用）

8. A risk analyst at an asset management firm is applying the Jarque - Bera test to determine if a client’s portfolio return follows a normal distribution. The analyst gathers the past 2 - year data (assuming 504 trading days). After using statistical software to calculate the moments of the return data, the software shows an estimated skewness of - 0.25 and an estimated kurtosis of 4.1. Calculate the Jarque - Bera test - statistic and make a decision using a significance level of 5% (where the critical value is 5.99).

一位资产管理公司的风险分析师正在应用 Jarque - Bera 检验来确定客户的投资组合收益率是否服从正态分布。分析师收集了过去 2 年的数据（假设 504 个交易日）。使用统计软件计算收益率数据的矩，软件显示估计的偏度为-0.25，估计的峰度为 4.1。计算 Jarque - Bera 检验统计量，并使用 5% 的显著性水平做出决策（临界值为 5.99）。

- A. $JB = 30.6$, and we reject the null hypothesis that the portfolio return is normally distributed.
 $JB = 30.6$, 我们拒绝投资组合收益率服从正态分布的原假设。
- B. $JB = 30.6$, and we do not reject the null hypothesis that the portfolio return is normally distributed.
 $JB = 30.6$, 我们不拒绝投资组合收益率服从正态分布的原假设。
- C. $JB = 2.1$, and we reject the null hypothesis that the portfolio return is normally distributed.
 $JB = 2.1$, 我们拒绝投资组合收益率服从正态分布的原假设。
- D. $JB = 2.1$, and we do not reject the null hypothesis that the portfolio return is normally distributed.
 $JB = 2.1$, 我们不拒绝投资组合收益率服从正态分布的原假设。

答案:A

解析:

步骤 1：明确 Jarque - Bera 检验统计量公式

- Jarque - Bera 检验统计量的计算公式为 $JB = (T - 1) \left[\frac{S^2}{6} + \frac{(K-3)^2}{24} \right]$ ，其中 T 是样本数量， S 是偏度， K 是峰度。

步骤 2：代入数据计算 Jarque - Bera 检验统计量

- 已知 $n = 504$, $S = -0.25$, $K = 4.1$ 。
- 则 $JB = (T - 1) \times \left(\frac{S^2}{6} + \frac{(K-3)^2}{24} \right) = (504 - 1) \times \left(\frac{(-0.25)^2}{6} + \frac{(4.1-3)^2}{24} \right) = 30.6$ 。

步骤 3：根据检验统计量和临界值进行决策

- 给定的临界值为 5.99，由于计算得到的 $JB = 30.6 > 5.99$ ，落在拒绝域内，应拒绝投资组合收益率服从正态分布的原假设，选项 A 正确。

考察: Jarque-Bera 检验统计量的计算及假设检验决策（关键是掌握 Jarque-Bera 检验统计量计算公式）

9. A financial analyst at a consulting firm is examining the relationships between several financial variables. The analyst is considering using Pearson correlation, Spearman rank correlation, and Kendall's to understand the associations. Which of the following statements about these correlation measures is correct?

一位咨询公司的金融分析师正在检查几个金融变量之间的关系。分析师考虑使用皮尔逊相关系数、斯皮尔曼秩相关系数和肯德尔 来理解变量之间的关系。哪一项关于这些相关系数度量的陈述是正确的？

- A. A zero Spearman rank correlation implies there is no linear relationship between variables.
斯皮尔曼秩相关系数为零意味着变量之间不存在线性关系。
- B. Both Pearson correlation and Kendall's are suitable for measuring all non - monotonic relationships.
皮尔逊相关系数和肯德尔 都适合测量所有非单调关系。
- C. The Pearson correlation is designed for linear dependence, whereas Spearman rank correlation and Kendall's are used to assess monotonic relationships.
皮尔逊相关系数用于衡量线性依赖，而斯皮尔曼秩相关系数和肯德尔 用于衡量单调关系。
- D. Insignificant differences between the Pearson correlation and rank correlation suggest there is a strong linear relationship between variables.
皮尔逊相关系数和秩相关系数之间的显著差异表明变量之间存在强线性关系。

答案:C

解析:

A 选项错误。

- Spearman 秩相关系数衡量的是变量之间的单调关系，而非线性关系。当 Spearman 秩相关系数为 0 时，只能说明变量之间不存在单调关系，不能说明不存在线性关系。

B 选项错误。

- Pearson 相关系数主要用于衡量变量之间的线性关系，对于非单调关系的衡量效果不佳。Kendall's 主要用于衡量变量之间的单调关系，也不能很好地衡量所有非单调关系。

C 选项正确。

- Pearson 相关系数是基于变量的实际值来计算的，用于衡量变量之间的线性依赖程度。Spearman 秩相关系数和 Kendall's 都是基于变量的秩次（排名）来计算的，它们可以衡量变量之间的单调关系，即随着一个变量的增加，另一个变量是增加（正单调）还是减少（负单调）。

D 选项错误。

- 当变量具有线性关系时，秩相关和线性相关通常在大小上是相似的。当 Pearson 相关系数和秩相关系数之间存在显著差异时，通常表明变量之间可能存在非线性关系。

考察: 不同相关系数的适用范围和特点（理解 Pearson correlation、Spearman correlation 和 Kendall's 分别适用于何种类型的变量关系）

10. A risk analyst at a fixed - income investment firm is conducting a risk assessment on a bond portfolio, specifically focusing on the tail risk. When evaluating the dependence between a high - yield corporate bond and a long - term U.S. Treasury bond, the analyst is interested in measuring their nonlinear dependence. The analyst is considering using Pearson's correlation, Spearman's correlation, or Kendall's tau for this purpose. Which of the following statements about these measurements is most likely correct?

一位固定收益投资公司的风险分析师正在对债券投资组合进行风险评估，特别关注尾部风险。在评估高收益企业债券和长期美国国债之间的依赖关系时，分析师对测量它们的非线性依赖感兴趣。分析师考虑使用皮尔逊相关系数、斯皮尔曼相关系数或肯德尔 来进行此目的。哪一项关于这些度量的陈述最可能正确？

- A. Pearson's correlation is more suitable for measuring nonlinear dependence as it takes the ranks of observations into consideration.
皮尔逊相关系数更适合测量非线性依赖，因为它考虑了观测值的秩次。
- B. Kendall's tau is not robust to outliers since it directly uses the values of the variables.
肯德尔 对异常值不鲁棒，因为它直接使用变量的值。
- C. Spearman's correlation remains unchanged under any monotonic increasing transformation of the variables.
斯皮尔曼相关系数在任何单调递增的变量变换下保持不变。
- D. Linear correlation is effective in capturing the dependence of asset returns with common heteroskedasticity.
线性相关系数在捕捉具有共同异方差的资产回报依赖关系上有效。

答案:C

解析:

A 选项错误。

- 皮尔逊相关系数（Pearson's correlation）主要用于衡量线性相关性，它基于变量的实际数值，对变量之间的线性关系敏感。在衡量非线性依赖关系时，皮尔逊相关系数往往不能准确反映变量之间的真实关系，因为它没有考虑变量之间的非线性特征。

B 选项错误。

- 肯德尔秩相关系数（Kendall's tau）也是基于秩次的方法，它通过比较样本点对的一致性来计算相关性。由于它使用的是秩次信息，而不是变量的具体数值，所以对异常值具有较强的鲁棒性。

C 选项正确。

- 斯皮尔曼相关系数（Spearman's correlation）是基于变量的秩次（ranks）来计算的。对于任何单调递增的变量变换，变量的秩次顺序不会改变。因此，斯皮尔曼相关系数在变量进行单调递增变换时具有不变性。

D 选项错误。

- 线性相关系数（如皮尔逊相关系数）在衡量具有共同异方差性的资产回报依赖关系上的作用与其在衡量一般资产回报依赖关系上作用没有显著差异。

考察：不同相关系数的特点及适用场景（理解各相关系数的计算原理和对不同数据特征的适应性）

11. A risk analyst for an equity hedge fund is currently engaged in an equity portfolio optimization project. During a scenario analysis on the Bloomberg terminal, the analyst discovers that the portfolio’s rate of return is strongly correlated with the price of natural gas. Given that the relationship between the portfolio return and the natural gas price exhibits both linear and nonlinear dependence, the analyst aims to account for both types of dependence. Which of the following statements about measuring dependence is least likely correct?

一位对冲基金的风险分析师正在参与一个股票投资组合优化项目。在彭博终端的情景分析中，分析师发现股票投资组合的收益率与天然气价格之间存在强相关性。鉴于投资组合收益率和天然气价格之间的关系既存在线性依赖又存在非线性依赖，分析师旨在考虑这两种依赖关系。哪一项关于测量依赖关系的陈述最不可能正确？

- A. Pearson’s correlation and the regression slope are closely related, and the regression slope is non - zero only when the correlation is non - zero.
皮尔逊相关系数和回归斜率之间存在密切的关系，回归斜率只有在相关系数不为零时才不为零。
- B. In the regression $Y = a + \beta X + \epsilon$, if Y and X are standardized to have unit variance, the regression coefficient equals the linear correlation estimate.
在回归方程 $Y = a + \beta X + \epsilon$ 中，如果 Y 和 X 被标准化为具有单位方差，回归系数等于线性相关估计。
- C. Spearman’s correlation is robust to outliers as it only considers the ranks of X and Y .
斯皮尔曼相关系数对异常值具有鲁棒性，因为它只考虑 X 和 Y 的秩次。
- D. Kendall’s tau has values that always range between 0 and 1 and is scale - invariant.
肯德尔 的取值范围始终在 0 和 1 之间，并且它具有尺度不变性。

答案:C

解析：

A 选项正确。

- 皮尔逊相关系数（Pearson’s correlation）和回归斜率之间存在密切的关系。回归斜率为零意味着自变量和因变量之间不存在线性关系，此时皮尔逊相关系数也为零；反之，当相关系数为零时，回归斜率也为零。

B 选项正确。

- 在回归方程 $Y = a + \beta X + \epsilon$ 中，当 Y 和 X 被标准化为具有单位方差时，回归系数 β 就等于 X 和 Y 的线性相关系数。

C 选项正确。

- 斯皮尔曼相关系数（Spearman’s correlation）是基于变量的秩次（ranks）来计算的，它只考虑变量的秩次顺序，而不考虑变量的具体数值。正因为只使用秩次信息，所以斯皮尔曼相关系数对异常值具有较强的鲁棒性。

D 选项错误。

- 肯德尔秩相关系数（Kendall’s tau）的取值范围始终在 - 1 到 1 之间，并且它具有尺度不变性，即变量的尺度变化不会影响肯德尔秩相关系数的值。

考察：不同相关系数的特点（关键是理解各相关系数的计算原理和性质）

12. A risk analyst at a global investment bank is analyzing the distribution of daily returns for cryptocurrency assets. The analyst notices that extreme price movements occur more frequently than would be expected under a normal distribution, suggesting the presence of power law behavior. Which of the following statements is most accurate regarding power law tails?

一位全球投资银行的风险分析师正在分析加密货币资产的每日收益率分布。分析师注意到极端价格波动比在正态分布下预期的更频繁，表明存在幂律行为。哪一项关于幂律尾部陈述最准确？

- A. More observations tend to be closer to the mean.

更多的观测值趋向于更接近均值。

- B. The standard normal distribution exhibits power law tails.
标准正态分布具有幂律尾部。
- C. The tails exhibit faster declines than normally distributed tails.
尾部衰减速度比正态分布的尾部要快。
- D. They tend to have "fatter" tails than those found in a normal distribution.
尾部比正态分布的尾部要"胖"。

答案:D

解析:

A 选项错误。

- 幂律分布的特点是在尾部区域有较多的观测值，而不是在均值附近有更多的观测值。

B 选项错误。

- 标准正态分布的尾部是指数衰减的，不具有幂律分布的特征。

C 选项错误。

- 幂律分布的尾部衰减速度比正态分布的尾部要慢，而不是更快。

D 选项正确。

- 幂律分布的尾部比正态分布的尾部要"胖"，这意味着在远离均值的区域有更多的观测值；极端事件发生的概率比正态分布要高；尾部衰减速度比正态分布要慢。

考察: 幂律分布的特征（关键是理解幂律分布的尾部特性）