

数 III 積分 解答

author : Yuta Suzuki

以下, C を積分定数とする。

$$1. \quad \int dx = x + C$$

$$2. \quad \int x^n dx = \begin{cases} \log|x| + C & (n = -1) \\ \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C & (n \neq -1) \end{cases}$$

$$3. \quad \int 2^x dx = \frac{2^x}{\log 2} + C$$

$$4. \quad \begin{aligned} \int \log x dx &= x \log x - \int dx \\ &= x \log x - x + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5. \quad \int x \log x dx &= \int \left(\frac{1}{2}x^2\right)' \log x dx \\ &= \frac{1}{2}x^2 \log x - \int \frac{1}{2}x dx \\ &= \frac{1}{2}x^2 \log x - \frac{1}{4}x^2 + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 6. \quad \int \sin 2x \sin 9x dx &= \int -\frac{1}{2}(\cos 11x - \cos 7x) dx \\ &= -\frac{1}{22} \sin 11x + \frac{1}{14} \sin 7x + C \end{aligned}$$

$$7. \quad \int \tan x dx = -\log|\cos x| + C$$

$$\begin{aligned} 8. \quad \int \frac{dx}{\sin x + 1} &= \int \frac{(\sin x - 1)}{(\sin x + 1)(\sin x - 1)} dx \\ &= \int \frac{1}{\cos^2 x} - \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx \\ &= \int \frac{1}{\cos^2 x} - \left(-\frac{(\cos x)'}{\cos^2 x}\right) dx \\ &= \tan x - \frac{1}{\cos x} + C \end{aligned}$$

別解：三角関数を含む分数関数の積分→ $t = \tan \frac{x}{2}$ の置換

$$t = \tan \frac{x}{2} \text{とおくと}$$

$$\tan x = \frac{2t}{1-t^2} \quad (\because \text{倍角の公式})$$

$$\tan^2 \frac{x}{2} = \frac{1-\cos x}{1+\cos x} \quad (\because \text{半角の公式})$$

$$\therefore \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$\sin x = \tan x \cos x = \frac{2t}{1+t^2}$$

$$dt = \frac{dx}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} = \frac{1+t^2}{2} dx \Rightarrow dx = \frac{2}{1+t^2} dt$$

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sin x + 1} &= \int \frac{\frac{2}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2} + 1} dt \\ &= \int \frac{2}{t^2 + 2t + 1} dt \\ &= \int \frac{2}{(t+1)^2} dt \\ &= -\frac{2}{t+1} + C = -\frac{2}{\tan \frac{x}{2} + 1} + C \end{aligned}$$

補遺：

先程の解答と別解の解答の形が異なっているように見えるかもしれませんが、実際、

$$-\frac{2}{\tan \frac{x}{2} + 1} + 1 = \tan x - \frac{1}{\cos x}$$

の関係があります。気になる人は Geogebra などのグラフ描画サイトで確認してみてください。このときの +1 は積分定数の分なので問題ありません。 y 軸方向にある定数だけずれることは不定積分では気にしない（というか気にできない）わけです。その許容が積分定数 C の意味というかあたりがたさです。

ちなみに、ほかに $\sin \theta \cos \theta$ の積分も $t = \sin \theta$ とおいて置換積分すれば $\frac{1}{2} \sin^2 \theta + C$ となったり、 \sin の倍角の公式を使って計算すれば $-\frac{1}{4} \cos 2\theta + C$ となったりします。これも $-\frac{1}{4} \cos 2\theta + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \sin^2 \theta$ の関係（半角の公式を変形したものです）があるので問題ないです。このように三角関数の積分は解法によって違う形が出ることがありますが、同じものを指しているかを三角関数の公式を使って計算して確かめてみるのも練習になるかもしれません。

$$\begin{aligned}
9. \quad \int \frac{dx}{\cos x} &= \int \frac{\cos x}{\cos^2 x} dx \\
&= \int \frac{\cos x}{1 - \sin^2 x} dx \\
&= \int \frac{1}{2} \left(\frac{\cos x}{1 - \sin x} + \frac{\cos x}{1 + \sin x} \right) dx \\
&= -\frac{1}{2} \log |1 - \sin x| + \frac{1}{2} \log |1 + \sin x| + C \\
&= \frac{1}{2} \log \left| \frac{1 + \sin x}{1 - \sin x} \right| + C
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
10. \quad \int \frac{dx}{x^2 + 2x + 1} &= \int \frac{dx}{(x+1)^2} \\
&= -\frac{1}{x+1} + C
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
11. \quad \int \frac{dx}{x^2 - 4x + 3} &= \int \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-1} \right) dx \\
&= \frac{1}{2} \log \left| \frac{x-3}{x-1} \right| + C
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
12. \quad \int_{-2}^{\sqrt{5}-2} \frac{dx}{x^2 + 4x + 9} &= \int_{-2}^{\sqrt{5}-2} \frac{dx}{(x+2)^2 + 5} \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sqrt{5}}{5(1 + \tan^2 \theta)} \times \frac{1}{\cos^2 \theta} d\theta \quad (x = \sqrt{5} \tan \theta - 2) \\
&= \frac{\sqrt{5}}{20} \pi
\end{aligned}$$

例題：類題として次の問題も解いてみてください。

$$\begin{aligned}
&\int_{-1}^{\sqrt{3}} \frac{dx}{x^2 + 4x + 5} \\
&= \int_{-1}^{\sqrt{3}} \frac{dx}{(x+2)^2 + 1} \\
&= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5}{12}\pi} \frac{1}{1 + \tan^2 \theta} \cdot \frac{1}{\cos^2 \theta} d\theta \quad (x+2 = \tan \theta \text{ とおいた}) \\
&= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5}{12}\pi} d\theta \\
&= \frac{5}{12}\pi - \frac{\pi}{4} \\
&= \frac{\pi}{6}
\end{aligned}$$

補遺：

$\tan \frac{5}{12}\pi = 2 + \sqrt{3}$ はわからなかったかもしれませんが，知っておいて損はありません。 $\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{8}$ な

どは有名角に加えて導出はできるようにしましょう。 $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$ から加法定理です。また、 $\frac{\pi}{8}$ のように加法定理が使えなさそうな場合は $\frac{\pi}{8} = \frac{\pi}{4} \times \frac{1}{2}$ から半角の公式を用いて導出します。自分の手を動かして求めないとわからないこともあります。例えば $\frac{\pi}{8}$ については半角の公式を用いるためその三角関数の 2 乗が求まるのでその平方根を求める必要があります。そのとき、二重根号を外せるものとそうでないものがあるので注意してください。

<https://mathsuke.jp/trigonometric-ratio/> が参考になります。

$$13. \quad \int \frac{2x^2 + 12x + 7}{x^2 + 5x + 1} dx = \int \left(2 + \frac{2x + 5}{x^2 + 5x + 1} \right) dx \\ = 2x + \log |x^2 + 5x + 1| + C$$

$$14. \quad \int \frac{3x + 1}{(x + 2)^2} dx = \int \frac{(x + 2) \times 3 - 5}{(x + 2)^2} dx \\ = \int \left(\frac{3}{x + 2} - \frac{5}{(x + 2)^2} \right) dx \quad (\text{部分分数分解}) \\ = 3 \log |x + 2| + \frac{5}{x + 2} + C$$

分数関数（有理関数）の積分

ここまでの問題より、有理関数はいろいろな解法がありますのでここでまとめておきましょう。

1. 「分子の次数 < 分母の次数」となるように割る
2. 分母の微分が分子になっていないか確認する（なっていれば log の形）
3. 分母の判別式 D を調べて $D > 0$ なら無理にでも因数分解して部分分数分解する
4. $D = 0$ なら部分分数分解や $(x + \alpha)^{-1}$ の微分の公式の逆を使う
5. $D < 0$ なら平方完成して $\tan \theta$ の置換

また、部分分数分解は慣れないうち（というか自信がないならいつでも）は分子を a や $ax + b$ のようにおいて、通分して恒等式として解くのが良いです。

それから、誘導がある問題はもちろんそれに従ってください。

$$15. \quad \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{6}} -2 \tan \theta \sin 2\theta d\theta \quad (x = \cos 2\theta \text{ (tan の半角の公式とみた)}) \\ = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} 4 \sin^2 \theta d\theta \quad (\because \sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta) \\ = 2 \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} (1 - \cos 2\theta) d\theta \\ = \frac{\pi}{3}$$

$$16. \quad \int x^x (1 + \log x) dx = x^x + C$$

17. $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx, \quad J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx$ とおく。

J に対して $x = \frac{\pi}{2} - t$ とおくと,

$$\begin{aligned} J &= \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} - t\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2} - t\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2} - t\right)} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{\sin t + \cos t} dt \\ &= I \quad \text{であり,} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I + J &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{\pi}{2} \\ \therefore I &= \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

上の $I = J$ の導出は $I - J = 0$ を示すことと同値なので次のようにもできる。

別解：

$$\begin{aligned} I - J &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x - \sin x}{\sin x + \cos x} dx \\ &= [\log(\sin x + \cos x)]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= 0 - 0 = 0 \\ \therefore I &= J \end{aligned}$$

18.
$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{e^x + 1} &= \int \frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}} dx \\ &= -\log(1 + e^{-x}) + C \end{aligned}$$

別解：

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{e^x + 1} &= \int \left(1 - \frac{e^x}{e^x + 1}\right) dx \\ &= x - \log(1 + e^x) + C \quad (= \log e^x - \log(1 + e^x) + C = -\log(1 + e^{-x}) + C) \end{aligned}$$

19.
$$\begin{aligned} \int \sqrt{e^x} + 1 \, dx &= \int \left(e^{\frac{x}{2}} + 1\right) dx \\ &= 2e^{\frac{x}{2}} + x + C \end{aligned}$$

20.
$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

$$\begin{aligned}
t &= x + \sqrt{x^2 + 1} \text{ とおくと} \\
dt &= \left(1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}\right) dx \\
&= \frac{t}{\sqrt{x^2 + 1}} dx \text{ より}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
J &= \int \frac{dt}{t} \\
&= \log |t| + C \\
&= \log(x + \sqrt{x^2 + 1}) + C
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
21. \quad \int \sqrt{x^2 + 1} dx &= \int (x)' \sqrt{x^2 + 1} dx \\
&= x\sqrt{x^2 + 1} - \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + 1}} dx \\
&= x\sqrt{x^2 + 1} - \int \sqrt{x^2 + 1} dx + \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 1}} \\
\therefore \int \sqrt{x^2 + 1} dx &= x\sqrt{x^2 + 1} + \log(x + \sqrt{x^2 + 1}) + C \quad (\because 20.)
\end{aligned}$$

別解 1 : $t = x + \sqrt{x^2 + 1} \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}\left(t - \frac{1}{t}\right) \quad (t > 0) \text{ とおく。}$

$$x^2 + 1 = \frac{1}{4}\left(t^2 - 2 + \frac{1}{t^2}\right) + 1 = \frac{1}{4}\left(t + \frac{1}{t}\right)^2$$

$$dx = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{t^2}\right) dt$$

であるので,

$$\begin{aligned}
\int \sqrt{x^2 + 1} dx &= \int \frac{1}{2}\left(t + \frac{1}{t}\right) \cdot \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{t^2}\right) dt \\
&= \int \frac{1}{4}\left(t + \frac{2}{t} + \frac{1}{t^3}\right) dt \\
&= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\left(t + \frac{1}{t}\right) \cdot \frac{1}{2}\left(t - \frac{1}{t}\right) + \frac{1}{2} \log t + C \\
&= \frac{1}{2}x\sqrt{x^2 + 1} + \frac{1}{2} \log(x + \sqrt{x^2 + 1}) + C
\end{aligned}$$

別解 2 : $(\log(x + \sqrt{x^2 + 1}))' = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$ より, $t = \log(x + \sqrt{x^2 + 1}) \Leftrightarrow x = \frac{e^t - e^{-t}}{2}$ とおく。

$$\begin{aligned}
\sqrt{x^2 + 1} &= \frac{e^t + e^{-t}}{2} \\
dx &= \frac{e^t - e^{-t}}{2} dt
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int \sqrt{x^2+1} \, dx &= \int \left(\frac{e^t + e^{-t}}{2} \right)^2 dt \\
&= \frac{1}{8}(e^{2t} - e^{-2t}) + \frac{1}{2}t + C \\
&= \frac{1}{2} \cdot \frac{e^t + e^{-t}}{2} \cdot \frac{e^t - e^{-t}}{2} + \frac{1}{2}t + C \\
&= \frac{1}{2}x\sqrt{x^2+1} + \frac{1}{2}\log(x + \sqrt{x^2+1}) + C
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
22. \quad \int \frac{x}{\sqrt{x+1}+1} \, dx &= \int \frac{x(\sqrt{x+1}-1)}{(\sqrt{x+1}+1)(\sqrt{x+1}-1)} \, dx \\
&= \int (\sqrt{x+1}-1) \, dx \\
&= \frac{2}{3}(x+1)^{\frac{3}{2}} - x + C
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
23. \quad I &= \int_{-1}^1 \frac{x^2}{1+e^x} \, dx = \int_1^{-1} \frac{t^2}{1+e^{-t}}(-1) \, dt \quad (x=-t) \\
&= \int_{-1}^1 \frac{t^2 e^t}{1+e^t} \, dt (=J) \\
I+J &= \int_{-1}^1 t^2 \, dt \\
&= \frac{2}{3} \\
\therefore I &= J = \frac{1}{3}
\end{aligned}$$

cf.)King Property という方法です。知っておいたほうがいいです。置換の常套手段です。

$$\begin{aligned}
24. \quad I &= \int e^x \sin x \, dx = e^x \sin x - \int e^x \cos x \, dx \\
&= e^x \sin x - e^x \cos x - \int e^x \sin x \, dx \\
&= e^x(\sin x - \cos x) - I \\
\therefore I &= \frac{1}{2}e^x(\sin x - \cos x) + C
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
25. \quad \int_{\alpha}^{\beta} (x-\alpha)^n (x-\beta) \, dx &= \int_{\alpha}^{\beta} \left\{ \frac{1}{n+1} (x-\alpha)^{n+1} \right\}' (x-\beta) \, dx \\
&= \left[\frac{1}{n+1} (x-\alpha)^{n+1} (x-\beta) \right]_{\alpha}^{\beta} - \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{n+1} (x-\alpha)^{n+1} \, dx \\
&= 0 - \left[\frac{1}{(n+1)(n+2)} (x-\alpha)^{n+2} \right]_{\alpha}^{\beta} \\
&= -\frac{1}{(n+1)(n+2)} (\beta-\alpha)^{n+2}
\end{aligned}$$

1/6 公式の一般化みたいなものです。ただの部分積分に過ぎないことがわかんと思います。

$$26. \quad I = \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{3 + \sin^2 x} dx$$

ある積分 $J = \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx$ に対して $x = \pi - t$ とおくと

$$\begin{aligned} J &= \int_{\pi}^0 (\pi - t) f(\sin(\pi - t)) (-1) dt \\ &= \int_0^{\pi} (\pi - x) f(\sin x) dx \\ &= \pi \int_0^{\pi} f(\sin x) dx - J \\ \therefore J &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx \end{aligned}$$

よって,

$$\begin{aligned} I &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{3 + \sin^2 x} dx \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{3 + (1 - \cos^2 x)} dx \\ &= \frac{\pi}{2} \int_1^{-1} \frac{-1}{4 - t^2} dt \quad (\cos x = t) \\ &= \frac{\pi}{8} \int_{-1}^1 \left(\frac{1}{2 - t} + \frac{1}{2 + t} \right) dt \\ &= \frac{\pi}{8} \left[\log \frac{2 + t}{2 - t} \right]_{-1}^1 \\ &= \frac{\pi}{8} \left(\log 3 - \log \frac{1}{3} \right) \\ &= \frac{\pi}{4} \log 3 \end{aligned}$$

補遺：わざわざ上の積分 J を導入する必要はありません。普通に $x = \pi - t$ と置換積分して $I = (\pi \text{ が前についた積分}) - I$ という関係を導ければ解けます。King Property かな？ と思って置換したら少し違ったみたいな感じでも良いです。

これは最初から解けたらかなり力がついている証拠です。実際の入試問題ではなにか誘導があった気がします。忘れました。